


Koch) fand ich auf Sandhügeln zwischen Budapest R. Palota ziemlich häufig, so dass es möglich wird, davon Exemplare für Kerner's Fl. exsicc. Austro-Hungar. zu sammeln. *Astragalus transsilvanicus* Janka hat Barth wenigstens nach meinem Herbar unter diesem Namen von Egerhegy früher ausgegeben; eine Description erschien aber vielleicht nicht, und so ist die Priorität Barth's zweifelhaft. Das Exemplar von Janka hat eine 56 Cm. lange Wurzel, während der oberirdische Theil nicht höher ist als bei *A. exscapus* L. — *Veronica crinita* Kit. kommt auch in der Taja-Schlucht in Siebenbürgen vor, wo sie Barth gesammelt hat, und *Polygonum viviparum* am Kiralykö. Borbás.

Ung.-Hradisch, 17. Mai 1886.

Ein Gymnasialschüler brachte mir eine *Bellis perennis*, die eine besonders abnorme Ausbildung zeigte. Aus einem Wurzelstock entsprangen 5 gesonderte Triebe, an welchem einem ein Blütenstiel war, der in einer Höhe von 9 Cm. 7 Blütenköpfchen, und zwar 5 an 3 Cm. hohen Stielehen und 2 sitzende trug. Alle Köpfchen waren bis auf ein sitzendes, rudimentäres, deutlich entwickelt. Die Pflanze wurde in den Mařatitzer Weingärten gefunden.


Prof. Ludwig Schlägl.



Vereine, Anstalten, Unternehmungen.

— In der Monats-Versammlung der k. k. Zoologisch-botanischen Gesellschaft am 5. Mai hielten botanische Vorträge die Herren: DDr. G. Beck und R. v. Wettstein. Ersterer sprach „über die Wälder Bosniens und der Herzegovina“ (auf Grund seiner im Vorjahre in diese Länder unternommenen Excursion). An Wald bildenden Bäumen sind vornehmlich und zwar bis an die Grenze der Baumregion die Laubhölzer vertreten; darunter als Specialitäten *Acer obtusatum* und *Rhamnus carniolica* Kerner. In der Herzegovina, und zwar auf der Romanja-Planina, kommen jedoch prachtvolle Bestände von *Pinus leucodermis* Antoine vor, deren Differential-Diagnosen von der dortlands gleichfalls vorhandenen Schwarzföhre der Vortragende eingehend erläuterte. Der Krummholzgürtel besteht aus *Pinus Pumilio*, var. *applanata* Wilk. und *Juniperus sibirica*. — Dr. R. v. Wettstein hielt einen Vortrag „über mehrere Standortformen der Gattung *Myosotis*“ und demonstrierte namentlich die morphologischen und pflanzengeographischen Verhältnisse der beiden alpinen Arten: *M. alpestris* und *M. suaveolens* WK. — Schliesslich möge die Mittheilung hier Platz finden, dass seit Kurzem im Vereinslocale der genannten Gesellschaft, behufs Erzielung eines regeren Lebens im botanischen Verkehr sogenannte Discussionsabende abgehalten werden.

M. Přihoda.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1886

Band/Volume: [036](#)

Autor(en)/Author(s): Prihoda

Artikel/Article: [Vereine, Anstalten, Unternehmungen. 214](#)