


zweimal kleinere Blütenköpfchen, dunklere Blüten und endlich durch schmälere Ligulae.



Beitrag zur Flora des nördlichen Mährens und des Hochgesenkes.

Von Dr. Ed. Formánek,

k. k. Professor am böhmischen Gymnasium in Brünn.

(Fortsetzung.)

Gymnadenia conopsea R. Br. D. Märzdorf, Beckengrund, Buchelsdorf, Peterstein, Saugraben, Bärmuttergraben, Janowitz, Perschl, u. a. O. bei Römerstadt, Irmsdorf.

— *albida* Rich. Saugraben, Bärmuttergraben, Fr. Jagdhaus, Gr. Hirschkamm.

Epipactis latifolia All. Gr. Ullersdorf (Oborny), Bradelsteine bei D. Liebau, Petersdorf, Rubenseifen, Zöptau, Marschendorf, Buchelsdorf, Neudorf, D. Märzdorf, Wüst-Seibersdorf, Reigersdorf, Pföhlwies, Jeppersdorf, Blauda, Nikles, Altvaterwald, Goldenfluss, Kl. Mohrau, Krondörf, Blaschke, Kleppel, Wermsdorf, Kiesgraben, Kriech, Janornitz, Römerstadt, Gundersdorf, Bantsch.

Neottia nidus avis Rich. Kleppel, Berggeist, Römerstadt.

Iris pseudoacorus L. Blauda.

Euphorbia dulcis L. *α. lasiocarpa* Neil. Oborn. Fl. v. M. u. ö. S. p. 281. Gr. Ullersdorf, Buchelsdorf, Neudorf, Brünnel bei D. Märzdorf, Wüst-Seibersdorf, (Hinterbusch u. a. O.), Pföhlwies, Wald bei der Ruine Neuhaus, Nikles, Altvaterwald, Kl. Mohrau, Wermsdorf, Kiesgraben, Hochwald bei Janowitz, Römerstadt.

— *amygdaloides* L. Wigstadtl, Lautsch, Pohorčer Wald und Scheuergrund bei Odrau.

— *esula* L. Verbreitet und noch bei Gr. Ullersdorf, Blauda und Römerstadt.

— *cyparissias* L. Gemein, in höheren Lagen: Ohrenberg bei Buchelsdorf, Janowitz, Römerstadt.

Mercurialis perennis L. Wiesenberg, Mähr. Schönberg (Oborny), Gr. Ullersdorf, Buchelsdorf, D. Märzdorf, Wüst-Seibersdorf, Reigersdorf, Pföhlwies, Blauda, Nikles, Altvaterwald, Kleppel, Berggeist, Janowitz, Römerstadt, Wigstadtl, Lautsch, Odrau.

Alnus incana DC. Buchelsdorf, Winkelsdorf, Janowitz.

Betula verrucosa Ehrh. In kleinen geschlossenen Beständen bei Gr. Ullersdorf, Marschendorf und Blauda.

Fagus sylvatica L. Strauchartige Exemplare am Gr. Hirschkamm und auf der Hohen Haide.

- Salix viminalis* L. Gr. Ullersdorf, B. Märzdorf, Nikles.
 — *silesiaca* Willd. Saugraben, Bärnuttergraben, Hohe Haide, Gr. Hirschkamm.
 — *caprea* L. Gemein, am Hutberge bei Gr. Ullersdorf, eine interessante virescentia.
- Rumex sanguineus* L. D. Liebau, Bautsch, Wigstadtl, Lautsch, Odrau (Schlosser).
 — *obtusifolius* L. *α. silvestris* Wall. sp. Čelak. Prodr. F. B. p. 157. Gr. Ullersdorf, Philippsthal, Neudorf, Beckengrund, D. Märzdorf, Wüst-Seibersdorf, Reigersdorf, Nikles, Kl. Mohrau.
 — *aquaticus* L. Um Odrau.
 — *alpinus* L. Bärenkamm, Peterstein, Saugraben, Gr. Hirschkamm.
 — *arifolius* All. Vom Gr. Hirschkamm bis zum Berggeist und Kleppel hinuntersteigend.
- Polygonum bistorta* L. Ullersdorf (Oborny) Rabenseifen, Petersdorf, Reitendorf, Marschendorf, Philippsthal, Wiesenberg, Wermsdorf, Buchelsdorf, Goldenfluss, Kl. Mohrau, Krondörfel, Wahlbergsdorf, Blaschké, Janowitz, Neufeld, Römerstadt, Irmsdorf, Gr. Stoll, Wigstadtl, Odrau.
 — *amphibium* L. Römerstadt.
 — *minus* Huds. D. Liebau.
 — *convolvulus* L. Gemein, in kühleren Lagen bei Janowitz, Römerstadt und Irmsdorf.
 — *fagopyrum* L. Verwildert beim Pföhlwies und bei Altvaterwald.
- Chenopodium bonus Henricus* L. Gemein und noch bei Kl. Mohrau und Römerstadt.
- Urtica dioica* L. Gemein, var. *subinermis* Uechtr. bei der Tess in Gr. Ullersdorf, Trausnitz bei Petersdorf, bei der Oppa unterhalb der Schäferei, Hochwald bei Janowitz, Römerstadt.
- Bryonia alba* L. An Zäunen und in Hecken bei Blauda, B. Märzdorf und Nikles.
- Canabis sativa* L. Verwildert bei Gr. Ullersdorf.
- Daphne mezereum* L. Wiesenberg, Zöptau, Gr. Ullersdorf etc. (Oborny!), Rabenseifen, Rudelsdorf, Buchelsdorf, Beckengrund, Deutsch Märzdorf, Ludwigsthal, Pföhlwies, Nikles, Wermsdorf, Kiesgraben, Kriech, Franz. Jagdhaus, Hochwald bei Janowitz, Grundwald u. a. O. bei Römerstadt, Wigstadtl, Odrau.
- Thesium alpinum* L. Peterstein, horizontaler Weg von der Schäferei zum Franz. Jagdhaus, Saugraben, Gr. Hirschkamm, Schieferheide, Backofensteine, Hörndlsteine, Hofberg, Berggeist.
- Asarum europaeum* L. Gemein und noch auf der Kriech.
- Jasione montana* L. Verbreitet in der Gr. Ullersdorfer Mähr. Schönberger, Kl. Mohrauer, Römerstädter, Bautscher und Odrauer Gegend.

Phyteuma spicatum L. Petersdorf, Rabenseifen, Zöptau, häufig bei Gr. Ullersdorf, Buchelsdorf, Neudorf, Ludwigsthal, Reigersdorf, Pföhlwies, Blauda, Goldenfluss, Kl. Mohrau, Wermsdorf, Kleppel, Dämmbaude, Peterstein, Saugraben, hier Ende August blühend, Bärmuttergraben, Kiesgraben, Gr. Hirschkamm, Backofensteine, Hofberg, Berggeist, Wigstadtl, Odrau. Var. *sphaerocephalum* mihi. Blüthenstiel verkürzt, Blüthenähre fast kugelförmig, Pflanze niedriger und gedrungener, Stengel stärker. Gr. Kessel im Gesenke.

Campanula barbata L. In tieferen Lagen bei Wermsdorf (Oborny) Röhrlberg bei Kleppel im Brandwalde bis Braunseifen hinuntersteigend.

— *cervicaria* L. Odrau, Hirnich bei Neudörf.

— *rotundifolia* L. f. *albiflora* m. An der Strasse von Gr. Ullersdorf nach Neudorf.

— *trachelium* L. Gemein, α . *albiflora* m. Verbreitet in den Thälern und Ausläufern des Gesenkes, in zwei Abänderungen, bei der häufigeren Form sind alle Blüthen weiss, wo hingegen bei der selteneren nur einige Blüthen weiss sind, während die anderen, in der Regel die unteren, normal gefärbt sind (β . *variegata* m.), letztere Form am Steinig bei Beckengrund und bei Neudorf. Var. α . fand ich am Hartberge, Rothen Berge und bei der Tess bei Gr. Ullersdorf, Marschendorf, Buchelsdorf, Kirchberg bei Neudorf, Pföhlwies, Nikleser und Altvaterwald, Spitzberg u. a. O. bei Wermsdorf; β . *nemoralis* mihi, Pflanze zarter und üppiger, Blätter weicher, obere schmaler und länger, Kelche spärlicher behaart als beim Typus. An feuchten und schattigen Stellen bei Gr. Ullersdorf nicht gerade selten, so bei der Tess, im Schlossparke, am Hutberge etc.

Crepis grandiflora Tausch., Hirschbrunnen etc. (Oborny), Saugraben, Bärmuttergraben, Kriech, Kiesgraben bis fast nach Wermsdorf,

— *succisaefolia* Tausch. Peterstein, Saugraben etc.; Gr. Hirschkamm, Backofensteine, Berggeist, Janowitz.

— *paludosa* Mönch. Selbst noch auf den höchsten Kämmen, so noch auf der Hohen Haide, Ameisenhügel etc. (Oborny), Gipfel des Altvaters, Peterstein, Auerhahnbaude, Saugraben, Bärmuttergraben, Franz. Jagdhaus, Kriech, Kiesgraben, Berggeist, Bradlsteine und Krausenbüschel bei D. Liebau, Zöptau, Marschendorf, gemein bei Gr. Ullersdorf, Buchelsdorf, Neudorf, Beckengrund, D. Märzdorf, Wüst-Seibersdorf, Ludwigsthal, Nikles, Altvaterwald, Kl. Mohrau, Wermsdorf, Kleppel, Hochwald bei Janowitz, Römerstadt, Bautsch.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1887

Band/Volume: [037](#)

Autor(en)/Author(s): Formanec Ed.

Artikel/Article: [Beitrag zur Flora des nördlichen Mährens und des Hochgesenkes. 305-307](#)