


sehr erheblich besonders durch oberseits glänzende Blätter, welches Merkmal jedoch an getrockneten Exemplaren verloren geht.

Probabin (Südostgalizien), am 10. September 1887.



## Beitrag zur Flora des nördlichen Mährens und des Hochgesenkes.

Von Dr. Ed. Formánek,

k. k. Professor am böhmischen Gymnasium in Brünn.

(Fortsetzung.)

*Valeriana officinalis* L. Wiesenberg und herab bis Mähr. Schönberg (Oborny) Rabenseifen, Zöptau, Buchelsdorf, Aspendorf, Pföhlwies, Goldenfluss, Kl.-Mohrau, Wermsdorf, Kiesgraben, Römerstadt, Irmsdorf, Gundersdorf, Bautsch.

— *sambucifolia* Mikan. Saugraben, Bärmuttergraben, Kriech, Wermsdorf.

*Valerianella dentata* Poll. Gr.-Ullersdorf, Wiesenberg etc. (Oborny) D. Liebau, Petersdorf, Rabenseifen, Zöptau, Buchelsdorf, Neudorf, Blauda, Nikles, Grumberg, Kl.-Mohrau, Krondörf, Wahlbergsdorf, Römerstadt, Bautsch, Wigstadtl.

*Sherardia arvensis* L. Gemein und noch bei Gr.-Ullersdorf, Römerstadt und Gr.-Stoll.

*Asperula odorata* L. Häufig bei Mähr.-Schönberg, Goldenstein etc. (Oborny), Petersdorf, Rabenseifen, Zöptau, Gr.-Ullersdorf, Neudorf, Beckengrund, Pföhlwies, Nikles, Altvaterwald, Kl.-Mohrau, Rother Berg, Kriech, Berggeist, Römerstadt, Bautsch, Wigstadtl, Odrau, Pohor.

*Galium silvaticum* L. Verbreitet im b. G.

— *palustre* L. Petersdorf, Rabenseifen, Zöptau, D. Märzdorf, Wüst-Seibersdorf, Blauda, Nikles, Altvaterwald, Grumberg, Kl.-Mohrau, Blaschke.

— *cruciata* Scop. Blauda, Bautsch, Wigstadtl, Odrau.

— *vernum* Scop. Busch- und Milbeswald bei Gundersdorf, Bautsch, Wigstadtl, Kl.-Hermsdorf, gemein bei Odrau, Lautsch, Neudörf, Werdenberg, Pohor.

— *rotundifolium* L. Gr.-Ullersdorf, Waltersdorf, (Oborny), Trausnitz bei Petersdorf, Blauda, Nikles, Altvaterwald, häufig bei Gundersdorf, Bautsch, Wigstadtl, Lautsch, Werdenberg, Pohor, häufig bei Odrau.

*Lonicera xylosteum* L. Wiesenberg (Oborny), Petersdorf, Rudelsdorf, Zöptau, Marschendorf, Neudorf, D. Märzdorf, Ludwigsthal, Reigersdorf, Pföhlwies, Nikles, Kl.-Mohrau, Krondörf, Blaschke, Römerstadt, Irmsdorf, Gundersdorf, Bautsch, Odrau.

- Lonicera nigra* L. Bradlsteine bei D. Liebau, Gr.-Ullersdorf, Marschendorf, Buchelsdorf, Beckengrund, Neudorf, Brünnele und Brandwald bei D. Märzdorf, Hinterbusch bei Wüst-Seibersdorf, Goldenfluss, Kl.-Mohrau, Krondörfel, Blaschke, Wermsdorf, Kiesgraben, Kriech, Janowitz, Römerstadt, Irmsdorf, Gundersdorf, Viehwald u. a. O. bei Bautsch.
- Sambucus racemosa* L. Kirchberg bei Neudorf, Stollenhau, Goldenfluss, Kl.-Mohrau, Viehwald bei Bautsch, Odrau.
- *ebulus* L. In höheren Lagen selbst bei Wüst-Seibersdorf, im Gesenke (Oborny), Bradlsteine bei D. Liebau, Gr.-Ullersdorf, Stollenhau, Aspendorf, Geppersdorf, Perschl u. a. O. bei Römerstadt, häufig bei Gundersdorf und Bautsch, Wigstadtl, Lautsch, Neudörfel, Werdenberg, häufig bei Odrau.
- Viburnum opulus* L. Bradlsteine bei D. Liebau, Stollenhau.
- Ligustrum vulgare* L. D. Liebau, Anlagen in Gr.-Ullersdorf.
- Vinca minor* L. Häufig in einem Bauernwalde bei Neudorf nächst Gr.-Ullersdorf, Gundersdorf.
- Menyanthes trifoliata* L. Blauda, Janowitz und auf Wiesen beim Grundwalde bei Römerstadt.
- Gentiana germanica* Willd. Schlossberg und Grundwald bei Römerstadt, zu dieser Form gehören auch die in d. Z. 1884 p. 204 sub *Gentiana amarella* L. a. *genuina* angeführten Standorte und soll auf dieser Seite statt „a. *genuina*“ stehen „b. *germanica* Willd. sp.“ Čelak. Prodr. Fl. B. p. 293.
- Erythraea centaurium* Pers. D. Liebau, Petersdorf, Rabenseifen, Marschendorf, G.-Ullersdorf, Neudorf, Ludwigsthal, Reigersdorf, Blauda, Bautsch, Wigstadtl, gemein bei Odrau.
- Myosotis intermedia* Link. D. Liebau, Gr.-Ullersdorf, Bautsch, Wigstadtl, Odrau.
- *palustris* Roth. f. *albiflora* Bautsch, Wigstadtl.
- Pulmonaria obscura* Du Mort. Gr.-Ullersdorf, Beckengrund, Reigersdorf, Kl.-Mohrau, Römerstadt.
- Lycopsis arvensis* L. D. Liebau, Liebesdorf, bei der Tess u. a. O., bei Gr.-Ullersdorf.
- Symphytum officinale* L. var. *albiflora* m., bei der Tess in Gr.-Ullersdorf, Marschendorf, Philippsthal, Neudorf, Kl.-Mohrau, Blaschke.
- *tuberosum* L. Viehwald bei Bautsch, Wigstadtl, Odrau.
- Polemonium coeruleum* L. Verwildert in und aus Gärten bei Gr.-Ullersdorf und Buchelsdorf, am letzteren Standorte selbst auf Wiesen unter dem Ohrenberge.
- Convolvulus sepium* L. Lautsch, Odrau, Mankendorf.
- Cuscuta epilinum* Weihe D. Märzdorf.
- *major* DC. Auf *Rubus caesius* bei Odrau.
- *epythimum* Murr. Auf *Lotus corniculatus* bei Bautsch, auf *Scabiosa* bei Wigstadtl und auf *Ranunculus acris* L. bei Odrau.

*Solanum nigrum* L. Var. *humile* Bernh. Odrau.

— *dulcamara* L. Gr.-Ullersdorf, Wiesenberg etc. (Rieger). D. Liebau, Petersdorf, Rabenseifen, Zöptau, Wigstadtl, Lautsch, Odrau.

*Lycium barbarum* L. Wigstadtl, Lautsch, Odrau, Mankendorf, Schönau.

*Atropa belladonna* L. Bradlsteine bei D. Liebau, Petersdorf, Bautsch, Wigstadtl, Kl.-Hörmsdorf, Lautsch, Hirnich bei Neudörfel, Werdenberg (Heide etc.) massenhaft auf Holzschlägen im Pohofer Walde und im Scheuergrunde bei Odrau.

*Verbascum phlomoides* L. ampl. a. *genuinum* Čelak. Prodr. p. 313. D. Liebau, Bautsch, Lautsch, Neudörfel, Odrau. b. *thapsiforme* l. c. Bautsch, Odrau.

— *thapsus* L. Gr.-Ullersdorf, etc. (Oborny), D. Liebau, Trausnitz, bei Petersdorf, Rabenseifen, Zöptau, Wiesenberg, Buchelsdorf (hier in der f. *semidecurrrens* Čelak.), Reigersdorf, Janowitz, Römerstadt, Gundersdorf, Bautsch.

— *lychnitis* L. Lautsch, Odrau.

— *nigrum* L. Petersdorf, Rabenseifen, Zöptau, Gr.-Ullersdorf, D. Märzdorf, Wüst-Seibersdorf, Geppersdorf, Nikles, Grumberg, Kl.-Mohrau, Woitzdorf, Odrau.

*Scrophularia nodosa* L. Am Berggeiste!

— *Scopolii* Hoppe. Dämmbaude.

*Linaria vulgaris* Mill. Gemein, in höheren Lagen bei Janowitz und zahlreich an Mauertrümmern nächst des Hirschbrunnens.

*Digitalis ambigua* Murr. Winkelsdorf (Oborny)! bei der Tess in Gr.-Ullersdorf, Philippsthal, bei den Köhlerhütten u. a. O. bei Wermsdorf, Kleppel, Rother Berg, Schlössel, Kriech, Kiesgraben, Hofberg, Berggeist.

*Veronica officinalis* L. Gemein, in höheren Lagen am Ohrenberge bei Buchelsdorf, Kriech, Berggeist.

— *chamaedrys* L. Gemein, auf einer Wiese bei der Tess bei Gr.-Ullersdorf fand ich ein Exemplar, welches zwischen den zwei hervortretenden Haarreihen, ebenfalls behaart war, so dass es den Eindruck einer ringsum, aber ungleichmässig behaarten Pflanze machte, diese schöne Varietät bezeichne ich, falls sie sich bewähren sollte, als die *polytricha* mihi.

— *longifolia* L. Im Schlossparke bei Gr.-Ullersdorf, wahrscheinlich nur verwildert.

— *arvensis* L. Gemein, in höheren Lagen um Wiesenberg (Oborny), Gr.-Ullersdorf, Buchelsdorf, Marschendorf, Wermsdorf, Nikles, B. Märzdorf, Janowitz, Römerstadt.

— *serpyllifolia* L. Trausnitz, Gr.-Ullersdorf, Bärenkamm.


— *verna* L. D. Liebau.

— *Tournefortii* Gmel. (1805) Gr.-Ullersdorf (Oborny), D. Liebau, Trausnitz bei Petersdorf, Zöptau, Marschendorf, Reigersdorf, Pföhlwies, Blauda, B. Märzdorf, Nikles, Römerstadt, Bautsch, Wigstadtl, Werdenberg, Odrau.

— *agrestis* L. Wigstadtl.

- Pedicularis palustris* L. Römerstadt, Gr.-Stoll.  
 — *silvatica* L. Kl.-Mohrau, Krondörf, Woitzdorf, Wigstadtl, Kunzendorf.
- Rhinanthus serotinus* Schönheit. Trausnitz bei Petersdorf, Wermsdorf, Kiesgraben, Römerstadt.  
 — *hirsutus* All. Gr.-Ullersdorf, Zöptau, Wigstadtl, Odrau.  
 — *alpinus* Baumg. Horizontaler Weg von der Schäferei zum Franz. Jagdhaus, Gr.-Hirschkamm, Schieferheide, Backofensteine.
- Euphrasia picta* Host. Bärenkamm, Schlössel, Saugraben, Backofensteine, Hofberg.  
 — *stricta* Host. Verbreitet selbst noch am Trausnitz bei Rabenseifen, bei Buchelsdorf und Beckengrund.
- Melampyrum nemorosum* L. Noch bei Wüst-Seibersdorf und im Grundwalde bei Römerstadt.  
 — *pratense* L. D. Liebau, Petersdorf. Gr.-Ullersdorf, Marschendorf, Philippsthal, Kl.-Mohrau, Blaschke, Janowitz, Römerstadt, Wigstadtl, Odrau.  
 — *silvaticum* L. Hohe Heide, Verlorene Steine, Berggeist etc. (Oborny) Keilig, Rother Berg, Peterstein, Saugraben, Bär-muttergraben, Franz. Jagdhaus, Kriech, Köhlerhütten, bei Wermsdorf, Gr.-Hirschkamm, Backofensteine, Hofberg, Hochwald bei Janowitz.
- Lycopus europaeus* L. In einer abweichenden Form bei Gr.-Ullersdorf (Oborny), D. Liebau, Beckengrund, Ludwigsthal, Bautsch, Odrau etc.
- Origanum vulgare* L. Petersdorf, häufig bei Gr.-Ullersdorf, Zöptau und Marschendorf, Beckengrund, Reigersdorf, Aspendorf, Pföhlwies, B. Märzdorf, Kleppel!
- Thymus montanus* W. K. Wiesenberg, Gr.-Ullersdorf etc. (Oborny) Petersdorf, Rabenseifen, Zöptau, Buchelsdorf, Winkelsdorf, Beckengrund, Wüst-Seibersdorf, Reigersdorf, Nikles, Grumberg, Kl.-Mohrau, Römerstadt.
- Ballota nigra* L. Noch um Odrau und Wigstadtl.
- Salvia verticillata* L. D. Liebau, B. Märzdorf.
- Nepeta cataria* L. Verwildert auf der hohen Warte bei Zöptau, Aspendorf, im Aufstiege zum Pohořer Wald u. a. O. bei Odrau.
- Galeopsis ladanum* L. Bautsch.  
 — *tetrahit* L. In höheren Lagen bei Buchelsdorf, Kl.-Mohrau, Franz. Jagdhaus (weissblühend) Römerstadt.  
 — *pubescens* Bess. Gr.-Ullersdorf, Bautsch, Odrau.  
 — *versicolor* Curt. Wald bei der Ruine Neuhaus nächst Nikles, Spitzberg bei Wermsdorf, Scheuergrund u. a. O. bei Odrau hier auch die *f. parviflora* Knaf. Čelak. Prodr. p. 356.
- Betonica officinalis* L. D. Liebau, Grasplätze bei Blauda, Wigstadtl, Lautsch, Werdenberg, Odrau.

(Fortsetzung folgt.)



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1887

Band/Volume: [037](#)

Autor(en)/Author(s): Formanec Ed.

Artikel/Article: [Beitrag zur Flora des nördlichen Mährens und des Hochgesenkes. 385-388](#)