


ter hat Recht: diese so lange ignorirte Pflanze scheint durch die ganzen Voralpen verbreitet zu sein, wenigstens am Fuss des Hohen Stein (1184 M.) häufig: *Carthamus tinctorius* L., gebaut in Plankenstein, verwildert bei St. Gotthard. *Castanea sativa* (L.) Mill. cult. d. h. veredelt hier in Gärten, verwildert häufig in Wäldern, aber nur auf Mergel.

*Cephalanthera rubra* Rich. und *C. pallens* Rich. haben auch einen grösseren Verbreitungsbezirk; gehen in die Donauthäler hinein, von Spitz z. B. bis in die Nähe von Kottes; sonnige „Leithn“ im Egelsgraben, auf Granit, etwa 700 Met. Grenze.

Kilb, am 6. November 1887.



## Beitrag zur Flora des nördlichen Mährens und des Hochgesenkes.

Von **Dr. Ed. Formánek**,

k. k. Professor am böhmischen Gymnasium in Brünn.

(Fortsetzung.)

*Stachys alpina* L. Kriech, Kiesgraben (v. Uechtritz)!, Spitzberg, bei den Köhlerhütten u. a. O. bei Wermsdorf, Bautsch, Wigstadtl, Kl.-Hermsdorf, Lautsch, Hirnich bei Neudörf, Werdenberg, Pohořer Wald, Scheuergrund u. a. O. bei Odrau.

— *silvatica* L. Gr.-Ullersdorf (Oborny), Trausnitz bei Petersdorf, Pföhlwies, Blanda, B. Märzdorf, Nikles, Altvaterwald, Rother Berg circa 900 m. Grundwald u. a. O. bei Römerstadt, Wigstadtl, Lautsch, Hirnich bei Neudörf, Werdenberg, häufig bei Odrau, Pohoř, Söhle.

*Lamium maculatum* L. Wigstadtl, Lautsch, häufig bei Odrau, Pohoř.

*Leonurus cardiaca* L. In höherer Lage bei Nikles.

*Scutellaria galericulata* L. Selbst noch bei Gr.-Ullersdorf und Irmsdorf.

*Prunella vulgaris* L. Gemein, in höheren Lagen am Rothen Berge, im Gr.-Kessel, Kriech, Berggeist.

*Ajuga genevensis* L. Geppersdorf, Kl.-Mohrau, Rother Berg, Römerstadt.

*Plantago media* L. Schäferrei.

*Anagallis arvensis* L. a. *phoenicea* Scop. D. Liebau, Petersdorf, Rabenseifen, Gr.-Ullersdorf, Wüst-Seibersdorf, Nikles, Kl.-Mohrau, Römerstadt, Bautsch, Wigstadtl, Odrau, Werdenberg.

*Trientalis europaea* L. Knoblochgraben (im vorigen Jahre hier angetroffen). horizontaler Weg von der Schäferrei zum Franz. Jagdhaus, Schlössel. Gr.-Hirschkamm.

- Lysimachia nemorum* L. Wermsdorf, Wiesenberg, Berggeist, etc., (Oborny); Badegrund, Rother Berg u. a. O. bei Gr.-Ullersdorf, Winkelsdorf, Buchelsdorf, Beckengrund, D. Märzdorf, Wüst-Seibersdorf, Stollenbau, Pföhlwies, Nikles, Altvaterwald, Grumberg, Kl.-Mohrau, Krondörf, Hochwald bei Janowitz, Römerstadt, Gr.-Stoll.
- *vulgaris* L. Gemein, selbst noch bei Kl.-Mohrau und Römerstadt.
- Vaccinium vitis idaea* L. Felsen bei Nikles, Altvaterwald, Grumberg, Kl.-Mohrau, Wermsdorf, Kleppel.
- Oxycoccus palustris* Pers. Kl.-Seeberg.
- Ramischia secundiflora* Opic. In den Wäldern von Blauda bis nach Hausdorf (Oborny), D. Liebau, Petersdorf, Rabenseifen, Zöptau, Wiesenberg, Buchelsdorf, gemein bei Gr.-Ullersdorf, Neudorf, D. Märzdorf, Wüst-Seibersdorf, Ludwigsthal, Stollenbau, Geppersdorf, Reigersdorf, Asperndorf, Pföhlwies, Nikles, Altvaterwald, Kleppel, Berggeist, Janowitz, häufig bei Römerstadt, Gundersdorf, Bautsch, Wigstadt, Odrau.
- Pirola minor* L. Kirchwald bei Blauda und an vielen Orten im Gesenke (Oborny) Petersdorf, Rabenseifen, Zöptau, Marschendorf, Neudorf, (Kirchberg etc.), Beckengrund, Brandwald bei D. Märzdorf, Ludwigsthal, Gr.-Ullersdorf, Geppersdorf, Reigersdorf, Pföhlwies, Ruine Neuhaus, Nikles, Altvaterwald, Kl.-Mohrau, Kleppel, Berggeist, Römerstadt.
- *rotundifolia* L. D. Liebau, Petersdorf, Rabenseifen, Gr.-Ullersdorf, Römerstadt, Bautsch, Odrau.
- *chlorantha* Sw. Gr.-Ullersdorf, Kirchberg bei Neudorf.
- Monesis grandiflora* Salisb. Trausnitz bei Petersdorf, Rabenseifen, Gr.-Ullersdorf, Ohrenberg bei Buchelsdorf, Beckengrund, D. Märzdorf, Ludwigsthal, Reigersdorf, Pföhlwies.
- Monotropa hypopitys* L. Römerstadt, Bautsch.
- Thalictrum aquilegifolium* L. Bei der Tess in Gr.-Ullersdorf, Philippssthal, Wiesenberg, bei den Köhlerhütten u. a. O. bei Wermsdorf, Kleppel, Kl.-Mohrau, Krondörf, Blaschke, Dämmbaude, Sauergraben, Bärnuttergraben, Kriech, Kiesgraben, Braunseifen, Hochwald bei Janowitz, Römerstadt.
- Hepatica triloba* Chaix. Gemein in der Gr.-Ullersdorfer und Odrauer Gegend.
- Caltha palustris* L. Beim Hirschbrunnen am 20. August, bei Römerstadt am 4. September blühend.
- Ranunculus aconitifolius* L. Bärenkamm, Wermsdorf, Peterstein, Hohe Heide etc. (Oborny) Berggeist und von da bis zum Podélskybach bei Irmsdorf!
- *flammula* L. Von D. Liebau bis zum Beckengrund und von da bis Blauda und Kl.-Mohrau, häufig in der Römerstädter, Wigstadtler und Odrauer Gegend.
- *acer* L. Gipfel des Petersteines, der Hohen Heide, des Gr. Hirschkamms.

- Ranunculus lanuginosus* L. Petersdorf, Gr. Ullersdorf, D. Märzdorf, Wüst-Seibersdorf, Pföhlwies, Nikles, Altvaterwald, Grumberg, Kl. Mohrau, Wermsdorf, Janowitz, Römerstadt.
- *nemorosus* L. Rother Berg, Saugraben, Bärmuttergraben, Gr. Hirschkanm, Schieferheide, Berggeist.
- Trollius europaeus* L. Altvater!, Petersteine!, und Oppaquellen (Oborny); Saugraben, Bärmuttergraben.
- Aquilegia vulgaris* L. Hutberg, bei der Tess u. a. O. bei Gr. Ullersdorf, Marschendorf, Philippsthal, Buchelsdorf, Neudorf.
- Aconitum lycoctonum* L. Im Kiesgraben (v. Uechtritz), im oberen Tessthale bei Wiesenberg, bei Wermsdorf, und zwar bei den Köhlerhütten u. a. O. und sonst in den Thälern und Schluchten des Hochgesenkes nicht selten (Oborny)!.  
 — *napellus* L. Saugraben, Bärmuttergraben, Kriech.  
 — *variegatum* L. Annaberg, Winkelsdorf, Wermsdorf, an der Tess bei Gr. Ullersdorf etc. (Oborny), Kiesgraben, Kleppel, Goldenfluss, Kl. Mohrau, Römerstadt, Irmsdorf.
- Actaea spicata* L. Wiesenberg etc. (Oborny), Petersdorf, Rabenseifen, Rudelsdorf, Zöptau, Marschendorf, häufig bei Gr. Ullersdorf, Kirchberg bei Neudorf, Beckengrund, D. Märzdorf, Wüst-Seibersdorf, Ludwigsthal, Reigersdorf, Pföhlwies, Kl. Mohrau, Wermsdorf, Rother Berg, Kiesgraben, Römerstadt, Podélskybach bei Irmsdorf, Odrau.
- Fumaria officinalis* L. Gemein, selbst noch bei Nikles, Kl. Mohrau und Römerstadt.
- Thlaspi arvense* L. Bei Gr. Ullersdorf, am 17. August und bei Römerstadt, am 4. September blühend.
- Capsella bursa pastoris* Mönch. Bei der Schäfererei.
- Lunaria rediviva* L. Abhänge des rothen Berges bei Winkelsdorf, bei Annaberg etc. (Oborny), Janowitz, Römerstadt, Podélskybach bei Irmsdorf, Gr. Stoll.
- Stenophragma Thalianum* Čelak. Trausnitz bei Petersdorf, Gr. Ullersdorf, Kl. Mohrau, Woitzdorf, Bautsch.
- Cardamine pratensis* L. a. *paludosa* Kraf. Ob. Fl. v. M. u. ö. S. p. 1172. Kl. Mohrau. — Im August blühend: bei Gr. Ullersdorf, D. Märzdorf, Grumberg, Kl. Mohrau, Dämmbaude, Petersteine (für letztere schon Oborny), Saugraben, Hirschbrunnen, Janowitz.  
 — *hirsuta* L. Gr. Ullersdorf (Oborny), Spitzberg, bei den Köhlerhütten u. a. O. im Merthathale bei Wermsdorf, Altvaterwald zwischen Grumberg und Nikles, hier in der Form *silvatica* Lamk. sp. Ob. Fl. v. M. u. ö. S. p. 1171.
- Turritis glabra* L. Zöptau, Marschendorf, Gr. Ullersdorf, Beckengrund, Wermsdorf, Kiesgraben, Kl. Mohrau, Römerstadt, Bautsch.

(Fortsetzung folgt.)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1887

Band/Volume: [037](#)

Autor(en)/Author(s): Formanec Ed.

Artikel/Article: [Beitrag zur Flora des nördlichen Mährens und des Hochgesenkes. 427-429](#)