

Beitrag zur Flora des nördlichen Mährens und des Hochgesenkes.

Von Dr. Ed. Formánek,

k. k. Professor am böhmischen Gymnasium in Brünn.

(Fortsetzung.)

Epilobium angustifolium Jacq. Gemein, selbst noch am Gipfel des Altvaters, des Bärenkamms, des Gr.-Hirschkamms. Var. *alpestris* mihi. Blätter derb, breit lanzettlich, in der Regel doppelt so breit, als am Typus, mitunter mit hervortretenden Querfalten, unterseits blau bereift. Blütenstand mehr oder weniger verkürzt. Zwischen der Schäferei und dem Altvater mit dem Typus, am Petersteine.

— *montanum* L. a. *subcordata* Hauskn. Ob. Fl. v. M. u. ö. S. p. 833. Trausnitz bei Petersdorf, Rother Berg im Gesenke; b. *latifolia* Hauskn. l. c. Zöptau, Gr.-Ullersdorf, Reigersdorf, Kriech, Römerstadt.

— *collinum* Gmel. Petersdorf, Zöptau, Marschendorf, häufig bei Gr.-Ullersdorf, Buchelsdorf, Neudorf, D.-Märzdorf, Wüst-Seibersdorf, Stollenhau, Reigersdorf, Aspendorf, Pföhlwies, Blauda, B.-Märzdorf, Grumberg, Kl.-Mohrau, Krondörfel, Wermsdorf, Kleppel, Rother Berg, Schlössel, Kriech, Kiesgraben, Janowitz, Grundwald und Perschl u. a. O. bei Römerstadt, Gundersdorf, Bautsch, Odrau.

— *trigonum* Schrank. Dämmbaude, Peterstein, Saugraben, Bärmuttergraben.

— *roseum* Schreb. Mähr. Schönberg, Gr.-Ullersdorf (Oborny), D.-Liebau, Petersdorf, Buchelsdorf, Ludwigsthal, Reigersdorf, Aspendorf, Blauda, Römerstadt, Bautsch.

— *obscurum* Schreb. Gr.-Ullersdorf, Buchelsdorf, Neudorf, Beckengrund, D.-Märzdorf, Aspendorf, Grumberg, Kl.-Mohrau, Römerstadt, Bautsch, Lautsch, Neudörfel, Odrau, hierher gehören die in d. Z. 1884, pag. 362, Zeile 20 und 21 von oben angeführten Standorte.

— *palustre* L. Badegrund, Karlsquelle und Moorwiesen hinter dem Bade bei Gr.-Ullersdorf (Oborny), D.-Liebau, Rabenseifen, Rudelsdorf, Zöptau, Marschendorf, Buchelsdorf, Beckengrund, Neudorf, D.-Märzdorf, Ludwigsthal, Stollenhau, Reigersdorf, Pföhlwies, Nikles, Počátky bei Krummwasser, Grumberg, Kl.-Mohrau, Krondörfel, Janowitz, Römerstadt, Bautsch, Wigstadtl, Odrau.

— *alsinefolium* Vill. Dämmbaude, Saugraben, Bärmuttergraben, Hirschbrunn (für den Hirschkamm etc. schon Oborny).

Circaea intermedia Ehr. Wermsdorf, Gr.-Ullersdorf, Waltersdorf (Oborny), Pföhlwies, B.-Märzdorf, Nikles, Altvaterwald, Dämm-

baude, Kriech, Kiesgraben, Hochwald bei Janowitz, Römerstadt, Odrau, Pohoř.

Circaea alpina L. Kiesgraben.

Sanicula europaea L. Nikles, Altvaterwald, Grumberg, Spitzberg u. a. O. bei Wermsdorf, Kriech, Scheuergrund bei Odrau, Lautsch.

Pimpinella saxifraga L. a. *nigra* Willd. Ob. Fl. v. M. u. ö. S. pag. 793. D. Liebau, Odrau; b. *dissecta* Presl l. c. Gr.-Ullersdorf, Beckengrund.

Heracleum sphondylium L. Gemein, selbst noch am Gr.-Hirschkamm.

Selinum carvifolia L. Bradlsteine, Krausenbüschel u. a. O. bei D.-Liebau, Gr.-Ullersdorf, bei den Köhlerhütten bei Wermsdorf.

Levisticum officinale L. Verwildert bei Beckengrund, cultivirt in Gärten bei D.-Liebau, Rudelsdorf, D.-Märzdorf, Stollenhau, häufig bei Auspendorf, B.-Märzdorf, Reutenhau.

Chaerophyllum aromaticum L. Reitendorf, Rabenseifen, Rudelsdorf, Zöptau, Marschendorf, Philippsthal, Wiesenberg, Buchelsdorf, häufig bei Gr.-Ullersdorf, Neudorf, Beckengrund, D.-Märzdorf, Stollenhau, Reitendorf, Reigersdorf, Auspendorf, Pföhlwies, Nikles, B.-Märzdorf, Berggeist, Kleppel, Römerstadt, Irmsdorf, Gundersdorf, Bautsch, Wigstadtl, Odrau, Schönau, Söhle.

— *hirsutum* L. Im Gesenke sehr häufig und fast in allen Bergschluchten hochgelegener Berge (Oborny); Bradlsteine, Krausenbüschel bei D.-Liebau, Rudelsdorf, häufig bei Gr.-Ullersdorf, Buchelsdorf, Neudorf, Beckengrund, D.-Märzdorf (Brünnel, Brandwald etc.), Wüst-Seibersdorf, Reigersdorf, Pföhlwies, Nikles, Altvaterwald, Goldenfluss, Kl.-Mohrau, Krondürfl, Blaschke, Wermsdorf, Kleppel, Rother Berg, Peterstein, Dämmbaude, Kriech, Kiesgraben, Hirschbrunn, Berggeist, Janowitz, Römerstadt, Podélský-Bach bei Irmsdorf, Gundersdorf, Bautsch, Wigstadtl, Lautsch, Odrau (Scheuergrund etc.).

Meum mutellina Gärt. Kl.-Seeberg, Horizontalweg von der Schäfererei zum Franz. Jagdhaus, Saugraben, Bärmuttergraben, Backofensteine.

Hedera helix L. Wild beim Mühlgraben in Marschendorf, Nikles, Altvaterwald.

Ribes grossularia L. Wild in Wäldern und Gebüsch. Rudelsdorf, Zöptau, Marschendorf, Philippsthal, Schwarze Steine und bei der Tess in Gr.-Ullersdorf, Ohrenberg u. a. O. bei Buchelsdorf, Beckengrund, Brünnel bei D.-Märzdorf, Pföhlwies, B.-Märzdorf, Nikleser Wald, Kl.-Mohrau, Merthathal bei Wermsdorf, Grundwald bei Römerstadt, Bautsch.

— *petraeum* Wolf. Am Horizontalwege zwischen den Petersteinen und dem Jagdhaus (Oborny)!, Kiesgraben (v. Uechtritz)!. Saugraben, Bärmuttergraben.

Chrysoplemium alternifolium L. Bürgerwald u. a. O. bei Mähr.-Schönberg, Angerwald bei Blauda und häufig in den Thälern des Ge-

senkes (Oborny), Gr.-Ullersdorf, Wermsdorf, Kleppel, Rother Berg, Peterstein, Berggeist, Janowitz, Römerstadt, Wigstadtl, Hirnich bei Neudörf, Odrau.

Sedum maximum Suter. Gemein in den Thälern des Gesenkes (Oborny), selbst noch am Ohrenberge bei Buchelsdorf und bei Kleppel, D.-Liebau, B.-Märzdorf, Nikles, Grumberg, Kl.-Mohrau, Wahlbergsdorf, Woitzdorf, Römerstadt, Irmsdorf, Bärn, Gundersdorf, Bautsch. Wigstadtl, Lautsch, Werdenberg, Odrau.

— *villosum* L. Grumberg, häufig auf einer Wiese nächst Počátky bei Krumwasser.

— *boloniense* Loisl. D.-Liebau, Gr.-Ullersdorf.

Sorbus aucuparia L. Verbreitet in der Gr.-Ullersdorfer, Kl.-Mohrauer, Römerstädter, Bautscher und Odrauer Gegend, selbst noch am Gipfel des Altvaters, Hohe Heide, Gr.-Hirschkamm, Saugraben, Bärmuttergraben, Schlössel.

Für die mit der grössten Bereitwilligkeit übernommene Bestimmung der im Gebiete eingesammelten Rosen spreche ich Herrn J. B. Keller an dieser Stelle meinen tiefgefühlten Dank aus.

Alpinae Crép.

Rosa pendulina L. Häufig und in zahlreichen Varietäten, deren Besprechung wir an anderer Stelle bringen. In Müllers Garten und auf der Wiese hinter dem Badeparke bei Gr.-Ullersdorf, Wüst-Seibersdorf, Nikleser Wald, Kl.-Mohrau, Goldenfluss, Hochwald u. a. O., bei Janowitz, Römerstadt, Podélsky-Bach und Fichten bei Irmsdorf.

Montanae Crép.

Rosa glauca Vill. Bei Kl.-Mohrau.

— *glauca* Vill. \times *R. lanceolata* Op.? Entschieden der f. *Graveti* Crép. (nach Orig. im Herb. Kell.) zunächst, aber als letzte wegen der unbekanntenen Blütenfarbe etc. fraglich. Ullersdorf-Neudorfer Strasse.

— *glauca* Vill. f. *complicata* (Gren.). Häufig, aber sehr veränderlich; a) typisch vom Hutberg bei Gr.-Ullersdorf; alldort b) etwas abweichend; c) in einer Schattenform bei Marschendorf, am Wege zum Mottenkopf; endlich vom letzten Orte in einer interessanten theils zur f. *myriodonta*, theils zur f. *inclinata* Kern. hinneigenden und einstweilen nur als *complicata* Gren. bestimmten Variation.


— *glauca* Vill. f. *myriodonta* Christ. Bei Römerstadt, am Hutberge bei Gr.-Ullersdorf.

Caninae Nudae Déségl.

Rosa albo-lutescens Rip. In einer Abänderung. Auf dem Hutberge bei Gr.-Ullersdorf.

- Rosa canina* L. f. *fallax* Pug. In einer Abänderung. Bei Neudorf.
 — *canina* L. f. *fissidens* Borb. monog. ros. hung. 1880. pp. 411
 et 413 bei Wüst-Seibersdorf.
 — *montivaga* Déségl., in einer f. *subvirens* Kell. et Wiesb. Oesterr.
 bot. Zeitschr. 1886, pag. 330 zunächst stehenden Abänderung.
 Bei Kl.-Mohrau.

(Schluss folgt.)



Flora des Etna.

Von Prof. P. Gabriel Strobl.

(Fortsetzung.)

- Funaria hygrometrica* (L.) Willd. Nebroden: Auf Mauern um Castelbuono von Dr. Mina-Palumbo, am Monte S. Angelo oberhalb Cefalù von mir gesammelt (det. Jur.); Etna (Herb. Torn.!), sehr gemein auf wüsten Stellen zwischen Lava bei Ognina (!, det. Jur.).
- Mielichhoferia nitida* Nees. Am Etna bei 6000', August 1873, (!, det. Jur.).
- Webera elongata* (Dicks.) Schw. In der Hochregion des Etna bei 6000' (!, det. Jur., aber mit?, weil ohne Früchte).
- *cruda* (Hdw.) Schmp. An felsigen Giessbachrändern des Etna hoch oberhalb der Casa del bosco bei 6000' mehrmals (!, det. Juratzka).
- Bryum torquescens* Br. et Schmp. Nebroden: Auf Hügeln um Castelbuono leg. Dr. Mina-Palumbo zugleich mit *Barb. vinealis*; ich fand es am Etna bei 6000' nicht selten und bei Amalfi in Süditalien (det. Jur.).
- *atropurpureum* W. M. Auf Mauern um Castelbuono leg. Dr. Mina-Palumbo (det. Jur.); ich fand es bei Pisa.
- *caespitium* L. Nebroden: Um Castelbuono von Dr. Mina-Palumbo häufig, von mir hoch oberhalb Castelbuono und an nassem Felsen des Monte S. Angelo oberhalb Cefalù sehr häufig gesammelt (det. Jur.); am Etna von 3000 bis 6000', besonders an der Südostseite häufig (!, det. Jur.).
- *capillare* L. *γ. meridionale* Br. et Schmp. Nebroden: Am Monte S. Angelo oberhalb Cefalù (!, det. Jur.); auf der Ost- und Nordostseite der Waldregion des Etna (!, det. Jur.); schon Raf. gibt *capillare* aus der Tief- und Waldregion des Etna an.

Ferner werden noch folgende Arten vom Etna angegeben:

- *pusillum* L. (Tief- und Waldregion nach Raf.), *argenteum* L., *pyriforme* L., *nutans* L. (ebenda nach Raf.), *sanguineum* Brd.? (bei 7900' am Etna von Philippi gefunden), *pendulum* Hornsch.? Von Lavafelsen und Mauern bei Acicastello notirt (Strobl).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1888

Band/Volume: [038](#)

Autor(en)/Author(s): Formanec Ed.

Artikel/Article: [Beitrag zur Flora des nördlichen Mährens und des Hochgesenkes. 55-58](#)