


nosa Stev., *Senecio barbaraefolius* Krock., *Lactuca saligna* L., *L. scariola* L., *Crepis setosa* Hall. fil., *Cr. foetida* L., *Cr. rhoeadifolia* M. B., *Xanthium spinosum* L., *Hyoscyamus niger* L., *Datura Stramonium* L., *Mentha Pulegium* L., *Verbena officinalis* L., die Amarylliden und Chenopodien etc. In Feldern finden sich *Nigella arvensis* L., *Delphinium consolida* L., *Papaver rhoeas* L., *Fumaria officinalis* L., *Silene gallica* L., *Hibiscus trionum* L., *Erodium cicutarium* L., die gelbblüthigen *Vicia*-Arten, *Lathyrus Aphaca* L., *Lath. Nissolia* L., *L. hirsutus* L., *Sambucus ebulus* L., *Sherardia arvensis* L., *Cirsium arvense* Scop., *Convolvulus arvensis* L., *Linaria spuria* Mill., *L. elatine* Mill. etc. In Brachfeldern treten noch besonders *Verbascum*-Arten und *Achillea nobilis* L. dazu. Bei den Wiesen kann ich Thal- und Hügelwiesen trennen, von ersteren noch trockene und nasse. Die trockenen Thalwiesen, ich habe dabei vorzüglich den Exercierplatz im Auge, beherbergen in einer kurzen Graskrume, die vorzüglich aus *Lolium perenne* L. bestehen dürfte, *Gypsophila muralis* L. in Unzahl, *Trifolium dalmaticum* Vis. und *Plantago*-Arten, nebst gruppenweisen Büscheln von *Eryngium campestre* L., *E. amethystinum* L., *Centaurea calcitrapa* L., *Xanthium spinosum* L. und *Euphorbia cyparissias* L.; hie und da sind noch auf günstigerem Boden eingestreut *Ranunculus acris* L., *Trifolium patens* Schreb., *Galega officinalis* L., *Seseli annuum* L., *Sambucus ebulus* L., *Dipsacus silvestris* Mill., *D. laciniatus* L., *Anchusa officinalis* L., *Verbascum phlomoides* L., *Verb. floccosum* W. K., *V. orientale* M. B., *V. Blattaria* L., *Rumex pulcher* L. sehr allgemein, *Alopecurus utriculatus* L., *Cynosurus echinatus* L., *Cynodon dactylon* Pers. und *Bromus*-Arten.

(Schluss folgt.)



Beitrag zur Flora des nördlichen Mährens, und des Hochgesenkes.

Von Dr. Ed. Formánek,

k. k. Professor am böhmischen Gymnasium in Brünn.

(Schluss.)

Caninae Biserratae Crép.

Rosa Carioti Chab. Selten, und nur in der var. *subeffusa* Gand. Tab. 1593 et Herb. ros. Nr. 303! Badegründ bei Gr.-Ullersdorf.

- *leiostyla* Rip. In einer Modification. Weg zur Karlshöhe.
- *oblonga* Déségl. et Rip., in Déségl. Cat. pag. 162, die in zwei verschiedenen Variationen vorliegt: a) *typica* von Liebesdorf, b) var. *oblongata* Opiz. Diese prächtige, hier wohl zuerst publicirte Opiz'sche Variation an der Oder bei Neudorf.

Rosa squarosa Rau. Kleppel.

- *dumalis* Bechst., Karlshöhe bei Gr.-Ullersdorf und etwas abgeändert bei Neudorf.
- *dumalis* f. *laxifolia* Borb. l. c. 422. Oder bei Neudörf, etwas abgeändert, der var. *rubens* Gandg. Tab. 1765 nahe stehend.
- *dumalis* f. *rubelliflora* Rip. In Odrau und etwas modificirt auf der Karlshöhe bei Gr.-Ullersdorf.
- *dumalis* f. *rubescens* Rip. Kleppel und Neudorfer Strasse.
- *brevipedunculata* Opiz. var. *fructibus parvis*. Nächst des Jägerhauses im Grundwalde bei Römerstadt.

*Caninae Pubescentes Crép.**Rosa urtica* Gren. f. *subglabra* Borb. l. c. Oder bei Neudörf.

- *urtica* Gren. f. *laxula* Gandgr. Tab. 2145. Badegrund bei Gr.-Ullersdorf.
- *dumetorum* Th. f. vers. *lunatam* Gandgr. Tab. 2572 et Herb. ros. Nr. 12. Grundwald bei Römerstadt.
- *solstitialis* Bess. Grundwald bei Römerstadt in zwei Modificationen.
- *coriifolia* Fries. *typica*. Bei Römerstadt.
- *coriifolia* Fr. f. *lucida* Bräucker in einer neuen Varietät. Badegrund bei Gr.-Ullersdorf, am Schwarzen Stein bei Gr.-Ullersdorf und bei Wüst-Seibersdorf.
- *coriifolia* Fr. f. *intermedia* Kit. Neudorf.
- *incana* Kitb. l. c. nicht selten! so um Irmsdorf, Gr.-Ullersdorf, auf Wiesen hinter dem Badepark bei Gr.-Ullersdorf, hier die f. *typica*, ebenso am Wege zur Karlshöhe, bei Grumberg, bei Wöitzdorf und bei Liebesdorf.
- *obtusifolio* \times *tomentella* Pug.? Bei Bautsch.

*Rubiginosae Sepiaceae Crép.**Rosa inodora* Fries. Auf der Karlshöhe bei Gr.-Ullersdorf.*Tomentosae Déségl.**Rosa cuspidatoides* Crép. (non Borb.). Nicht selten, namentlich bei Neudorf und Wüst-Seibersdorf.

- *cuspidatoides* Crép. β) *minor* Scheutz in Studier 1872, p. 37 = Crép. in Primit. Fasc. II, pag. 243 = (127)! Synon. = *R. cuspidatoides* Crép. f. *silesiaca* Gandgr. Tab. rhod. Nr. 4041. Bei Kl.-Mohrau und Krondörf.
- Agrimonia eupatoria* L. Petersdorf, Reitendorf, Karlshöhe u. a. O. bei Gr.-Ullersdorf, Wermsdorf, Pföhlwies, Nikles, Odrau, Söhle.
- Sanguisorba officinalis* L. D.-Liebau, Petersdorf, Zöptau, Philippsthal, Wiesenberg, Gr.-Ullersdorf, Neudorf, Ludwigsthal, Stollenbau, Asperndorf, Pföhlwies, Blauda, B.-Märzdorf, Nikles, Grumberg, Goldenfluss, Kl.-Mohrau, Blaschke, Römerstadt, Gundersdorf, Bautsch, Kl.-Wermsdorf, Lautsch, Werdenberg, Odrau.

- Poterium sanguisorba* L. D.-Liebau, Bautsch, Wigstadtl, Odrau.
- Alchemilla vulgaris* L., var. *montana* Willd. Neudorf, Beckengrund, Grumberg, Kl.-Mohrau, Römerstadt, var. *glabrata* Wimm. Bei der Tess in Gr.-Ullersdorf, Saugraben, Gr.-Hirschkamm.
- *arvensis* Scop. Bautsch, Wigstadtl, Odrau.
- Geum rivale* L. Goldenfluss, Kl.-Mohrau, Krondörfli, Blaschke, Wermsdorf, Kleppel, Dämmbaude, Saugraben, Hochwald bei Janowitz, Grundwald u. a. O., bei Römerstadt, Irmsdorf.
- Potentilla tormentilla* Schrank. Gemein im b. G.
- *aurea* L. Franz. Jagdhaus, Maiberg, Hirschkamm etc. (Oborny), Auerhahnbaude, Horizontalweg von der Schäferei zum Franz. Jagdhaus, Saugraben, Schlössel, Schieferheide, Backofensteine, Gipfel des Hofberges.
- *recta* L. var. *obscura* Willd. Ob. Fl. v. M. u. ö. Sch. p. 950, Bautsch, Wigstadtl, Odrau.
- Rubus saxatilis* L. Brauseifen, Janowitz, Römerstadt.
- *idaeus* L. Gemein, var. *armata* mihi. Pflanze niedriger, Schösslinge besonders auf der unteren Seite mit haarfeinen Stacheln dicht besetzt. Dies die Form hügeliger Gegenden, besonders aber des Hochgebirges. Neureisch (1884), Kellig.
- *plicatus* Wh. et N. Gr.-Ullersdorf, Wermsdorf, Marschendorf, Zöptau etc. (Oborny), Neudorf, Nikles, Kl.-Mohrau, Woitzdorf, Römerstadt, Gundersdorf, Bautsch, Wigstadtl, Hirnich bei Neudörfli, häufig bei Odrau.
- *hirtus* W. Kit. D.-Märzdorf, Wüst-Seibersdorf, Wermsdorf, Römerstadt, Irmsdorf, Bautsch (Viehwald, Buschwald etc.), Scheuergrund u. a. O. bei Odrau.
- *caesius* L. f. *arvalis* Rehb. Von Bärn bis Odrau verbreitet.
- Spiraea aruncus* L. Stellenweise im Barth-Thale von Neu-Ullersdorf bis oberhalb Goldenstein (Oborny). Bei der Tess im Schlossparke u. a. O. bei Gr.-Ullersdorf, bei der Tess und im Aufstiege zu dem Mottenkopfe bei Marschendorf, Philippsthal, Zöptau, Hochwald bei Janowitz, Römerstadt, Podélský-Bach bei Irmsdorf.
- *ulmaria* L. a) *denudata* Presl. Fl. Cech. Gemein im b. G. b) *discolor* Celak. Im Angerwalde und auf Wiesen zwischen Blauda und M.-Schönberg nicht selten (Oborny), Rabenseifen, Reitendorf, Gr.-Ullersdorf, am Wege nach Ludwigsthal, Odrau.
- Cytisus supinus* L. (= *C. capitatus* Jacq.) Ob. Fl. v. M. u. ö. Sch. p. 991. Bautsch, Wigstadtl, Kl.-Hermsdorf, Lautsch, Hirnich bei Neudörfli, Odrau, Pohoř, Werdenberg.
- Genista tinctoria* L. In den wärmeren Lagen des b. G. verbreitet.
- *germanica* L. Liebesdorf, D.-Liebau, Gundersdorf, Bautsch, Wigstadtl, Lautsch, Werdenberg, Odrau, Pohoř.
- Lupinus luteus* L. Verwildert und dem Anscheine nach eingebürgert am Spitzberge bei Wermsdorf.
- Ononis spinosa* L. Werdenberg, Odrau.

Trigonella coerulea Ser. Cultivirt in Gärten bei Gr.-Ullersdorf und Wüst-Seibersdorf.

Trifolium agrarium Pollich. Am Rothen Berge.

— *montanum* L. Liebesdorf, D.-Liebau, Petersdorf, Rabenseifen, Rudelsdorf, Zöptau, Gr.-Ullersdorf, Wigstadtl, Neudörfel, Odrau.

— *arvense* L. Rother Berg.

— *medium* L. Petersdorf, Zöptau, Marschendorf, häufig bei Gr.-Ullersdorf, Neudorf, Reigersdorf, Nikles, Kl.-Mohrau, Janowitz, Römerstadt.

Anthyllis vulneraria L. Karlshöhe bei Gr.-Ullersdorf.

Astragalus glycyphyllus L. Petersdorf, häufig bei Zöptau und Gr.-Ullersdorf, Marschendorf, Neudorf, Beckengrund, Ludwigsthal, Kleppel, Lautsch, Hirnich bei Neudörfel, Scheuergrund u. a. O. bei Odrau.

Vicia sativa L. Verbreitet im b. G., selbst noch bei Kl.-Mohrau und Römerstadt.


— *sepium* L. Verbreitet im b. G.

— *cracca* L. Zöptau, Marschendorf, Wiesenberg, Winkelsdorf, Gr.-Ullersdorf, Neudorf, D.-Märzdorf, Wüst-Seibersdorf etc.

— *hirsuta* Koch. Zöptau, Gr.-Ullersdorf, Neudorf, Nikles, Grumberg, Kl.-Mohrau, Woitsdorf, Bautsch, Odrau.

Lathyrus sylvestris L. Auf den Oderwiesen bei Waltersdorf bei Gr.-Ullersdorf etc. (Oborny), Bradlsteine bei D.-Liebau, Petersdorf, Rabenseifen, Ludwigsthal, Stollenhau, Reigersdorf, Gundersdorf, Viehwald bei Bautsch, Wigstadtl, Kl.-Hermsdorf, Galgenbusch u. a. O. bei Odrau.

— *vernus* Bernh. Verbreitet in der Gr.-Ullersdorfer, B.-Märzdorfer und Odrauer Gegend.



Flora des Etna.

Von Prof. P. Gabriel Strobl.

(Fortsetzung.)

Hypnum purum L. Nebroden: In der unteren Berghälfte des Monte Elia bei Cefalù auf feuchten Abhängen häufig (!, det. Jur.).

— *filicinum* L. Von Raf. in der Tief- und Waldregion des Etna angegeben.

— *cupressiforme* L. Etna: In der Tiefregion um Mascalucia und Massanunziata, im Februar fruchtend (Herb. Torn.!). Nebroden: Madonie (Herb. Guss., determ. Jur.), bei den Russelli oberhalb Castelbuono (leg. Dr. Mina-Palumbo, determ. Jur.), in der Waldregion oberhalb Castelbuono, am Monte S. Angelo oberhalb Cefalù, von Ferro gegen den Passo della Botte, 5500', an Bachrändern im Piano della Battaglia und gegen die Fosse di San Gandolfo, 6000' (!, det. Jur.).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1888

Band/Volume: [038](#)

Autor(en)/Author(s): Formanec Ed.

Artikel/Article: [Beitrag zur Flora des nördlichen Mährens und des Hochgesenkes. 92-95](#)