

Ueber *Vaccinium uliginosum* L. var. *globosum* et *tubulosum* Baenitz.

In Lieferung XX unter Nr. 1914 und 1915 des Herbarium Europaeum gab ich die beiden in der Ueberschrift genannten Varietäten des *Vaccinium uliginosum* L. aus und publicirte gleichzeitig im Prospect 1874 in gedrängter Kürze die dazu gehörige Diagnose. In späteren Jahren untersuchte ich wiederholt das „Wickbolder Torfmoor“, die Fundstelle beider Varietäten, konnte jedoch nur das *Vaccinium uliginosum* L. var. *globosum*, die dort vorherrschende Varietät, beobachten. Die seltenere *Vaccinium uliginosum* L. var. *tubulosum* fand ich jedoch nicht wieder. Jedenfalls hatte die auf dem „Wickbolder Torfmoor“ sehr intensiv betriebene Torfstecherei den zuerst gefundenen Standort vernichtet.

Meine gestrige Excursion wurde endlich von Erfolg gekrönt, denn ich fand das seit 1873 vergeblich gesuchte *Vaccinium uliginosum* L. var. *tubulosum* in sehr schönen Blütenexemplaren an zwei Stellen auf quadratmetergrossen Flächen, ganz reine, leicht erkennbare Bestände bildend.

Nachfolgende Uebersicht gibt die unterscheidenden Merkmale beider Varietäten, welche auf den norddeutschen Torfmooren, resp. Hochgebirgsmooren, jedenfalls verbreitet sind.

| <i>Vaccinium uliginosum</i> L. var. <i>globosum</i> Baenitz. | <i>Vaccinium uliginosum</i> L. var. <i>tubulosum</i> Baenitz. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Strauch 30—50 Cm. hoch. | 1. Strauch 1 M. hoch und darüber. |
| 2. Blätter dunkelgrün, kurz, eirund oder verkehrt eiförmig, vorn abgerundet, abgestutzt oder ausgerandet. | 2. Blätter hochgrün, lang, elliptisch, stets lang zugespitzt. |
| 3. Blüten stets gehäuft. | 3. Blüten einzeln, selten zu 2 oder 3. |
| 4. Blumenkrone klein, kugelig , meist roth, zuweilen weissröthlich gefärbt. | 4. Blumenkrone gross, röhrenförmig , stets weiss gefärbt, etwas ins Gelbliche übergehend. |

Da ich die Stellen, von welchen ich zahlreiche Exemplare sammelte, genau markirt habe, so werde ich, falls bei den vollständig entwickelten Blättern und Früchten noch andere unterscheidende Merkmale auftreten sollten, diese später in dieser Zeitschrift veröffentlichen. Jedenfalls kommen beide Varietäten in den Jubiläums-Lieferungen des Herbarium Europaeum im October d. J. zur neuen Ausgabe.

Königsberg in Pr., den 1. Juni 1891.

C. Baenitz.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1891

Band/Volume: [041](#)

Autor(en)/Author(s): Baenitz C.

Artikel/Article: [Ueber Vaccinium uliginosum L. var. globosum et tubulosum Baenitz. 236](#)