Flora von Oesterreich-Ungarn.

A. Referate.

I. Niederösterreich.[1])

Referent: **H. Braun** (Wien).

(Schluss.[1])

6. *A. campestre* var. *Austriacum* (Tratt.) Archiv der Gewächskunde p. 1, Tab. 6 (1812). — *A. campestre γ. Austriacum* Tratt. in D. C. prod. 1, p. 594 (1824). — *A. campestre ζ. acutilobum* (α) Tausch in Flora XII, p. 547 (1829) non Opiz in Flora VII. 1. Beilage p. 82 (1824). — Nicht gemein, auf den Donauinseln hin und wieder, an der Schwechat bei Lanzendorf, bei Mautern, die var. *microcarpon* Masner, Flora VII, 1. Beilage, p. 82, (1824). — *A. campestre* var. *δ. microcarpum* Tausch in Flora XII, p. 547 (1829), selten, auf den Donauinseln hin und wieder (12).
7. *Acer campestre* var. *hederifolium* H. Braun, *Acer campestre η. integrilobum* Tausch in Flora VII, p. 547 (1829) p. p., höchst auffallende Form, dem *A. quinquelobatum* Masner entsprechend, Donauinseln bei Wien, höchst selten (12).
8. *Acer campestre* var. *collinum* (Wallr.) D. C. Prod. 1. p. 594 (1824). — *A. orthopteron* Masner in Flora VII. 1. Beilage, p. 83 (1824). Naturalien-Tausch p. 49 (1824). — *A. Austriacum* Opiz in Flora VII, p. 82 (1824). — Sehr gemein, besonders auf den Donauinseln, im Marchfelde, Waldviertel, gemein an Rändern der Gehölze der südöstlichen Ebene (12).
9. *Acer campestre* var. *affine* (Opiz) in Flora VII. 1. Beilage p. 83 (1824). Höchst selten bei Weitra, Zwettl, um Wien bisher nicht beobachtet (12).
10. *Acer campestre* var. *eriocarpon* Wallr. sched. crit. p. 188 (1822). Selten, im Marchfelde (12).
11. *Acer campestre* v. *quinquelobatum* Masner, in Fl. VII, 1. Beilage p. 83 (1824). Opiz, Naturalien-Tausch p. 114 (1824). — *A. campestre η. integrilobum* Tausch, in Flora VII, p. 547 (1829). Gebüsche im oberen Donauthale, höchst selten (12).
12. *Acer campestre* var. *molle* (Opiz) in Flora VII. 1. Beilage p. 83 (1824). — *A. campestre ε. mollissimum* Tausch, in Flora XII, p. 547 (1829). — *A. campestre* var. *lasiophyllum* Wimmer. Fl. von Schlesien p. 365 (1827). p. max. p. Zerstreut im Prater bei Wien, besonders schön, am Kahlenberge bei Wien, auf der südöstlichen Ebene hie und da, bei Mautern, im Waldviertel bei Gmünd, Weitra, Zwettl (14).

---

[1]) Vergl. Nr. 7. S. 255.

13. ***Acer campestre*** var. ***hebecarpum*** D. C. Prod. I. p. p. 594 (1824). — *A. eriocarpum* Opiz, in Fl. VII. 1. Beilage p. 83 (1824). Gemein, z. B. auf den Donauinseln, in den Leitha-Auen etc. (12).
14. ***Acer campestre*** L. var. ***genuina*** L. sp. plant. ed. I, p. 1055 (1753). Höchst gemein, z. B. Donauinseln, südöstliche Niederung, March- und Leitha-Auen etc. (12).

Callitriche vernalis Kütz. In Waldlachen am Leithagebirge (8).

Epilobium Darreri C. Richter (*E. anagallidifolium* × *alsinefolium*). (Vgl. Hausskn. in Focke Pflmischl. S. 161) Unter den Stammeltern auf der Raxalpe (7).

Lythrum virgatum L. Bei Mannersdorf (8).

Rosa subglobosa Sm.[1]) Mittelzone des Leithagebirges (8). — *R. eriostyla* Rip. et Déségl. Um Mannersdorf (8). — *R. comosa* Rip. Mannersdorf (8). — *R. apricorum* Rip. Mannersdorf (8). — *R. Jundzilliana* f. *reticulata* A. Kerner. Waldwege von Mannersdorf gegen Burbach (8).

Potentilla Vindobonensis Zimmeter. Bei Mannersdorf (8).

Rubus suberectus Anders. Mannersdorf am Leithagebirge (8 et 9). — *R. plicatus* Weihe et Nees (*R. fruticosus* L. teste Halácsy). Wälder bei Mannersdorf (8). — *R. sulcatus* Vest; bei St. Pölten (9). — ***R. senticosus*** Koehler. Am Muglerberge bei Rossatz (9). — *R. bifrons* Vest. Kottes, Rossatz (9). — *R. discolor* Wh. et N. Neustadt bis Pitten, Gloggnitz, Semmering (9). — *R. macrostemon* Focke. Vorhölzer bei Mannersdorf und Hof (8). ***R. rhombifolius*** Weihe. Wälder bei Pitten (9). — *R. macrophyllus* Wh. et N. Hainburg (9). — *R. quadicus* Sabransky. Rehgraben bei Gloggnitz (9). — ***R. styriacus*** Halácsy, „Oesterr. botan. Zeitschr." 1890. Bei Kranichberg. — *R. pyramidalis* Kaltenb. Waldgraben bei Mannersdorf (8 et 9). — *R. Radula* Weihe. Bei Mannersdorf in einer Form mit länger gestielten Blättchen (8). — ***R. denticulatus*** *β.* ***chloroxylon*** Halácsy. Am Semmering zwischen Küb und Klamm. — ***R. Koehleri*** Wh. et N. Bei Gmünd (9). — ***R. Bellardi*** Wh. et K. Bei St. Pölten (9). — ***R. Vindobonensis*** Sabransky et Braun, foliis reticulato-pubescentibus insignis; var. ***trichogynis*** Borb., ovariis dense hirtis, bei Neuwaldegg (13); var. ***subdiclinus*** Borbás, ovariis item hirtis staminibus pauciserialibus stylis abbreviatis, ebendort (13). — ***R. lamprophyllus*** Gremli. Wälder am Eichberg bei Gloggnitz (9). — ***P. lamproleucus*** Borb. et Sabr., *R. lamprophyllus* × *tomentosus*. Eichberg bei Gloggnitz (L. Keller); durch unterseits silberweiss schimmernde filzige Blätter hauptsächlich von *R. glandulosus* Boll. oder *R. hirtus*

---

[1]) Die ungemein zahlreichen Standortsangaben und die für Niederöster reich neuen Formen der Gattung *Rosa*, welche mir bislang bekannt sind werden in einer separaten Arbeit erscheinen. Braun.

W. et K. verschieden; auf der Oberseite der obersten Blätter wenige Spuren von Sternhaaren. Inflorescenz rothdrüsig (13). — *R. erythrostachys* Sabransky. Gloggnitz, Neuwaldegg, am Nebelstein an der böhmisch-niederösterreichischen Grenze (9). — ***R. subsessilis*** Halácsy. Laubwälder auf dem Kahlengebirge bei Wien (9). — ***R. Vestii* × *caesius*** Halácsy. Auf dem Kahlengebirge bei Wien (9).

Lathyrus gramineus A. Kerner. Neuwaldegg bei Wien, *L. Nissolia* Kovats Exsicc. von L. (7).

Thesium montanum Ehrh. Bei Kaisersteinbruch (8).

Limosella aquatica L. Lachen am Leithagebirge (8).

Melissa officinalis L. Um Steinbrüche bei Mannersdorf (8). — *Mentha parietariaefolia* Becker. Mannersdorf und Hof.

Galium erectum Huds. Mannersdorf (8).

Gnaphalium luteo-album L. Wälder bei Mannersdorf (8). — *Hieracium umbelliferum* Näg. et Pett. Häufig am Leithagebirge (8). — *Rudbeckia laciniata* L. In der Umgebung des Schlossparkes bei Bruck a. d. Leitha (8).

Namensänderungen.

Potentilla verna L. p. p. = ***P. Tabernaemontani*** Aschers. (10). — *P. arenaria* Borkh. = ***P. cinerea*** Chaix, subsp. ***incana*** (Flora d. Wett.) Aschers. (10).

Rubus suberectus Anders. (1815) = ***R. nessensis*** W. Hall. (1794). (9.) — *R. thysoideus* Wimmer (1841) = ***R. montanus*** Lib. (1813). (9.) — *R. candicans* × *sulcatus* Halácsy (*R. incertus* Halácsy) = ***R. montanus* × *sulcatus*** Halácsy (9). — *R. candicans* vel *thyrsoideus* × *tomentosus* (*R. polyanthus* P. J. Müller) = ***R. montanus* × *tomentosus*** Halácsy (9). — *R. megathamnus* A. Kerner (*bifrons* × *tomentosus*) = ***R. anomalus*** P. J. Müller (9). — *R. epipsilos* Hal. et Braun. Nachträge zur Flora von Niederösterreich = ***R. cetius*** Halácsy (9). — *R. Carpathicus* Sabransky in „Oesterr. botan. Zeitschr.“ 1887, non Borb. et Sabransky in Verh. der k. k. zool.-botan. Gesellsch. 1886 = ***R. inaequalis*** Halácsy (9). — *R. melanoxylon* Hal. et Braun. Nachträge zur Flora von Niederösterreich, non P. J. Müller = ***R. pseudomelanoxylon*** Halácsy (9). — *R. melanoxylon* Halácsy in Verh. der k. k. zool.-botan. Gesellsch. 1885, non P. J. Müller = ***R. denticulatus*** A. Kerner (9). — *R. candicans* × *vestitus* Halácsy (*R. villosulus* Halácsy) = ***R. montanus* × *leucostachys*** Halácsy (9). — *R. Koehleri* Richter in Verh. der k. k. zool.-botan. Gesellsch. 1887, non Wh. et N. = ***R. vestitifolius*** Fritsch (9). — *R. rudis* Halácsy et Braun. Nachträge zur Flora von Niederösterreich = ***R. amplus*** Fritsch (9). — *R. pauciflorus* Halácsy non Wall. = ***R. tectiflorus*** Halácsy (14). — *R. Koehleri* Halácsy et Br.

Nachträge zur Flora von Niederösterreich = ***Rubus Gremlii*** Focke + ***R. Koehleri*** v. ***bavaricus*** Focke (9). — *R. Koehleri* Halácsy in Verh. der k. k. zool.-botan. Gesellsch. (1885) non Wh. et Nees = ***R. foliolosus*** Halácsy (9), non Don. = ***R. foliolatus*** Halácsy (14). — ***R. calyculatus*** Richter. non Kaltenb. = *R. Bellardi β.* ***subalpinus*** Halácsy (9). — *R. candicans* × *hirtus* (*R. debilis* Halácsy) = ***R. montanus*** × ***hirtus*** Halácsy (9). — *R. caesius* × *candicans* Lasch (*R. Laschii* Focke) = ***R. montanus*** × ***caesius*** Halácsy (9).

Thesium humile Aut Austriac. non Vahl = ***T. Dollineri*** Murbeck (11).

II. Salzburg.[1])

Referent: **Dr. Karl Fritsch** (Wien).

Quellen:

a) Literatur.

1. Dalla Torre K. W. v. Beitrag zur Flora des Rauriserthales. Aus dem Nachlasse von Prof. Dr. J. Peyritsch. Der Tourist. 1891. pag. 52.
2. Glaab L. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Formen von *Spiraea Ulmaria* L. Deutsche botan. Monatsschrift 1891. pag. 40.
3. Halácsy E. v. Oesterreichische Brombeeren. Verhandlungen der k. k. zoolog.-botan. Gesellschaft in Wien. 1891. Abhandlungen pag. 197.
4. Schiffner V. Monographia Hellebororum. Nova Acta Leop. Carol. Acad. LVI.
5. Stephani F. Die Gattung *Lejeunea* im Herbarium Lindenberg. Hedwigia 1890.
6. Wiesbaur J. B. und Haselberger M. Beiträge zur Rosenflora von Oberösterreich. Salzburg und Böhmen. Linz 1891.
7. Zukal H. *Epigloea bactrospora.* Oesterr. botan. Zeitschrift 1890. pag. 323.

b) Unveröffentlichte Mittheilungen:

8. von Herrn Dr. G. Beck v. Managetta. — 9. von Fräul. M. Eysn. — 10. von Herrn Hofrath Dr. A. Kerner von Marilaun.

Neu für das Gebiet:

Flechten:

Epigloea bactrospora Zukal. Bei Radstadt (leg. Heimerl, 7).

---

[1]) Das Referat bezieht sich in Bezug auf Blüthenpflanzen auf die Zeit vom 1. December 1890 bis 1. Juni 1891, in Bezug auf Sporenpflanzen auf das Jahr 1890. Rabenhorst's Kryptogamenflora wird nicht excerpirt.

Moose:

Lejeunea calcarea Lib. var. *minus papillosa*. Pinzgau (leg. Sauter, 5).

Blüthenpflanzen.

Helleborus niger L. var. *altifolius* (Hayne) „Salzburg" (4).

Stellaria Friesiana Ser. Hollerbrandwald ober Markt Rauris, circa 1100 M. (leg. Eysn, vidi exsicc.! 9).

Rosa silvestris Herm. b) *subatrata* J. B. Kell. Zwischen Lofer und der Loferer Alm (leg. Haselberger, 6). — *Rosa cinnamomea* L. „forma foliis angustissimis oblongo-ellipticis". Schafberg 6—700 M. (leg. R. Hinterhuber, 6). — *Rosa cinnamomea* L. var. *supraglabra* (Wallr.) „forma . . . ?" Schafberg, Kalkfelsen 6—700 M. (leg. R. Hinterhuber, 6). — „*Rosa alpina* L. *atrichophylla*." Bei Lofer (leg. Haselberger, 6). — *Rosa pendulina* L. f. *atrichophylla* Borb. Lofer, Loferer Alm (leg. Haselberger, 6). — *Rosa adenophora* (Kit.) var. *leioneura* Borb. f. *seticalyx* (Gdgr.) Lofer (leg. Haselberger, 6). — *Rosa rubrifolia* Vill. var. *glaucescens* Wulf. foliis-ellipticis. Mauterndorf (leg. v. Kerner 6). — ***Rosa Duftschmidii*** Kell. et Haselberger. „Salzburg" 6). — *Rosa micrantha* Sm. f. *nemorosa* Lib. (teste H. Braun) Lichtenberg bei Saalfelden (leg. v. Kerner, 10). — *Rosa tomentosa* L. var. *pellita* (Rip.) f. *oblongifolia* Wallr. Zwischen Lofer und der Loferer Alm (leg. Haselberger, 6). — *Rosa tomentosa* L. var. *Seringeana* (Du Mort). Zwischen Lofer und der Loferer Alm (leg. Haselberger, 6). — *Rubus polyacanthus* Gremli. Bei Aigen (leg. Stohl, 3). — *Filipendula Ulmaria* (L.) var. *cinerea* Glaab. Bei Salzburg häufig (2).

Bemerkenswerthe neue Standorte:

Agrostis alpina Scop. Rauriser Goldberg (1). — *Festuca pumila* Vill. Rauriser Goldberg (1).

Carex curvula All. Rauriser Goldberg (1). — *Carex flava* L. Pochhardscharte (1).

Tofieldia calyculata (L.) Kolm-Saigurn (1).

Veratrum Lobelianum Bernh. Kolm-Saigurn (1).

Coeloglossum viride (L.) Kolm-Saigurn (1). — *Herminium Monorchis* (L.) Lichtenberg bei Saalfelden (10). — *Cephalanthera rubra* (L.) Lichtenberg bei Saalfelden (10).

Juniperus nana Willd. Rauriser Goldberg (1).

Alnus viridis (Chaix) Kolm-Saigurn (1).

Salix retosa L. Kolm-Saigurn (1).

Erigeron uniflorus L. Bernkogl bei Rauris (1). — *Achillea Clusiana* Tausch. Bernkogl bei Rauris (1). — *Gnaphalium Leontopodium* L. Bernkogl bei Rauris; Herzog Ernst (1). — *Senecio Doronicum* L. Bernkogl bei Rauris (1). — *Cirsium eriophorum* (L.) Bernkogl bei Rauris (1). — *Cirsium spinosissimum* (L.) Bernkogl bei Rauris, Pochhardscharte (1). — *Saussurea alpina* (L.)

Bernkogl bei Rauris (1). — *Taraxacum alpinum* (Hoppe). Bernkogl bei Rauris, Goldberg (1). — *Crepis grandiflora* Tausch. Herzog Ernst (1).

Campanula pusilla Hke. Kolm-Saigurn (1).

Gentiana prostrata Hke. Bernkogl bei Rauris (1). — *Gentiana nivalis* L. Kolm-Saigurn (1). — *Gentiana glacialis* Thom. Bernkogl bei Rauris (1).

Stachys alpina L. Lichtenberg bei Saalfelden (10). — *Betonica Jacquini* Gr. et Godr. Lichtenberg bei Saalfelden (10).

Myosotis alpestris Schm. Bernkogl bei Rauris, Goldberg (1).

Veronica alpina L. Rauriser Goldberg, Pochhardscharte (1).

Euphrasia minima Jacq. Rauriser Goldberg, Pochhardscharte (1).

Pirola uniflora L. Kolm-Saigurn (1).

Sedum annuum L. Rauriser Goldberg (1). — *Sedum repens* Schl. Bernkogl bei Rauris (1).

Saxifraga patens Gaud. (*aizoides* × *caesia*). Am Bockenargletscher im Fuscherthale (8).

Ranunculus glacialis L. (*Oxygraphis vulgaris* Freyn). Die einzige phanerogame Pflanze auf der Spitze des Sonnblick (3100 M.) (1).

Arabis coerulea (All.) Rauriser Goldberg, Silberpfennig (1). — *Draba tomentosa* Wahlenb. Bernkogl bei Rauris, Kolm-Saigurn (1). — *Hutchinsia alpina* (L.) Bernkogl bei Rauris, Kolm-Saigurn (1). — *Hutchinsia brevicaulis* Hoppe. Rauriser Goldberg, Herzog Ernst; Pochhardscharte (1).

Helianthemum alpestre (Jacq.) Bernkogl bei Rauris (1).

Viola biflora L. Kolm-Saigurn (1).

Cerastium trigynum Vill. Rauriser Goldberg (1). — *Cerastium longirostre* Wich. (*C. triviale* var. *alpinum* Koch). Rauriser Goldberg (1). — *Cerastium strictum* Hke. Rauriser Goldberg (1).

Empetrum nigrum L. Kolm-Saigurn (1).

Epilobium alsinefolium Vill. Pochhardscharte (1).

III. Kärnten.[1])

Referent: **Dr. Karl Fritsch.**

Literatur.

1. V. v. Borbás. Notiz. „Oesterr. botan. Zeitschr.“ 1891. pag. 149.
2. E. v. Halácsy. Oesterreichische Brombeeren. Verhandlungen der k. k. zoolog.-botan. Gesellschaft in Wien. 1891. Abhandlungen pag. 197.
3. A. Hansgirg. Ueber neue Süsswasser- und Meeres-Algen und Bacterien. Sitzungsber. d. kgl. böhm. Ges. d. Wiss. Math. nat. Cl. 1890. I. pag. 3.

[1]) Das Referat bezieht sich in Bezug auf Blüthenpflanzen auf die Zeit vom 1. December 1890 bis 1. Juni 1891, in Bezug auf Sporenpflanzen auf das Jahr 1890. Rabenhorst's Kryptogamenflora wird nicht excerpirt.

4. A. Hansgirg. Physiologische und algologische Mittheilungen Ebenda 1890. II. pag. 83.
5. S. Murbeck. Beiträge zur Kenntniss der Flora von Südbosnien und der Hercegovina, Lunds Universitets Arsskrift, Tom. XXVII. 1891.
6. V. Schiffner. Monographia Hellebororum. Nova Acta Leop. Carol. Acad. LVI.
7. R. v. Wettstein. Untersuchungen über die Section „*Laburnum*" der Gattung *Cytisus*. „Oesterr. botan. Zeitschrift" 1891.
8. J. Wiesbaur. Recension. (Vgl. diese Zeitschrift pag. 93.)

Algen:

Quelle 4 ist für die Algenflora des Landes geradezu als grundlegend zu betrachten und wurde daher nicht excerpirt.

Quelle 3 enthält:

Oocystis pusilla Hansg. Bei St. Martin. — ***Gloetaenium Loitlesbergerianum*** Hansg. Ebendaselbst. — ***Microcoleus hospita*** Hansg. Am Ossiacher See bei Villach.

Blüthenpflanzen.

Rumex angiocarpus Murbeck. Wiesen bei Friesach (leg. Rechinger, 5).

Gentiana lutea L. subsp. ***symphyandra*** Murbeck. Alpen um Malborgeth (leg. Ressmann, 5).

Mentha pubescens W. et var. *viridior* Borb. Bei Tiffen (leg. Pacher, 1). — *Mentha Schleicheri* Opiz. Moosgraben bei Tiffen (leg. Pacher, 1).

Saxifraga Pacheriana Wiesb. = *S. caesia* × *squarrosa* (8).

Helleborus odorus Kit. Predil (leg. Willkomm, 6).

Rubus leucostachys Schleich. Bei Trentschach nächst Klagenfurt (leg. Krenberger, 2).

Rubus carinthiacus Halácsy. Zwischen Villach und St. Ruprecht (leg. Witting, 2). — ***Rubus Wittingii*** Halácsy. Eichholzgraben bei Villach (leg. Witting, 2).

Cytisus alpinus Mill. var. *macrostachys* Endl. Am Raibler See (leg. Wettstein, 7). — *C. a.* var. ***microstachys*** Wettst. Raibl (leg. Wettstein, 7).

IV. Schlesien.[1])

Referent: **E. Fiek** (Cunnersdorf).

Quellen:

1. Kotula, A. Manuscript über neue Funde im Teschener Gebiete.

---

[1]) Das Referat bezieht sich auf den Zeitraum vom 1. Juni 1890 bis 1. Juni 1891.

2. Wetschky, M. Beobachtungen in der Troppauer Gegend. Manuscript.
3. Hellmann, R. Einige Pflanzen des Gesenkes.

1. Für das Gebiet neu:

Naias minor All. Teschen: Olschiner Teiche (1). — *Potamogeton obtusifolius* M. et K. Teschen: Olschiner Teiche, in einem Graben bei Station Chiby (1).
Eragrostis minor Host. Teschen: Wegränder an der Sodafabrik bei Petrowitz (1).
Scirpus mucronatus L. Teschen: Nasse Aecker und Gräben westlich der Station Chiby (1).
Chenopodium opulifolium Schrad. Oderberg: Am Bahnhofe (1).
Elatine triandra Schk. Teschen: Eisenbahngräben im Chibyer Walde (1).
Epilobium Lamyi F. W. Schz. Teschen: Bei der Station Chiby (1).
Falcaria vulgaris Bernh. Teschen: Mönnichhof (1).

2. Wichtigere neue Standorte:

Salvinia natans All. Freistadt: Darkauer Teiche (1).
Botrychium Matricariae Spr. mit *B. matricariaefolium* A. Br. Am Aufstieg von der Borowaer Kirche zur Lissa Hora (1).
Potamogeton acutifolius Lk. Freistadt: Olschiner Teiche (1).
Cyperus flavescens L. Malenowice an der Lissa Hora (1). — *Scirpus maritimus* L. Freistadt: Darkauer Teiche (1). — *Carex cyperoides* L. Freistadt: Darkauer Teiche (1). — *C. pendula* Huds. Teschen: Im Niebory-Końskaer Walde, Wäldchen bei Piersna unweit Petrowitz (1).
Juncus fuscoater Schreb. Teschen: Westlich der Station Chiby (1).
Helleborine spiralis Bernh. Lissa Hora gegen Friedland (2).
Betula obscura Kotula. Chiby bei Teschen (1).
Hieracium floribundum W. Gr. Eisenbahndamm bei Chiby (1). — *H. barbatum* Tsch. Vorberge des Gesenkes um Erbersdorf häufig (2). — *Erigeron acer* L. var. *droebachiensis* (O. F. Müll.) Erbersdorf im Gesenke (2). — *Senecio fluviatilis* Wallr. Oderufer bei Oderberg, dagegen am Olsa-Ufer bei Teschen nie gefunden (1).
Dipsacus laciniatus L. Teschen: Boguschowitz am Steinbruch in Kempki (1).
Ligustrum vulgare L. Teschen: Berge nördlich vom Ropitzer Schlosse, an der Jasienowa bei Golleschau (1).
Gentiana ciliata L. Friedland am Fusse der Lissa Hora (2).
Atropa Belladonna L. Erbersdorf im Gesenke (2).
Linaria Elatine Mill. Teschen: Am Steinbruch in Kempki, Zawada bei Freistadt (1). Troppau: Schönbrunn (2). — *Veronica montana* L. Skalitz vor Friedeck (1).

Pinguicula vulgaris L. Zwischen dem Leiterberge und der Schweizerei, Schäferei unter dem Peterstein (3).

Clematis Vitalba L. Friedeck: Skalitzer Berg im Hohlwege gegen Raszkowitz und nördlich davon gegen Dobrau (1). Dies wohl die einzigen spontanen Standorte im Gebiete. — *Ranunculus nemorosus* DC. Teschen: Golleschauer Berg (1). — *Isopyrum thalictroides* L. Troppau: Eichenwälder der Oderniederung bei Stauding massenhaft (2).

Berberis vulgaris L. Teschen: Schanzberg, Wald zwischen Blogotitz und Końska (1).

Corydalis solida Sm. Troppau: Oderniederung bei Stauding (2).

Viola collina Bess. Teschen: Am Fusse der Babia-gorka (1).

Illecebrum verticillatum L. Teschen: Piersna nördlich der Station Petronitz (1). Dadurch für das Gebiet sicher constatirt.

Geranium pyrenaicum L. Teschen: Waldrand von Końska, sich verbreitend und einbürgernd an der Kaschauer Bahn (1).

Radiola linoides Gmel. Teschen: Bei Chiby, dann bei Cameral-Ellgoth auf einem Vorberge der Godula bei fast 400 M. (1).

Lythrum Hyssopifolia L. Bei Darkau und Freistadt (1).

Rubus sulcatus Vest. Teschen: Moshy oberhalb der Grabina, Allodial-Ellgoth, in Ropitz, Bukowitz (1). — *R. orthocantus* Wimm. Teschen: Nördlich vom Schlosse Ropitz (1). — *Rosa coriifolia* Fr. Teschen: Chełm bei Golleschau (1). — *R. sepium* Thuill. var. *inodora* (Fr.) Friedeck: Skalitz, gegenüber Dobrau (1).

B. Original-Mittheilungen.

Nieder-Oesterreich.

Equisetum Telmateja Ehrh. var. *frondescens* A. Br. Bei St. Andrae.

G. Sennholz.

Viscum album L. auf *Robinia Pseudacacia* in einem Parke rechts von der Brücke zwischen Ober-Döbling und der Hohen Warte.

Dr. M. Kronfeld.

Botanische Gesellschaften, Vereine, Congresse etc.

Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien.

Sitzung der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe vom 2. Juli 1891.

Das w. M. Herr Hofrath L. K. Schmarda übersendete eine Abhandlung des Dr. Alfred Nalepa, Professor an der k. k. Lehrerbildungsanstalt in Linz, unter dem Titel: „Genera und Species der Fam. *Phytoptida*“. Die Abhandlung enthält die Beschreibungen folgender Arten und der von ihnen hervorgerufenen Pflanzenmissbildungen.

Phytoptus dispar n. sp., Rollungen und Blattbüschel von *Populus Tremula* L.; *Ph. tristriatus* var. *erinea*, Erineum von *Juglans regia* L.; *Ph. Salviae* n. sp. mit *Phyllocoptes obtusus* n. sp., Blattausstülpungen von *Salvia pratensis* L.; *Ph. Euphrasiae* n. sp., Triebspitzendeformation von *Euphrasia officinalis* L.; *Ph. stenaspis* n. sp., Randrollungen von *Fagus silvatica* L.; *Ph. Kiefferi* n. sp., unbehaarte Blüthendeformationen von *Achillea Millefolium* L.; *Ph. calycobius* n. sp., Knospendeformation von *Crataegus Oxyacantha* L.; *Ph. destructor* n. sp. von *Sedum reflexum* L.; *Ph. Salicis* n. sp., Blattknötchen von *Salix alba* L.; *Ph. Genistae* n. sp., Triebspitzendeformation von *Genista pilosa* L.; *Ph. variolans* n. sp., Blattpocken von *Sorbus Aucuparia* L.; *Phytocoptes dubius* n. sp., Vergrünungen von *Bromus sterilis* L.; *Phytocoptes Populi* n. sp., Erineum von *Pop. Tremula* L.; *Tegonotus acromius* n. sp., frei lebend (?) auf den Blättern von *Betula alba* L.; *T. Piri* n. sp., Randrollungen von *Pirus communis* L.

Personal-Nachrichten.

Prof. Dr. P. A. Saccardo erhielt für seine mykologischen Arbeiten den grossen Preis der Academia dei Lincei in Rom.

Dr. Aladar Richter ist zum Professor an der Oberrealschule in Versecz (Temeser Comitat) ernannt worden.

In Mondsee feierte am 18. Juni d. J. der Botaniker R. Hinterhuber seinen 90. Geburtstag.

Am 4. Juli d. J. starb in Kalocsa der als Botaniker und Förderer botanischer Interessen bekannte Cardinal Dr. L. v. Haynald im 75. Lebensjahre.

Am 13. Februar starb in Dahme der Botaniker J. Groenland.

Inhalt der August-Nummer. Wettstein Dr. R. v. Untersuchungen über die Section „*Laburnum*“ der Gattung *Cytisus* (Schluss). S. 261. — Celakovský Dr. Lad. Ueber die Verwandtschaft von *Typha* und *Sparganium* (Schluss). S. 266. — Arnold Dr. F. Lichenologische Fragmente XXX (Schluss). S. 272. — Junger E. Botanische Gelegenheitsbemerkungen (Schluss). S. 275. — Waisbecker A. Zur Flora des Eisenburger Comitates. S. 278. — Litteratur-Uebersicht. S. 279. — Flora von Oesterreich-Ungarn: Braun H. Niederösterreich (Schluss). S. 283. — Fritsch K. Salzburg. S. 286. — Fritsch K. Kärnten. S 288. — Fiek E. Schlesien. S. 289. — Botanische Gesellschaften, Vereine, Congresse etc. S. 291. — Personal-Nachrichten. S. 292.

Adresse der Redaction: Dr. R. v. Wettstein, Wien, III/3, Rennweg 14.
Adresse der Administration: Dr. A. Skofitz, Wien, IV., Heugasse 48.

Die Oesterreichische botanische Zeitschrift erscheint am Ersten jeden Monats. Man pränumerirt auf selbe mit **8 fl. öst. W.** ganzjährig, oder mit **4 fl. öst. W.** halbjährig.

Inserate die ganze Petitzeile 15 kr. öst. W.

Exemplare, die **frei** durch die Post bezogen werden sollen, sind **blos** bei der **Administration** (IV. Bez., Heugasse 48) zu pränumeriren.

Im Wege des Buchhandels übernimmt Pränumeration **C. Gerold's Sohn** in Wien, sowie alle übrigen Buchhandlungen.

Verlag von C. Gerold's Sohn. C. Ueberreuter'sche Buchdruckerei (M. Salzer) in Wien.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution

Jahr/Year: 1891

Band/Volume: 041

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: Flora von Oesterreich-Ungarn. 283-292