

- Stengel theilweise rundum gleichmässig behaart, theilweise an den Kanten stärker behaart und die zwischenliegenden Partien des Stengels wenig behaart oder fast kahl, *T. polytrichus* A. Kerner.
22. Blätter und Stengel dichtzottig, erstere spatelförmig oder elliptisch, Stengel abstehend langzottig, . *T. Ortmannianus* Opiz.
b) Blätter sehr klein, spatelförmig oder kurz elliptisch, *T. Ortmannianus* v. *Froehlichianus* (Opiz), bei Lienz, Südtirol.
- Blätter + behaart, oft nur die Blattoberfläche von einzelnen Härchen bekleidet, Stengel anliegend oder + abstehend dicht behaart; um Lienz, im östlichen Theile Tirols etc. *T. praecox* (Opiz) v. *spathulatus* (Opiz).
23. Stengel locker behaart, Blätter beiderseits oder nur oberseits zerstreut behaart, Blattlamina dünn *T. Oenipontanus* H. Braun.
- Stengel zottig behaart, Blätter beiderseits dicht behaart . 24.
24. Stengel abstehend zottig behaart, Blätter eiförmig elliptisch, mittelgross; häufig *T. lanuginosus* Miller.
b) *Froehlichianus* (Opiz), Blätter klein, spatelförmig oder kurz elliptisch.
Blätter schmallanzettlich, oft linealisch, von durchdringendem Bergamottengeruche, für Tirol zweifelhaft . *T. Kosteleckyanus* Opiz.

Zur Flora des Eisenburger Comitats.

Von Dr. Anton Waisbecker (Güns).

(Schluss.)

Cirsium Linkianum Löhr (*C. Erisithales* \times *pannonicum*) Kastanienhain in Güns.

C. Waisbeckeri Simk. (*C. pannonicum* \times *Erisithales*) dem *C. Erisithales* viel näher stehend, mit zahlreichen aufrecht stehenden gelben Köpfchen; mit Voriger.

Phyteuma austriacum G. Beck, am Steinstücklberg bei Rödlenschlag auf Serpentin 800 M. hoch.

Asperula tinctoria L., am Satzenriegel in Rechnitz.

Gentiana Pneumonanthe L. var. *elliptica* Kl. et Richt., nasse Wiese in Bozsok.

G. verna L. var. *angulosa* Wahl., Bergwiese in Stuben bei Bernstein 600 M. hoch.

G. Sturmiana A. et J. Kern.. Kastanienhain in Güns.

G. rhaetica A. et J. Kern., Waldräuber um Bernstein, 700 M. hoch.

G. austriaca A. et J. Kern., nasse Wiese in Borsok (1889).

Mentha Skofitziana A. Kern. (*M. arvensis* \times *silvestris*) feuchte Wiese in Rechnitz.

M. origanifolia Host, an Ufern in Güns, Borzsok, Perenyé.

M. praticola Op., auf nassen Wiesen in Güns, Rattersdorf, Hammer.

M. silvatica Host, an Waldrändern in Güns.

¹⁾ Vergl. Nr. 8, S. 278.

- M. fontana* Whe., nasse Wiesen in Velem.
M. subarvensis Simk., an Ackerrainen in Czák, Szerdahely, Bozsok.
M. citrata Ehrh., Wassergraben in Güns.
M. nepetoides Lej., quelliger Ort in Czák b) var. *cinerea* Hol.,
 quelliger Ort in Velem.
Thymus praecox Op., sonniger Abhang in Liebing.
Th. Ortmannianus Op., am Steinstücklberg bei Rödlenschlag.
Th. collinus M. Bieb., var. *decussatus* Simk., waldiger Abhang in Güns.
Anchusa italicica Retz, wüste Stelle am Viehmarktplatz in Güns.
Primula Pannonica A. Kern., an grasigen, steinigen Stellen Günseck,
 Bernstein, Rödlenschlag! in grosser Menge.
Vaccinium Myrtillus L., forma *leucocarpum* Hausm., Bergwälder in
 Rattersdorf.
Heracleum Sphondylium L. var. *angustilobatum* Neilr., Waldränder
 in Güns.
Laserpitium latifolium L. var. *glabrum* Cr., Kastanienhain in Güns.
Pulsatilla pratensis Mill., *purpureiflora*, mit kleinen, walzlichen,
 purpurrothen Blüthen; Bergwiese in Velem.
Ranunculus auricomus L. var. *fallax* Wimm. et Grab, beim Reh-
 bründl in Güns.
Aconitum Vulparia Reichb. var. *Lycocotonum* Reichb. beim Hermanns-
 brunnen in Güns, im langen Graben in Velem, im Nussgraben
 in Rechnitz.
Capsella Bursa pastoris L. var. *coronopifolia* Neilr., am Schlossberg
 in Lockenhaus.
Raphanus Raphanistrum L. var. *segetum* Reichb., Mexicofelder in
 Güns.
Herniaria incana Lam., ein einziges Stämmchen fand ich am Fusse
 des St. Veitberges bei Velem.
Spergula vilvensis L. var. *maxima* Whe., Brache in Bozsok.
Cerastium glomeratum Thuill. var. *eglundulosum* Koch, beim Stein-
 bruch in Czák.
Saponaria Vaccaria L. var. *grandiflora* Fisch., Ackerrain in Bozsok.
Silene gallica L. var. *anglica* Ackerfeld in Pilgersdorf.
Hypericum perforatum L. var. *stenophyllum* Wim. et Grab, Mexico-
 felder in Güns.
Polygala austriaca Cr. (sensu Fl. exs. Aust.-Hung, A. Kern., non
 Waisb. Freh. II.) nasse Wiese in Szerdahely.
Euphorbia villosa W. Kit. a) var. *leiocarpa* Neilr., nasse Wiese in
 Bozsok b) var. *verrucosa* Neilr. mit voriger aber selten c) var.
trichocarpa Neilr., quellige Bergwiese in Bozsok.
Epilobium hirsutum L. a) var. *semiglabrum* Koch, Bachufer im
 Pogany-Thal bei Güns; b) var. *vilosissimum* Koch, Strassen-
 graben in Güns.
E. montano-pubescent Lásch. Bachufer in Tömörd.
E. roseo-pubescent Lásch. Quellige Stelle in Hammer.
E. palustri-roseum Lásch. Quelliger Ort bei Tömörd.
Sanguisorba auriculata Scop., am Rande des Mannersdorfer Waldes
 in Güns.

Rosa spinosissima L. var. *inermis* DC., am Breitenstein in Bozsok,
im langen Graben in Velem.

R. alpina L. a) var. *lagenaria* Vill. (*R. pendulina* L. var. *paucipilis* Borb. in ejus Vasm. fl. p. 325) Blättchen entfernt, kahl, Frucht
flaschenförmig; b) var. *norica* Kell. (*R. pendulina* L. var. *acanthodermis* Borb. ibidem) Aeste und Blüthenzweige constant
wehrlos, blos das Stämmchen nadelstachelig, Blättchen behaart,
Früchte elliptisch-kugelig; beide Formen auf Felsen im langen
Graben bei Velem, 600 M. hoch.

R. subinermis Bess. var. *hispidocarpa* Kell., im langen Graben bei
Velem in der Nähe der Vorigen, von denselben durch schön
entwickelte 1—2 eiförmige Deckblätter und die mit 4—5 Mm.
langen Drüsenvorsten dicht besetzten Receptakeln leicht zu
unterscheiden.

R. micrantha Sm. var. *permixta* Des., bei der Schießsstätte in Güns.

R. tomentosa Sm. var. *notha* Kell., am Kalaposkő in Bozsok.

R. tortuosa Wierzb., sonniger Abhang in Lockenhaus.

Rubus Vestii Focke, am Steinbruch in Lockenhaus.

R. incertus Hal. (*R. sulcato* \times *candicans*) Kastanienhain in Güns.

R. debilis Hal. (*R. candicans* \times *hirtus*) Waldschläge in Güns und
Holzschlag.

R. villicardis Koehl. Waldrand in Güns.

R. macrophyllus Whe. et Nees, buschige Stelle im Pogány-Thal bei
Güns.

R. tomentosus Willd. var. *canescens* Wirtg., an Weingartenrainen
in Güns.

R. Gremlii Focke (*R. Clusii* Borb.) in Wäldern und Hecken in
Güns und Umgebung sehr häufig.

R. echinaceus Kern., im östlichen Waldthale in Hammer.

R. apricus Wimm., am Binderriegel in Güns.

Potentilla anserina L. var. *argentea* Neilr., Wegränder in Güns.

P. subcanescens (*P. brachyloba* \times *canescens*) zwischen den Eltern
mehr dem *canescens* sich nähernd; am Steinbruch in Czák.

P. grandiceps Zimm., Ackerrain in Rechnitz.

P. altissima Borb., Ackerrain in Czák.

P. pseudo-argentea Blocki, Waldrand in Güns.

P. serpentinii Borb. var. *fissidens* am Fusse des Kienberges in Bern-
stein; unter den Abänderungen dieser interessanten Art die auf-
fälligste: die Blättchen mit 2—3 tief geschnittenen schmalen
Zähnen.

P. albescens Op., am Steinbruch in Czák.

Trifolium arvense L. var. *brachyodon* Čel., am Mannersdorfer Berg
in Güns.

Dorycnium diffusum Janka, Waldrand in Rumpód im Günser Bezirk.

Vicia sordida W. Kit. var. *Sopolianae* Koch, in der Slat in Pöse.

V. segetalis Thunill. var. *Bobartii* Forst., in Saaten Czák und Ratters-
dorf.

Güns, am 19. Februar 1891.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1891

Band/Volume: [041](#)

Autor(en)/Author(s): Waisbecker Anton [Antal]

Artikel/Article: [Zur Flora des Eisenburger Comitates. 298-300](#)