

- Stengel theilweise rundum gleichmässig behaart, theilweise an den Kanten stärker behaart und die zwischenliegenden Partien des Stengels wenig behaart oder fast kahl, *T. polytrichus* A. Kerner.
22. Blätter und Stengel dichtzottig, erstere spatelförmig oder elliptisch, Stengel abstehend langzottig, . *T. Ortmannianus* Opiz.
 b) Blätter sehr klein, spatelförmig oder kurz elliptisch, *T. Ortmannianus* v. *Froehlichianus* (Opiz), bei Lienz, Südtirol.
 Blätter \pm behaart, oft nur die Blattoberfläche von einzelnen Härchen bekleidet, Stengel anliegend oder \pm abstehend dicht behaart; um Lienz, im östlichen Theile Tirols etc. *T. praecox* (Opiz) v. *spathulatus* (Opiz).
23. Stengel locker behaart, Blätter beiderseits oder nur oberseits zerstreut behaart, Blattlamina dünn *T. Oenipontanus* H. Braun. Stengel zottig behaart, Blätter beiderseits dicht behaart . 24.
24. Stengel abstehend zottig behaart, Blätter eiförmig elliptisch, mittelgross; häufig *T. lanuginosus* Miller.
 b) *Froehlichianus* (Opiz), Blätter klein, spatelförmig oder kurz elliptisch.
 Blätter schmallanzettlich, oft linealisch, von durchdringendem Bergamottengeruche, für Tirol zweifelhaft . *T. Kosteleckyanus* Opiz.

Zur Flora des Eisenburger Comitats.

Von Dr. Anton Waisbecker (Güns).

(Schluss.)

- Cirsium Linkianum* Löhr (*C. Erisithales* \times *pannonicum*) Kastanienhain in Güns.
- C. Waisbeckeri* Simk. (*C. pannonicum* \times *Erisithales*) dem *C. Erisithales* viel näher stehend, mit zahlreichen aufrecht stehenden gelben Köpfchen; mit Voriger.
- Phyteuma austriacum* G. Beck, am Steinstücklberg bei Rödlschlag auf Serpentin 800 M. hoch.
- Asperula tinctoria* L., am Satzenriegel in Rechnitz.
- Gentiana Pneumonanthe* L. var. *elliptica* Kl. et Richt., nasse Wiese in Bozsok.
- G. verna* L. var. *angulosa* Wahl., Bergwiese in Stuben bei Bernstein 600 M. hoch.
- G. Sturmiana* A. et J. Kern., Kastanienhain in Güns.
- G. rhaetica* A. et J. Kern., Waldräuder um Bernstein, 700 M. hoch.
- G. austriaca* A. et J. Kern., nasse Wiese in Borsok (1889).
- Mentha Skofitziana* A. Kern. (*M. arvensis* \times *silvestris*) feuchte Wiese in Rechnitz.
- M. orijanifolia* Host, an Ufern in Güns, Borzsok, Perenye.
- M. praticola* Op., auf nassen Wiesen in Güns, Rattersdorf, Hammer.
- M. silvatica* Host, an Waldändern in Güns.

¹⁾ Vergl. Nr. 8, S. 278.

- M. fontana* Whe., nasse Wiesen in Velem.
M. subarvensis Simk., an Ackerrainen in Czák, Szerdahely, Bozsok.
M. citrata Ehrh., Wassergraben in Güns.
M. nepetoides Lej., quelliger Ort in Czák b) var. *cinerea* Hol., quelliger Ort in Velem.
Thymus praecox Op., sonniger Abhang in Liebing.
Th. Ortmannianus Op., am Steinstücklberg bei Rödlschlag.
Th. collinus M. Bieb., var. *decussatus* Simk., waldiger Abhang in Güns.
Anchusa italica Retz, wüste Stelle am Viehmarktplatz in Güns.
Primula Pannonica A. Kern., an grasigen, steinigen Stellen Günseck, Bernstein, Rödlschlag! in grosser Menge.
Vaccinium Myrtillus L., forma *leucocarpum* Hausm., Bergwälder in Rattersdorf.
Heracleum Sphondylium L. var. *angustilobatum* Neilr., Waldränder in Güns.
Laserpitium latifolium L. var. *glabrum* Cr., Kastanienhain in Güns.
Pulsatilla pratensis Mill., *purpureiflora*, mit kleinen, walzlichen, purpurrothen Blüten; Bergwiese in Velem.
Ranunculus auricomus L. var. *fallax* Wimm. et Grab, beim Rehbründl in Güns.
Aconitum Vulparia Reichb. var. *Lycocotnum* Reichb. beim Hermannsbrunnen in Güns, im langen Graben in Velem, im Nussgraben in Rechnitz.
Capsella Bursa pastoris L. var. *coronopifolia* Neilr., am Schlossberg in Lockenhaus.
Raphanus Raphanistrum L. var. *segetum* Reichb., Mexicofelder in Güns.
Herniaria incana Lam., ein einziges Stämmchen fand ich am Fusse des St. Veitberges bei Velem.
Spergula urvensis L. var. *maxima* Whe., Brache in Bozsok.
Cerastium glomeratum Thuill. var. *eglandulosum* Koch, beim Steinbruch in Czák.
Saponaria Vaccaria L. var. *grandiflora* Fisch., Ackerrain in Bozsok.
Silene gallica L. var. *anglica* Ackerfeld in Pilgersdorf.
Hypericum perforatum L. var. *stenophyllum* Wim. et Grab, Mexicofelder in Güns.
Polygala austriaca Cr. (sensu Fl. exs. Aust.-Hung, A. Kern., non Waisb. Freh. II.) nasse Wiese in Szerdahely.
Euphorbia villosa W. Kit. a) var. *leiocarpa* Neilr., nasse Wiese in Bozsok b) var. *verrucosa* Neilr. mit voriger aber selten c) var. *trichocarpa* Neilr., quellige Bergwiese in Bozsok.
Epilobium hirsutum L. a) var. *semiglabrum* Koch, Bachufer im Pogany-Thal bei Güns; b) var. *villosissimum* Koch, Strassengraben in Güns.
E. montano-pubescens Lasch. Bachufer in Tömörd.
E. roseo-pubescens Lasch. Quellige Stelle in Hammer.
E. palustri-roseum Lasch. Quelliger Ort bei Tömörd.
Sanguisorba auriculata Scop., am Rande des Mannersdorfer Waldes in Güns.

- Rosa spinosissima* L. var. *inermis* DC., am Breitenstein in Bozsok, im langen Graben in Velem.
- R. alpina* L. a) var. *lagenaria* Vill. (*R. pendulina* L. var. *paucipilis* Borb. in ejus Vasm. fl. p. 325) Blättchen entfernt, kahl, Frucht flaschenförmig; b) var. *norica* Kell. (*R. pendulina* L. var. *acanthodermis* Borb. ibidem) Aeste und Blüthenzweige constant wehrlos, blos das Stämmchen nadelstachelig, Blättchen behaart, Früchte elliptisch-kugelig; beide Formen auf Felsen im langen Graben bei Velem, 600 M. hoch.
- R. subinermis* Bess. var. *hispidocarpa* Kell., im langen Graben bei Velem in der Nähe der Vorigen, von denselben durch schön entwickelte 1—2 eiförmige Deckblätter und die mit 4—5 Mm. langen Drüsenborsten dicht besetzten Receptakeln leicht zu unterscheiden.
- R. micrantha* Sm. var. *permixta* Des., bei der Schiessstätte in Güns.
- R. tomentosa* Sm. var. *notha* Kell., am Kalaposkö in Bozsok.
- R. tortuosa* Wierzb., sonniger Abhang in Lockenhaus.
- Rubus Vestii* Focke, am Steinbruch in Lockenhaus.
- R. incertus* Hal. (*R. sulcato* \times *candicans*) Kastanienhain in Güns.
- R. debilis* Hal. (*R. candicans* \times *hirtus*) Waldschläge in Güns und Holzschlag.
- R. villicaulis* Koehl. Waldrand in Güns.
- R. macrophyllus* Whe. et Nees, buschige Stelle im Pogány-Thal bei Güns.
- R. tomentosus* Willd. var. *canescens* Wirtg., an Weingartenrainen in Güns.
- R. Gremlii* Focke (*R. Clusii* Borb.) in Wäldern und Hecken in Güns und Umgebung sehr häufig.
- R. echinaceus* Kern., im östlichen Waldthale in Hammer.
- R. apricus* Wimm., am Binderriegel in Güns.
- Potentilla anserina* L. var. *argentea* Neilr., Wegränder in Güns.
- P. subcanescens* (*P. brachyloba* \times *canescens*) zwischen den Eltern mehr dem *canescens* sich nähernd; am Steinbruch in Czák.
- P. grandiceps* Zimm., Ackerrain in Rechnitz.
- P. altissima* Borb., Ackerrain in Czák.
- P. pseudo-argentea* Błocki, Waldrand in Güns.
- P. serpentinei* Borb. var. *fissidens* am Fusse des Kienberges in Berenstein; unter den Abänderungen dieser interessanten Art die auffälligste: die Blättchen mit 2—3 tief geschnittenen schmalen Zähnen.
- P. albescens* Op., am Steinbruch in Czák.
- Trifolium arvense* L. var. *brachyodon* Čel., am Maunersdorfer Berg in Güns.
- Dorycnium diffusum* Janka, Waldrand in Rumpód im Günser Bezirk.
- Vicia sordida* W. Kit, var. *Szopoliana* Koch, in der Siat in Pöse.
- V. segetalis* Thuill. var. *Bobartii* Forst., in Saaten Czák und Rattersdorf.

Güns, am 19. Februar 1891.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1891

Band/Volume: [041](#)

Autor(en)/Author(s): Waisbecker Anton [Antal]

Artikel/Article: [Zur Flora des Eisenburger Comitates. 298-300](#)