

Dimensiones: Folia infima circ. 36 cm. longa, 4 lata, foliolis 2 longis et centimetrum latis, folii apicem versus diminutis; folia supera 28 cm. longa, foliolis foliorum infimarum aequae longis, sed angustioribus; flos circ. 30 mm. longus, vexillo apice ab alas circ. 18 mm. distante; legumen circ. 30 mm. longum, 17 latum, mucrone laterali circ. 5 longo.

Species inter paucas ovario glaberrimo donatas valde insignis, ab *A. neurocarpo* Boiss. et *A. drupaceo* Orph. jam legumine multoties majore egregie aliena: differt etiam ab *A. columnari* Boiss. (cui legumen ignotum) indumento villosa et sericeo (nec ad foliolorum ciliatura tantum reducto), calycis tubo villosa (nec glaberrimo), vexilli forma, alis late oblongis (nec linearibus) vexillo subaequilongis (nec eo multo brevioribus); insuper differt ab *A. pisidicus* Boiss. Heldr. foliolis majoribus, oblongis (nec ovatis), calycis laciniis tubo subaequantibus (nec eo dimidio brevioribus), vexilli forma.

Astragalus (XXXV. *Myobroma*) *declinatus* Willd. var. *subglaber* Freyn et Bornm. Folia fere glaberrima, calyx major, 16 mm. longus ad angulos et in margine dentorum laxa et sparse villosa, vexillum 20 mm. longum; stylus sub stigmatibus barbellatus; legumen (juvenile) dense villosum.

Typus indumento patulo et molliter hirsuto et floribus paulo minoribus differt.

Armenia turcica. Egin: prope Bagir-Baschi die 3. junii 1890 leg. Sintenis (Exsicc. no. 2531).

(Fortsetzung folgt.)

Beiträge zur Flora der Balkanhalbinsel.

Von Dr. E. v. Halácsy (Wien).

VII.

Valeriana Pančićii Halácsy et Baldacci n. sp. Rhizomate obliquo pluricipiti, ad collum squamoso; caule erecto, simplici 4—8 cm alto, glaberrimo, tereti; foliis integerrimis glabris radicalibus ovalibus obtusis in petiolum attenuatis, caulinis 2, oppositis oblongis sessilibus; corymbo terminali conferto-capituliformi, bracteis linearibus glabris, non solum ovario glabro sed etiam pedunculis communibus cymarum lateralium longioribus, corollae albae tubo limbo excedente.

Montenegro. In fissuris rupium supra Rogam mont. Kom Kucki; lg. Baldacci, 6. Aug. 1891.

Syn.: *V. saxatilis* Panč. Elench. pl. vase. Crna Gora p. 43. (1875) non L.

Ein kleines, in der Tracht an *V. Celtica* erinnerndes Pflänzchen, von derselben aber durch den kopfigen Blütenstand und die rein-

weissen Blüten verschieden. Von kleinen Exemplaren der *V. saxatilis*, für welche dieselbe von Pančić a. a. O. gehalten wurde, durch den mit schuppenförmigen, nicht fädigschopfigen Blattresten bedeckten Wurzelstock, die ganz kahlen, nicht gewimperten Blätter, den gedrungenen, kurzästigen Blütenstand und eine andere Tracht abweichend.

Morina Persica, Subsp. *Turcica* Halácsy. A *M. Persica* L. differt lobis foliorum spinoso-aristatis brevioribus, bracteis brevius et parce spinosis, latioribus.

Macedonia. Prope Demirkapu; lg. Formánek 19. Aug. 1889. — Tekir Dagh; in saxis promontorii „Hodja Burnu“, inter pagos Panidos et Kumbaos litoris Propontidis, lg. Degen 2. Jul. 1890.

Weitere Beiträge zur Brombeerenflora der Kleinen Karpathen.

Von Dr. H. Sabransky (Pressburg).

(Fortsetzung.¹)

9. *R. bifrons* Vest. Diese im Sandsteingebiete des Wiener Waldes so ausserordentlich gemeine Art kommt auf dem Granit der kleinen Karpathen nur sehr zerstreut und spärlich vor. Ich kenne um Pressburg bisher nur folgende Standorte dieser schönen Form: 1. An der Südseite des Gebirgsparkes. 2. Mehrere Sträucher in den Föhrenwäldungen des Steirergrundes vis-à-vis vom Handelshügel. 3. In den Wäldungen des oberen Weidritzthales zwischen dem Erdödyberg und dem Malinsky vrch und 4. am Thebnerkogel gegen Neudorf.

10. *R. quadicus* Sabr. n. sp. — Syn. *R. macrophyllus* Hol. in litt. ad me; *R. villicaulis* et *R. macrophyllus* m. in Oesterr. botan. Zeitschr. 1884, p. 134, nec Koehl., nec Whe. et N.; *R. hypoleucus* m. in zool.-botan. Gesellsch. 1886, p. 95, nec Vest, nec Ph. J. M., nec Focke; *R. macrophyllus* subsp. *quadicus* Sabr. in Deutsch. botan. Monatsschr. 1889, p. 131.

Frutex medius vel humilior. Turiones arcuatim scandentes sat validi quinquangulares leviter pruinosi sat pilosi et versus basin densius caeterum sparsim glandulosi aculeis mediocribus in angulo fere recto patentibus rectis compressis et basi semper piligeris sat crebris (10—15 in interfolio) armati. Folia digitato-, raro pedatoquinata petiolo aculeis rectis sparsis glandulisque stipitatis instructo piloso; foliola mediocria aut maiora supra obscure prasina calva, subtus molliter pubescentia canopilosa in nervis submicantia, in

¹) Vergl. Nr. 11, S. 375.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1891

Band/Volume: [041](#)

Autor(en)/Author(s): Halacsy [Halácsy] Eugen von

Artikel/Article: [Beiträge zur Flora der Balkanhalbinsel. 408-409](#)