

eribus, involucri praeter pubem stellatam sparsam undique sed praesertim ad basim breviter et accumbente hirsuti phyllis obscuris late marginatis acuminatis apice ipsa obtusis, ligulis (saepe tubulosis!) extus pilosis apice glabris, stylis exsiccatione livescentibus; acheniis (immaturis) castaneis 2 Julio, Augusto. (Forts. folgt.)

Enumeratio plantarum annis 1888, 1889, 1890 et 1891 in Macedoniâ australi collectarum

autore L. Charrel (Salonichi).

(Fortsetzung.¹⁾)

Bunias Erucago L. Salonica.

Cleome Macedonica Heldreich et Charrel, a Degen cum *C. aurea* Čelakovský comparata et aliena visa! in rupestribus prope Salonicam.

Cistus villosus L. (forma *incanus* L., *genuinus* Boissier). Cassandra. — *salviaefolius* Linné, Salonica.

Helianthemum salicifolium L. Salonica. — *vulgare* Gärtner δ. *Graecum* Boissier, Cassandra (nec solum a Khortadj).

Viola odorata L., *genuina* Boissier, Khortadj (indicata cum dubio). — *silvatica* Fries typus. Salonica, Khortadj. — *silvatica* Fries, var. *Riviniana* Reichenbach, Khortadj. — *tricolor* L. var. *β. arvensis* Boissier, Khortadj. — *tricolor* L. δ. *Kitaibelianu* Ledebour, circum Salonicam frequentissima.

Dianthus gracilis Sibthorp, Kiel-tépé (nec solum ex Athone). — *pubescens* Sibth. et Sm. typus Salonicae frequens. — *cruentus* Grisebach, Kiel-tépé, Kiretch-Keni (nec solum in Macedoniâ boreali). — *Serresianus* Halácsy et Charrel (a *D. stenopetalo* alienus diversis characteribus). Serrès, Tchaïrli-dagh. — *pini-folius* Sibth. et Sm. totâ Macedoniâ (nec solum e Khortadj et Orbelo).

Tunica velutina Gussone. Ubique.

Saponaria Vaccaria Linné, *β. grandiflora* Fisch. Ubique. — *officinalis* L. Ubique (nec solum e Khortadj).

Gypsophila hirsuta Labill. *β. ocellata* Fl. Gr. Serrès.

Silene conica L. Ubique. — *juvenalis* Delille, Langaza (a cl. Boissier non indicata in Oriente Europaeo). — *Armeria* L. Khortadj. Tchaïrli-dagh. — *Cretica* L. Ubique. — *Graeca* Spruner. Salonica frequens. — *pendula* L. Ex hortis aufuga. — *Galliva* L. Cassandra.

Cuccubalus baccifer L. Drama, Cassandra (nec solum ex Orbelo).

Lychnis coronaria L. Tchaïrli-dagh, Khortadj (nec solum ex Athone).

Viscaria Sartorii Boissier, Khortadj.

Githago segetum Desfontaines. Ubique.

Sagina procumbens Linné, Tchaïrli-dagh, Salonica (indicatum cum dubio in Athone); — *ciliata* Fries (non descripta a cl. Boissier in

¹⁾ Vergl. Nr. 41 des vorigen Jahrg., S. 374.

- Flora Orientali). *Salonica frequens*. — *apetala* Linné, *Salonica* (indicata in Fl. Or. cum dubio ut *S. Macedonica*).
- Alsine verna* L. Khortadj (statio nova). — *Jacquini* (Koch). *Salonicae rara*. — *Smithii* Fenzi, *Salonica*. — *tenuifolia* Linné, *ε. viscosa* Schreber, *Salonica*.
- Querria Hispanica* Loeffling, Kiel-tépé.
- Arenaria nervosa* Halácsy et Charrel, species vel varietas *A. graveolentis* Schreber, foliis subtus bene trinerviis. Pournar-daghe. Studio digna.
- Stellaria media* Linné, *γ. major* Koch, *Cassandra*, *Orgyalis*. — *graminea* L. Tchaïrli (nec solum e Scardo).
- Moehringia trinervia* Linné. Tchaïrli-dagh.
- Cerastium anomalum* W. K. Khortadj, *Salonica rarius*. — *semidecandrum* L. *Salonica* (cum dubio indicatum in *Macedoniâ*).
- Spergularia rubra* Wahl. typus, *Salonica*.
- Polycarpon tetraphyllum* L. Ubique.
- Herniaria cinerea* DC. Ubique. — *glabra* L. Tschairli-dagh. — *hirsuta* L. Khortadj, *Salonica*.
- Paronychia cephalotes* MB. Kiel-tépé.
- Scleranthus annuus* L. Khortadj (non indicatus a cl. Boissiero in Oriente Europaeo). — *verticillatus* Tausch, *Salonica*, Khortadj. — *perennis* L. typus (indicatus cum dubio). *Salonica*.
- Tamaria parviflora* DC. *Salonica*, *Cassandra*.
- Hypericum Olympicum* Linné. Ubique (nec solum ex Athone). — *quadrangulum* L. Tchaïrli-dagh (non descripta in Flore Orientali). — *crispum* L. *Salonica* (indicata cum dubio). — *Montbretii* Spach, *Cassandra*.
- Malva parviflora* L. Ubique.
- Lavatera arborea* L. *Salonicae* aufuga.
- Althaea cannabina* L. *Salonica*, Sédès.
- Alcea rosea* L. Ubique aufuga. — *rosea* Linné, *Sibthorpii* Boissier, aufuga. — *Helbreichii* Boissier, Kiel-tépé, secunda statio cognita.
- Malvella Sherardiana* L. *Salonica* (indicata cum dubio).
- Hibiscus Syriacus* L. Aufugus *Salonicae*.
- Corchorus olitorius* L. Cultus et aufugus *Salonicae*.
- Linum strictum* L. *β. spicatum* Reichenbach, Kiel-tépé. — *elegans* Spruner, Kiretch-Keni. — *usitatissimum* L. Subspontaneum *Salonicae*.
- Oxalis Acetosella* L. Tchaïrli-dagh (nec solum ex Orbelo.)
- Geranium Pyrenaicum* L. Khortadj. — *purpureum* Villars, Khortadj.
- Erodium ciconium* L. *Salonicae* frequens.
- Cardiospermum halicacabum* L. *Salonica*. Aufuga.
- Acer platanoides* L. Tchaïrli-dagh. — *opulifolium* Villars, Tchaïrli-dagh (nec solum e Brasnik). — *campestre* L. Ubique (indicatum cum dubio).
- Vitis vinifera* L. *Cassandra* (indicata cum dubio).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1892

Band/Volume: [042](#)

Autor(en)/Author(s): Charrel Louis

Artikel/Article: [Enumeratio plantarum annis 1888, 1889, 1890 et 1891, 271-272](#)