

cribus, involueri praeter pubem stellatam sparsam undique sed praesertim ad basim breviter et accumbente hirsuti phyllis obscuris late marginatis acuminatis apice ipsa obtusis, ligulis (saepē tubulosis!) extus pilosis apice glabris, stylis exsiccatione livescentibus; acheniis (immaturis) castaneis 24 Jūlio, Augusto. (Forts. folgt.)

Enumeratio plantarum annis 1888, 1889, 1890 et 1891

in Macedoniaustrali collectarum

autore L. Charrel (Salonichi).

(Fortsetzung.¹⁾

Bunias Erucago L. Salonica.

Cleome Macedonica Heldreich et Charrel, a Degen cum *C. aurea* Čelakovský comparata et aliena visa! in rupestribus prope Salonicam.

Cistus villosus L. (forma *icanus* L., *genuinus* Boissier). Cassandra. — *salviaefolius* Linné, Salonica.

Helianthemum salicifolium L. Salonica. — *vulgare* Gärtner δ. *Graecum* Boissier, Cassandra (nec solum a Khortadj.).

Viola odorata L., *genuina* Boissier, Khortadj (indicata cum dubio). — *silvatica* Fries typus. Salonica, Khortadj. — *silvatica* Fries, var. *Riviniana* Reichenbach, Khortadj. — *tricolor* L. var. *β. arvensis* Boissier, Khortadj. — *tricolor* L. δ. *Kitaibeliana* Ledebour, circum Salonicam frequentissima.

Dianthus gracilis Sibthorp, Kiel-tépé (nec solum ex Athone). — *pubescens* Sibth. et Sm. typus Salonicae frequens. — *cruentus* Grisebach, Kiel-tépé, Kiretch-Keni (nec solum in Macedonia boreali). — *Serresianus* Halácsy et Charrel (a *D. stenopetalo* alienus diversis caracteribus). Serrès, Tchaïrli-dagh. — *pini-folius* Sibth. et Sm. totā Macedonia (nec solum e Khortadj et Orbelo).

Tunica velutina Gussone. Ubique.

Saponaria Vaccaria Linné, β. *grandiflora* Fisch. Ubique. — *officinalis* L. Ubique (nec solum e Khortadj).

Gypsophila hirsuta Labill. β. *ocellata* Fl. Gr. Serrès.

Silene conica L. Ubique. — *juvenalis* Delille, Langaza (a cl. Boissier non indicata in Oriente Europaeo). — *Armeria* L. Khortadj. Tchaïrli-dagh. — *Cretica* L. Ubique. — *Graeca* Spruner, Salonica frequens. — *pendula* L. Ex hortis aufuga. — *Gallica* L. Cassandra.

Cuccubalus baccifer L. Drama, Cassandra (nec solum ex Orbelo).

Lychnis coronaria L. Tchaïrli-dagh, Khortadj (nec solum ex Athone).

Viscaria Sartorii Boissier, Khortadj.

Githago segetum Desfontaines. Ubique.

Sagina procumbens Linné, Tchaïrli-dagh, Salonica (indicatum cum dubio in Athone); — *ciliata* Fries (non descripta a cl. Boissier in

¹⁾ Vergl. Nr. 41 des vorigen Jahrg., S. 374.

- Flora Orientali). Salonica frequens. — apetala Linné, Salonica
(indicata in Fl. Or. cum dubio ut *S. Macedonica*).
Alsine verna L. Khortadj (statio nova). — *Jacquini* (Koch). Salo-
nicae rara. — *Smithii* Fenzl, Salonica. — *tenuifolia* Linné,
e. viscosa Schreber, Salonica.*
- Querria Hispanica* Loefling, Kiel-tépé.
- Arenaria nervosa* Halászy et Charrel, species vel varietas *A. gra-veolentis* Schreber, foliis subtus bene trinerviis. Pournar-daghe.
Studio digna.
- Stellaria media* Linné, *γ. major* Koch, Cassandra, Orgyalis. — *gra-minea* L. Tchaïrli (nec solum e Scardo).
- Moehringia trinervia* Linné. Tchaïrli-dagh.
- Cerastium anomalam* W. K. Khortadj, Salonica rarius. — *semidecan-
drum* L. Salonica (cum dubio indicatum in Macedoniâ).
- Spergularia rubra* Wahl. typus, Salonica.
- Polykarpon tetraphyllum* L. Ubique.
- Herniaria cinerea* DC. Ubique. — *glabra* L. Tschaïrli-dagh. —
hirsuta L. Khortadj, Salonica.
- Paronychia cephalotes* MB. Kiel-tépé.
- Scleranthus annuus* L. Khortadj (non indicatus a cl. Boissiero in
Oriente Europaeo). — *verticillatus* Tausch, Salonica, Khortadj.
— *perennis* L. typus (indicatus cum dubio). Salonica.
- Tamarix parviflora* DC. Salonica, Cassandra.
- Hypericum Olympicum* Linné. Ubique (nec solum ex Athone). —
quadrangulum L. Tchaïrli-dagh (non descripta in Flore Orien-
tali). — *crispum* L. Salonica (indicata cum dubio). — *Mont-
bretii* Spach, Cassandra.
- Malva parviflora* L. Ubique.
- Lavatera arborea* L. Salonicæ aufuga.
- Althaea cannabina* L. Salonica, Sédès.
- Alcea rosea* L. Ubique aufuga. — *rosea* Linné, *Sibthorpii* Boissier,
aufuga. — *Heldreichii* Boissier, Kiel-tépé, secunda statio cognita.
- Malvella Sherardiiana* L. Salonica (indicata cum dubio).
- Hibiscus Syriacus* L. Aufugus Salonicæ.
- Corechorus olitorius* L. Cultus et aufugus Salonicæ.
- Linum strictum* L. *β. spicatum* Reicheubach, Kiel-tépé. — *elegans*
Spruner, Kiretch-Keni. — *usitatissimum* L. Subspontaneum Sa-
lonicæ.
- Oxalis Acetosella* L. Tchaïrli-dagh (nec solum ex Orbelo.)
- Geranium Pyrenaicum* L. Khortadj. — *purpureum* Villars, Khortadj.
- Erodium ciconium* L. Salonicæ frequens.
- Cardiospermum halicacabum* L. Salonica. Aufuga.
- Acer platanoides* L. Tchaïrli-dagh. — *opulifolium* Villars, Tchaïrli-
dagh (nec solum e Brasnik). — *campestre* L. Ubique (indicatum
cum dubio).
- Vitis vinifera* L. Cassandra (indicata cum dubio).

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1892

Band/Volume: [042](#)

Autor(en)/Author(s): Charrel Louis

Artikel/Article: [Enumeratio plantarum annis 1888, 1889, 1890 et 1891.
271-272](#)