

lianus zog. geht einestheils aus dem Befunde seines Herbars und andernteils aus der Phrase der Diagnose „Variat foliis duplo angustioribus“ und dem Synonym *T. Zygis* Pallas hervor. Ebenso umfasst *T. collinus* M. & B. eine Gruppe von Formen, wie ich in einem anderen Artikel nachweisen werde. Die behaarte Form des *T. glabrescens* Willd. ist *T. Kostelezkyanus* Opiz, alle Uebergänge zwischen beiden Formen finden sich vor, mit dem *T. lanuginosus* Miller hat letztere Form gar nichts zu thun; ebensowenig wie *T. lanuginosus* Miller als Art, sondern nur als behaarte Form des *T. Lövyanus* Opiz oder *T. ellipticus* Opiz aufgefasst werden kann, oder umgekehrt. Freund Borbás erwähnt in seinen „Symbolae ad Thymos europae mediae“ etc. auf Seite 70 (1890), dass die Exsiccaten des *T. glabrescens* Schult. im Herbare des naturwiss. Museums zu Budapest mit dem *T. subcitratus* Schreb. identisch seien, gewiss sind diese Exsiccaten verwechselt worden, denn die Beschreibung Schultes' in Oesterr. Flora II. p. 166 (1814), welche zum Theile aus Willdenow abgeschrieben ist, stimmt nicht mit *T. subcitratus* Schreb. überein, diese Exemplare sind also bei der Frage nach dem authentischen *Thymus glabrescens* Willd. gänzlich belanglos. — Zum Schlusse möchte ich noch erwähnen, dass Link in Enum. hort. Berolinensis 1822, eines *Thymus glabrescens* Hoffmannsegg et Link Fl. Portug. I. p. 130, t. 15 (1809) erwähnt. An angegebener Stelle ist nun wohl ein *T. glabratus*, nicht aber ein *T. glabrescens* beschrieben. Trotzdem wird dieser Fehler zuerst vom Monographen der Labiaten, Bentham (auf Seite 345, 1832—1836) und demselben in De Candolle Prodr. XII. p. 202 (1848) nachgeschrieben, und alle folgenden Autoren, Steudel etc. schrieben, ohne an betreffender Stelle nachzusehen, wieder das Citat aus Bentham ab.

Enumeratio plantarum annis 1888, 1889, 1890 et 1891

in Macedoniâ australi collectarum

autore L. Charrel (Salonichi).

(Fortsetzung.)

- Lonicera periclymenum* L. circa Thessalonicum haud rara.
Crucianella angustifolia L. Pournar-dagh (indicata cum dubio solum ex Athone).
Asperula arvensis L. in planitie Khortiatis frequens, non indicata e Macedoniâ. — *A. longiflora* W. et Kit. *γ. condensata* (Heldreich). Tchairli-dagh. — *A. odorata* L. Khortiatis in cacuminis vicinis umbrosis (non indicata ex Oriente Europaeo a. d. Boissier).

¹⁾ Vergl. Nr. 8, S. 271.

- Galium erectum* Hudson. Tchaïrli-dagh. — *G. constrictum* Chaub. frequens ubique. — *G. palustre* L. Salonicae rarius. — *G. aureum* Visiani. Kiel-tépé frequentissimum. — *G. Parisiense* Linné α . *leiocarpum* Tausch. Salonicae, Kiel-tépé (indicatum e Byzantio). — *G. Parisiense* Linné β . *lasiocarpum* Tausch. Salonicae, Kiel-tépé (in Florá Orientali non indicatum ex Europá orientali). — *G. divaricatum* Lamarek. Salonicae rarius. — *G. murale* L. Salonicae. — *G. verticillatum* Danthon. Cassandreae.
- Vaillantia muralis* L. Cassandreae.
- Valeriana tuberosa* L. in cacumine Khortiatís frequens.
- Valerianella olitoria* Willdenow. Salonicae rara. — *V. truncata* Reichenbach. Salonicae, Cassandreae. — *V. carinata* Loiseleur. Salonicae, Cassandreae. — *V. auricula* De Candolle. Cassandreae. — *V. tridentata* Steven. Salonicae. abundans. — *V. coronata* Willdenow. Salonicae. — *V. discoida* Willdenow. Salonicae.
- Dipsacus sylvestris* Linné; ubique (indicata sine certitudine). — *D. laciniatus* L. Drama.
- Cephalaria Syriaca* L. Salonicae haud rara.
- Scabiosa Sicula* L. Salonicae.
- Callistemma brachyatatum* Sibthorp β . *Siebthorpiatum* Grisebach. Salonicae.
- Solidago virgaurea* Linné. Pournar-dagh.
- Erigeron Canadense* Linné, ubique.
- Bellis perennis* Linné, *hybrida* Tenore. Salonicae frequens.
- Inula cordata* Boissier. Khortiatís. — *I. conyza* De Candolle. Khortiatís. — *I. Aschersoniana* Janka. in rupibus Serrés.
- Gnaphalium sylvaticum* Linné. Tchaïrli-dagh.
- Helichrysum plicatum* De Candolle. Istib.
- Filago germanica* Linné α . typus. Salonicae rarius. — *F. Germanica* β . *eriocephala* Gussone, frequens. — *F. spathulata* Presl. α . typus. Salonicae. — *F. spathulata* β . *prostrata*. Parlatore, Salonicae typo frequentior. — *F. arvensis* Linné typus. Tchaïrli-dagh. — *F. arvensis* β . *lagopus* De Candolle. Salonicae frequens. — *F. Gallica* L. ubique.
- Xanthium strumarium* Linné β . *antiquorum* Wallroth, frequens. — *X. spinosum* L. ubique.
- Achillea millefolium* L. Tchaïrli necnon Salonicae. — *A. millefolium* β . *lanata* Koch. Tchaïrli-dagh. — *A. millefolium*, v. *collina* B. Tchaïrli-dagh. — *A. setacea* W. et Kit. β . *filifolia* Boissier. Kireteh-Keni. — *A. crithmifolia* W. et Kit. Tchaïrli-dagh. — *A. grandifolia* Frivaldsky. Tchaïrli-dagh frequentissimum. — *A. compacta* Willd. ubique.
- Anthemis tinctoria* L. ubique. — *A. tinctoria* γ . *pallida* De Candolle. Cassandreae. — *A. altissima* L. Salonicae frequens. — *A. tomentosa* Urville. Salonicae, Cassandreae.

Matricaria chamomilla Linné, ubique. — *M. chamomilla* β . *coronata* Gay. Cassandreae.

Chrysanthemum segetum Linné. Cassandreae.

Pyrethrum partenium L. Salonicae. — *P. balsamita* L. β . *tanacetoides* Bss. Sédès. — *P. vulgare* Linné, ubique.

Artemisia scoparia W. K. Salonicae vulgatissima. — *A. vulgaris* L. Serres. — *A. annua* L. Salonicae. — *A. absinthium* L. Salonicae.

Doronicum Orphanidis Boissier. Tchaïrli-dagh.

Senecio viscosus L. Tchaïrli-dagh. — *S. Nebrodensis* L. ubique in montanis.

Echinops sphaerocephalus L. *albidus* Spruner, ubique.

Carlina vulgaris L. Khortiat. — *C. corymbosa* L., *involutata* Poir. Serrès.

Attractylis cancellata L. Salonicae frequens.

Carduus Macedonicus Charrel! species nova? ulterius examinanda. Tchaïrli-dagh. — *C. acanthoides* Linné, β . *thes-salus* Boissier. Sédès. — *C. crispus*, Khortiat. — *C. pycnocephalus* Jacquin, v. *cassandrinus* Th. (perarmatus). Cassandreae. — *C. Siculum* Sprengel, β . *Hippolyti* Fl. du Pél. ubique in humidis. — *C. arvense* L. (forma foliis subintegris floribus fragrantibus *C. setorum* MB?) ubique.

Notobasis Syriaca L. Salonicae.

Onopordon acanthium L. Tchaïrli-dagh. — *O. Illyricum* Linné, ubique.

— *O. myriacanthum* Boissier. Lanbet prope Salonicam (rarius floribus albis). — *O. Sibthorpiannum* Heldreich, rarius Salonicae.

Jurinea mollis Linné. Kiel-tépé, Kiretch-Keni.

Amberboa moschata L. γ . *epapposa* Boissier. Tchaïrli-dagh.

Centaurea cirrhata Reichenbach, ubique in silvis montanis (Khortiat. Pournar-dagh etc.). — *C. cyanus* L., ubique in montanis. — *O. depressa* MB., non indicata ex Europae, Salonicae frequens. — ***C. Orbelica*** Velenovsky. Khortiat. abundans. — *C. Graeca* Spruner. Salonicae rarius. — ***C. Besseriana*** DC. Pervichta, non descripta in Florâ Orientali, fide Halácsy. — *C. diffusa* Lamarck, ubique in regione inferiori. — *C. calcitrapa* L., ubique communis.

Chnicus benedictus L. γ . *Kotschyi*. C. Bip. Salonicae.

Catananche lutea L. Cassandreae frequens.

Cichorium intybus L., ubique.

Hedypnois Cretica L. β . *gracilior* Boiss. Salonicae, Cassandreae.

Thrinacia tuberosa L. Cassandreae frequentissima.

Leontodon cichoraceum Tenore. Khortiat. — *L. hostile* L., β . *hispidum* L. Tchaïrli-dagh.

Urospermum picroïdes L. Cassandreae, Salonicae.

Tragopogon porrifolium L., ubique. — *T. major* Jacq. Khortiat.

— *T. pratense*, Khortiat, Salonicae. — *T. longifolium* Sartori. Sédès, Tekkéli.

- Scorzonera* L., *calcitrapaeifolia* Bisch. Salonicae. — *S. Jacquiniiana* Koch. Salonicae. — *S. mollis* MB. Cassandreae.
- Hypochaeris glabra* L., β . *erostriis* Boissier. Salonicae. — *H. radi-cata* L., β . *heterocarpa* Moris. Salonicae. — *H. Cretensis* L. Cassandreae abundans.
- Seriola Aethnensis* L. Cassandreae abundans.
- Taraxacum serotinum* W. K. Salonicae. — *T. officinale* Wig., γ . *laevigatum* Bisch. frequens. — *T. gymnanthum* Link. Salonicae frequentissimum.
- Sonchus glaucescens* Jordan, ubique communis. — *S. arvensis* L. Salonicae.
- Prenanthes purpurea* L. Pournar-dagh frequentissimum.
- Lactuca muralis* L., ubique in montanis.
- Zacyntha verrucosa* Gaertn., ubique in inferioribus.
- Crepis bulbosa* L. Cassandreae.
- Hieracium Heldreichii* Boissier. Pournar-dagh. — *H. murorum* Fries, ubique in montosis. — *H. vulgatum* Koch. Khortiatis. — *H. Reuterianum* Boissier. Tchaïrli-dagh.
- Rodigia commutata* Spreng. Salonicae.
- Lagoseris bifida* Visiani, ubique.
- Jasione montana* L., v. *dentata* DC., ubique in excelsioribus.
- Symphandra pangaea* Heldreich et Charrel. Pournar-dagh, in specubus.
- Campanula rotundifolia* L. Tchaïrli. — *C. lingulata* W. K. Tchaïrli. — *C. lingulata*, β . *vichoracea* Griseb. Kiel-tépé. — *C. glomerata* L. Tchaïrli. — *C. erinus* L. Salonicae, Cassandreae. — *C. rapunculus*, γ . *Lambertiana* DC. Kireteh-Keni. — *C. ramosissima* L. et L. Salonicae. — *C. ramosissima*, β . *Cassandrina* Charrel (simplex vel parum ramosum, floribus diminutis). Cassandreae.
- Trachelium Rumelicum* Hampe. Serrès.
- Vaccinium myrtillus* L. Tchaïrli, abundantissimum.
- Pyrola secunda* L. Tchaïrli. — *P. chlorantha* Swartz. Tchaïrli.

(Fortsetzung folgt.)

Plantae novae Orientales.

II.

Von J. Freyn (Prag).

(Fortsetzung.¹⁾)

Armenia turcica, Sipikor: in quercetis versus Jerbatan in consortio *Hieracii lazici* Boiss. Bal., *H. Bornmülleri* Freyn et

¹⁾ Vergl. Nr. 8, S. 266.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1892

Band/Volume: [042](#)

Autor(en)/Author(s): Charrel Louis

Artikel/Article: [Enumeratio plantarum annis 1888, 1889, 1890 et 1891, 338-341](#)