

verticillastris sub 6floris distinctis racemosis, foliis depresso ovatis acuminatis cuspidatis membranaceis, versus marginem reticulatis, calyce aequilongis vel usque dimidio brevioribus suffultis; calycis laxo et breviter hirti eglanduloso labio superiore 3-dentato, dente intermedio minore, inferiore bidentato, dentibus omnibus apice longiuscule subulato spinulosis; corollae albae calyce vix duplo longiori labio superiore leviter curvato, tubo incluso. 24 Junio.

Cappadocia. Inter et Caesaream et Yosgad 1400 m. supra mare die 23. junii 1890 leg. Bornmüller (Exsicc. no. 2175).

Dimensiones: Caulis cum panícula 25—32 cm. altus; panícula 14—27 cm. lata. Folia basilaria majora sine petiolo 3—3.5 cm. longo 14 cm. longa et supra basin 6.5 lata; calyx cum spinulis 10 mm. longus, corolla 13 longa.

Planta inter affinis indumento et floribus parvis diversissima, habitu ad *Salviam argenteam* L. et *S. verbascifoliam* MB. accedens.

Salvia (Eusphace) Freyniana Bornm. Suffruticosa ramosa caespitosa tomentella, ramis e basi procumbente subradicante adscendentibus apicem usque foliosis saepe plus minus hispidis; foliis petiolis brevibus ciliatis basi dilatatis suffultis, pinnatisectis, segmentis 1—3jugis, oblongis crenato-dentatis vel integerrimis, lateralibus parvis, terminali multo majore, floralibus herbaceis ovatis, calyce vix vel duplo brevioribus, infimis saepe lanceolatis, trilobis superiorum longioribus; verticillastris ca. 6-floris in racemos sublaxos approximatis.

(Schluss folgt.)

Ein kleiner Beitrag zur Flora von Galizien.

Von Br. Blocki (Lemberg).

Aspidium Braunii Sw. Bergwälder in Paniszczów bei Ustrzyki, nicht selten.

— *lobatum* Sw. daselbst, selten.

Asperula rivularis Sibth. (*A. Aparine* auct. galic.) Nasse Wiesen in Zubrza bei Lemberg.

Anemone narcissiflora L. Trockene Waldwiesen in Dubienko bei Monaserzyska.

Betula verrucosa Ehrh. f. foliis basi subcordatis. Im Walde bei Lesienice nächst Lemberg.

Botrychium matricariaefolium A. Br. Wälder in Huta zielona bei Rawa und in Dubienko, sehr selten.

Cimicifuga foetida L. Buschige Kalkabhänge in Malechów bei Lemberg

Cineraria rivularis W. K. Waldwiesen in Dubienko.

Campamula persicifolia L. f. *hirtifolia* m. Unter der gewöhnlichen Form in Lesienice, Krzywezyce, Pasieki und Zofiówka bei Lemberg und in Dubienko, nicht selten.

- Dianthus glabriusculus* Kit. Waldränder in Dubienko, sehr selten.
- Epilobium Lamyi* F. Sch. Holzschläge in Bileze, Krzywczyce und Pasieki, selten.
- *obscurum* Schreb. Holzschläge in Dubienko, nicht selten.
 - *adnatum* Gris. Waldgräben in Dzików bei Cieszanów, selten.
 - *Lamyi* \times *montanum*. Unter den Stammeltern in Pasieki, nicht selten.
 - *Lamyi* \times *parviflorum*. Unter den Stammeltern in Pasieki, sehr selten.
 - *montanum* \times *parviflorum*. Unter den Stammeltern in Krzywczyce, selten.
 - *obscurum* \times *montanum*. Unter den Stammeltern in Dubienko, selten.
 - *parviflorum* \times *tetragonum*. Unter den Stammeltern in Hołosko, sehr selten.
- Euphorbia gracilis* Bess. Trockene Gypsabhänge in Babin (Bukowina) und in Probabin bei Horodenka in Südostgalizien, in Gesellschaft der *E. Cyparissias*, jedoch nicht in dieselbe übergehend.
- *salicifolia* \times *Esula* m. Strassengräben bei Śniatyn (Südostgalizien), unter den Stammeltern, selten. Von *E. paradoxa* Schur nicht zu unterscheiden.
 - *tristis* M. B. Sonnige Kalkabhänge in Dubienko, zahlreich.
 - *Esula* L. Grasige Lehmtriften in Horodnica bei Horodenka und in Weleśniów bei Monasterzyska, selten.
- Fragaria campestris* Stev. (*Fr. neglecta* E. Lindem.) Auf trockenen, grasigen Kalktriften in Probabin bei Horodenka.
- Galium elegans* m. (*G. polonicum* \times *verum*). Holzschläge „Jaryna“ zwischen Janów und Szkło bei Lemberg, unter den Stammeltern, sehr selten.
- Hieracium ciliatum* m. Holzschläge in Pasieki.
- *incrassatum* m. (*H. ciliatum* \times *Pilosella*). Unter den Stammeltern in Pasieki.
 - *echioides* Lumn. f. *albicinereum* Čel. Unter der gewöhnlichen Form in Hołosko, selten.
 - *glomeratum* Froehl. (Uechtritz). Waldwiesen in Janów und Dubienko, zahlreich.
 - *glomeratum* Froehl. f. *latifolium* m. Mit der gewöhnlichen Form in Janów und Dubienko.
 - *Nestleri* Vill. Waldwiesen in Dubienko, gemein.
 - *Rostafinskii* m. (*H. polonicum* \times *Auricula*). Unter den Stammeltern in Brzuchowice und Sichów bei Lemberg.
 - *subpratense* \times *Pilosella*. Unter den Stammeltern in Kleparów bei Lemberg.
- Inula supersalicina* \times *hirta*. Buschiger Kalkabhang „Chomic“ in Krzywczyce.

- Inula superhirta* \times *salicina*. Dasselbst.
- Lathyrus pisiformis* L. In Kujdańce bei Zbaraż (leg. Dr. Wołoszczak).
- Potentilla Buschakii* m. Buschige Lehmtriften zwischen Zniesienie und dem Lyczakówer Schranken bei Lemberg.
- *fallacina* m. (*P. recta* m. olim, L. p. p.) Buschige Triften in Bileze (bei Borszczów), Dubienko, Hołosko und Krzywezyce.
 - *Herbichii* m. In Żerebki bei Zbaraż (leg. Wołoszczak).
 - *leopoliensis* m. In Żerebki bei Zbaraż (leg. Wołoszczak).
 - *pallida* Lehm. (*P. recta* L. p. p.). Buczacz in Südostgalizien (leg. Wołoszczak).
 - *pseudo-canescens* m. (*P. pallida* \times *argentea*). Buschiger Kalkabhäng „Chomicc“ in Krzywezyce, unter den Stammeltern, sehr selten.
- Pulmonaria azurea* \times *obscura*. Holzschläge „Jaryna“ bei Janów, sehr selten.
- Pleurospermum austriacum* Hoffm. Holzschläge in Sichów und Dubienko, selten.
- Rosa Klukii* Besser (!). Gebüsche an felsigen Uferabhängen des Dniester in Dobrowlany bei Zaleszczyki (locus classicus Besseri).
- Rubus*¹⁾ *dumetorum* Whe. Gebüsche in Zezawa bei Zaleszczyki und in Dubienko.
- *plicatus* Whe. et Nees. Wälder in Starzyska bei Janów.
 - *suberectus* G. Anders. Wälder in Lesienice und Krzywezyce.
 - *Vestii* Focke. Waldränder und Gebüsche in Hołosko, Krzywezyce und Pasieki.
 - *Vestii* \times *caesius* (?) In Hołosko.
- Rumex Borbásii* m. (*R. confertus* \times *obtusifolius*). Unter den Stammeltern in Kozielniki bei Lemberg.
- *Skojitzii* m. (*R. confertus* \times *crispus*). Dasselbst.
 - *pratensis* M. K. (*R. obtusifolius* \times *crispus*). Unter den Stammeltern in Brzuchowice und nächst dem Stryjer Friedhofe in Lemberg.
- Salvia Besseri* m. (*S. pendula* [*nutans* \times *nemorosa*] \times *dumetorum*). Unter den Stammeltern in Kasperowce bei Zaleszczyki, sehr selten.
- *Kernerii* m. (*S. dumetorum* \times *nutans*). Dasselbst, selten.
 - *podolica* m. (*S. pratensis* \times *nutans*). Unter den Stammeltern in Probabin, selten.
- Salix Caprea* L. f. *angustifolia*. Holzschläge in Zubrza, sehr selten.
- *Caprea* L. f. *rotundifolia*. Holzschläge in Sichów, sehr selten.

¹⁾ Die Bestimmung der *Rubi* verdanke ich Herrn W. O. Focke in Bremen.

Salix livida \times *aurita*. Unter den Stammeltern in Sichów, bei Derewacz nächst Lemberg selten.

— *livida* \times *rosmarinifolia*. Bei Derewacz nächst Lemberg, unter den Stammeltern höchst selten.

— *silesiaca* \times *Caprea*. Ein ♂ Exemplar unter den Stammeltern in Zubrza.

Senecio tenuifolius Jacq. Buschige Kalkabhänge „Chowaniec“ in Malechów.

— *umbrosus* W. K. Buschige Kalkabhänge in Krzywczyce und Dubienko.

Teucrium panonicum A. Kern. Sonnige Gypstriften in Babin (Bukowina) und Probabin.

Thesium ebracteatum Hayne. Torfige Waldwiesen in Berbeki bei Busk.

Thlaspi perfoliatum L. Grasige Kalktriften in Szumanówka nächst Lemberg.

Valeriana bijuga Simk. (*V. tripteris* aut. galic.) Wälder in Saniszczów bei Ustrzyki.

Verbascum phlomoides \times *Lychnitis*. Unter den Stammeltern in Krzywczyce und beim Łyczaków Schranken in Lemberg.

Veronica montana L. In Buchenwäldern bei Lesienice, selten.

Viola montana L. Holzschläge in Berbeki, auf Sandboden, gemein.

— *montana* \times *Riviniana*. Dasselbst, nicht selten.

— *silvatica* (Koch) \times *Riviniana*. Dasselbst, selten.

— *mirabilis* \times *Riviniana*. Unter den Stammeltern in Hołosko, sehr selten.

— *mirabilis* \times *silvatica*. Dasselbst, sehr selten.

— *mirabilis* \times *arenaria* (!). Unter den Stammeltern in Brzuchowice nur an einer einzigen Stelle im Walde, aber zahlreich.

— *collina* \times *hirta*. Unter den Stammeltern in Krzywczyce und Lesienice nicht selten.

— *odorata* L. f. *albiflora*. An einer Stelle bei Cetnerówka nächst Lemberg.

Lemberg, am 9. December 1891.

Litteratur-Uebersicht.¹⁾

August 1892.

Boehm J. Ueber die Respiration der Kartoffeln. (Verh. d. zoolog.-botan. Ges. XLII. Sitzungsber. S. 47—48.) 8^o.

¹⁾ Die „Litteratur-Uebersicht“ strebt Vollständigkeit nur mit Rücksicht auf jene Abhandlungen an, die entweder in Oesterreich-Ungarn erscheinen oder sich auf die Flora dieses Gebietes direct oder indirect beziehen, ferner auf selbstständige Werke des Auslandes. Zur Erzielung thunlichster Vollständigkeit werden die Herren Autoren und Verleger um Einsendung von neu erschienenen Arbeiten oder wenigstens um eine Anzeige über solche höflichst ersucht.

Die Red.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1892

Band/Volume: [042](#)

Autor(en)/Author(s): Blocki Bronislaw [Bronislaus]

Artikel/Article: [Ein kleiner Beitrag zur Flora von Galizien. 349-352](#)