

acutis. A. C. *Hemschinica* radice perenni multicauli, caule haud alato-angulato, foliis non marginatis, floribus paucis etc. longe dignoscitur.

Campanula foliosa Ten. In der Alpengegend des Sv. Nikola-Balkan (Stara Planina).

— *thyrsoides* L. Ueberall auf der Stara Planina.

Asperula graveolens M. B. var. *Pirotica* mihi; caulibus humilioribus. indumento adpresso canescenti. In apricis aridissimis montis Basara prope Pirot; floret junio.

Galium apiculatum S. S. Auf dem Sarlak nächst Pirot.

Cephalaria corniculata Schr. var. *puberula* mihi. Foliis et ramis junioribus minutissime puberulis. In saxosis circa Pirot. Junio.

Scabiosa dubia Vel. In der Alpenregion des Rтанj.

Senecio Bulgaricus Vel. Stara Planina (Balkan).

— *Jacquinianus* Rchb. Stara Planina.

Achillea collina Becker. Um Knjaževac, Zaječar und Pirot.

— *Pannonica* Scheele. Stara Planina.

— *Neilreichii* A. Kern. Stara Planina.

Centaurea cana S. S. Auf der Basara und Midžor (Balkan). Die Individuen von der Basara haben mehr lanzettliche Blätter, während die vom Midžor schmal-lineare Blätter besitzen.

— *decipiens* Thuill. Stara Planina.

— *nigrescens* Willd. Stara Planina.

— *Tartarea* Vel. Auf der Basara bei Pirot.

Crepis rhoeadifolia M. B. Auf dem Rтанj und auf der Vrška Čuka.

Hypochaeris Pelivanoviči Petrovič. Alpenmatten des Midžor (Balkan).

Enumeratio plantarum annis 1888, 1889, 1890 et 1891

in Macedoniaustrali collectarum

autore **L. Charrel** (Salonichi).

(Schluss.¹⁾

Typha latifolia Linné (indicata cum dubio). Khortiatis; *T. angustifolia* L. Salonicae.

Orchis Morio L. Tchajrli-dagh; *O. tridentata* Scop. Khortiatis; *O. mascula* L. Khortiatis; *O. latifolia* L. Khortiatis; *O. sumbulina* L. Khortiatis; *O. pseudosumbulina* Tenore. Khortiatis.

Platanthera montana Schm. Khortiatis.

Cephalanthera ensifolia Murr. Khortiatis.

Epipactis latifolia All. Pournar-dagh.

Crocus Olivieri J. Gay in montosis Salonicae; *C. aureus* S. S. Livadia; *C. chrysanthus* Herbert. Kiretch-Keni.

¹⁾ Vergl. Nr. 41, S. 380.

Romulea Linaresii Parlatore. Salonicæ.

Iris Sintenisii Janka. Kiretch-Keni, Khortiatis; *I. Germanica* L. Khortiatis; *I. Reichenbachiana* Heuff. adhuc non reperta in Macedonia. Kiretch-Keni.

Galanthus Graecus Orphanides. Livadia, adhuc non repertus in terrâ continentali.

Narcissus pseudo-narcissus L. ubique cultus.

Colchicum latifolium G. G. Kiretch-Keni.

Lilium candidum L. absque dubio ad Kiretch-Keni spontaneum; *L. Martagon* L. ubique in silvis.

Gagea foliosa Presl. Salonicæ; *G. Bohemica* (Zauschn.). Salonicæ;

G. reticulata Pallas γ. *fibrosa* Boissier. Salonicæ.

Ornithogalum nutans L. β. *prasandrum* Baker ubique in montosis; *O. umbellatum* L. Salonicæ; *O. nanum* S. S. ubique; *O. nanum* β. *longipes* Bess. Salonicæ.

Allium ampeloprasum L. β. *leucanthum* Regel. Salonicæ; *A. atro-violaceum* Bess. Salonicæ; *A. flavum* L. β. *minus* Boiss. Khortiatis; *A. stamineum* Bss. Kiretch-Keni; *A. stamineum* β. *Hypermantium* Bss. Khortiatis, Tchaïrli-dagh, Pournar-dagh; *A. nigrum* L. ubique in montosis.

Muscari Charreliae Heldreich. Distributum in herbario Graeco normali a claro Heldreich. Salonicæ, Cassandrae; *M. neglectum* Guss. Salonicæ; *M. commutatum* Guss. Salonicæ; *M. botryoides* L.. varietas *Kernerii* Marchesetti. Kiretch-Keni, Khortadj.

Hyacinthus Orientalis L. circum urbem Salonicæ, depauperatum.

Asphodelus fistulosus L. Salonicæ.

Paris quadrifolia L. Pournar-dagh. A divo Boissiero non indicata in Oriente Europaeo.

Convallaria majalis L. Kiretch-Keni in umbrosis.

Polygonatum vulgare L. Khortiatis.

Asparagus officinalis L. Salonicæ aufuga.

Smilax aspera L. β. *Mauritanica*. Cassandra.

Luzula albida D. C. β. *rubella* Tchaïrli-dagh non indicata in Fl. Orient. d. Boissieri.

Juncus atratus Krock. Tchaïrli-dagh; *J. buffonius* L. var. *fasciculatus* Koch Cassandrae.

Cyperus schoenoides Griseb. Cassandra; *C. glaber* L. Serrès.

Scirpus setaceus L. Kiretch-Keni; *S. holoschoenus* L. α. *genuinus*. Salonicæ.

Eriophorum angustifolium Roth. Tchaïrli-dagh.

Carex Linkii (Schk.) Salonicæ; *C. gynobasis* Vill. Khortiatis.

Panicum Crus galli L. β. *echinatum* Willd. Tekkéli; *P. erucaeiforme* S. S. Salonicæ.

Beckmannia erucaeformis L. Khortiatis.

Andropogon hirtus L. Salonicæ.

Phacelurus digitatus S. S. ubique.

- Oryza sativa* L. Annis triginta praecedentibus non culta, in paludosis Tekkeli crescit.
- Phalaris paradoxa* L. ubique; *P. coerulescens* Desf. Salonicæ, Cassandra.
- Mibora minima* L. Salonicæ frequens.
- Alopecurus utriculatus* L. ubique.
- Stipa tortilis* Desf. Salonicæ; *S. capillata* L. Kiel-tépé.
- Piptatherum coerulescens* Desf. ubique in montosis.
- Agrostis spica-venti* L. Salonicæ.
- Lagurus ovatus* L. Cassandrae.
- Calamagrostis Epigeios* L. Tchaïrli-dagh; *C. sylratica* Schrad. Tchaïrli-dagh.
- Aira minuta* Loefl. Salonicæ.
- Eleusine Indica*** L. Tertia statio Europaea. Ad moenia Salonicæ.
- Diplachne serotina* L. Salonicæ, Cassandrae.
- Arundo Donax* L. ubique.
- Koeleria splendens* var. *australis* Kern. Kiel-tépé, non descripta in Fl. Orient.
- Eragrostis megastachya* Link. forma *Thessalonica* mihi! spiculis quinque centimetris longis et comam albam formantibus. Elegantissima forma.
- Briza minor* L. Tchaïrli-dagh, Salonicæ.
- Aeluropus littoralis* Willd. ubique in maritimis.
- Dactylis glomerata* L. *β. Hispanica* Roth. in siccis.
- Schismus calycinus* L. prima statio cognita in Europâ orientali. Salonicæ.
- Glyceria fluitans* L. Khortiatis.
- Atropis festucaeformis* Host. Salonicæ.
- Vulpia sciurooides* Roth. Cassandrae.
- Nardurus tenuiflorus* Schrad. Salonicæ rarer.
- Catapodium loliaceum* Huds. Cassandrae.
- Selerochloa dura* L. ubique.
- Bromus rigidus* Roth. Cassandrae.
- *intermedius* Guss. Salonicæ.
 - *patulus* M. et K. Salonicæ.
- Brachypodium distachyrum* L. Salonicæ.
- *sylvaticum* Huds. Tchaïrli-dagh.
 - *pinnatum* L. Khortiatis.
 - *ramosum* L. Cassandrae.
- Agropyrum littorale* Host. Salonicæ.
- Aegylops caudata* L. Kiel-tépé.
- *comosa* S. et S. Salonicæ.
- Lolium perenne* L. Salonicæ aufuga.
- *rigidum* Gaud.
 - *rottbollioides* Heldr. Salonicæ.
 - *rigidum* var. *subulatum* Visiani. Cassandrae.

Hordeum maritimum With. Salonicae.

Pinus silvestris L. Tchaïrli-dagh.

— *Halepensis* Mill. Cassandrae.

Biota Orientalis L. ubique culta.

Cupressus sempervirens L. ubique culta.

Asplenium Adiantum nigrum L. ubique.

— *septentrionale* L. ubique.

Aspidium aculeatum L. β. *Swartzianum* Koch. In montosis frequens.

Nephrodium Felix mas L. Tchaïrli-dagh.

Beiträge zur Flora der Balkanhalbinsel.

Von Dr. E. v. Halácsy (Wien).

IX.

Florula insulae Thasos.

P. Sintenis und J. Bornmüller, die durch ihre wiederholten Reisen wesentlich zur Kenntniss der orientalischen Flora beitrugen, hielten sich in den Monaten Mai, Juni und Juli des Jahres 1891 auf der Insel Thasos auf, um die Flora derselben zu durchforschen. Die mitgebrachte reiche Ausbeute wurde von ihnen mir zur Determination übergeben, und ich halte es für angezeigt, dieselbe hier in ihrer Gänze zu publiciren, da die Flora der genannten Insel bis auf wenige Angaben Grisebach's bisher fast unbekannt war.

Anemone stellata Lam. Auf dem Mt. Trapeza.

Ficaria ranunculoides Moench. Auf dem Mt. Elias.

Ranunculus Illyricus L. Auf dem Mt. Trapeza.

— *psilostachys* Griseb. Auf dem Mt. Elias.

— **Thasinus** n. spec. E sectione „Euranunculus“ Boiss. Fl. Or. I. p. 25. Fibris radicalibus oblongo-cylindricis; caulinibus gracilibus adscendentibus, solitariis, glabris, infra medium subdichotome ramosis, foliatis, multifloris; foliis glaberrimis, radicalibus et caulinis inferioribus longe petiolatis ambitu orbiculatis, basi cordatis, tripartitis, segmentis in lobos ovatos obtusos fisis, superioribus breviter petiolatis trifidis, segmentis lanceolatis plerumque indivisis; pedunculis sparsim pilosis vel glabriusculis; calyce lutescento sepalis patentibus subglabris; petalis luteis obovato-cuneatis calyce 2—3 plo longioribus; spica fructifera globosa, axi glabra, carpellis ovato-rotundis planocompressis laevibus sparsim pilosis in rostrum subaequilongum apice subcurvatum abeuntibus.

Stengel 15—30 Cm. hoch, sehr zart, hin und hergebogen. Blätter 4—5 Cm. im Durchmesser; Blüthen 15 Mm. im Durchmesser. Fruchtköpfchen erbsengross. Eine ganz ausgezeichnete,

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1892

Band/Volume: [042](#)

Autor(en)/Author(s): Charrel Louis

Artikel/Article: [Enumeratio plantarum annis 1888, 1889, 1890 et 1891.
409-412](#)