

acutis. A *C. Hemschinica* radice perenni multicauli, caule haud alato-angulato, foliis non marginatis, floribus paucis etc. longe dignoscitur.

*Campanula foliosa* Ten. In der Alpengegend des Sv. Nikola-Balkan (Stara Planina).

— *thyrsoides* L. Ueberall auf der Stara Planina.

*Asperula graveolens* M. B. var. *Pirotica* mihi; caulibus humilioribus. indumento adpresso canescenti. In apricis aridissimis montis Basara prope Pirot; floret junio.

*Galium apiculatum* S. S. Auf dem Sarlak nächst Pirot.

*Cephalaria corniculata* Schr. var. *puberula* mihi. Foliis et ramis junioribus minutissime puberulis. In saxosis circa Pirot. Junio.

*Scabiosa dubia* Vel. In der Alpenregion des Rtanj.

*Senecio Bulgaricus* Vel. Stara Planina (Balkan).

— *Jacquinianus* Rehb. Stara Planina.

*Achillea collina* Becker. Um Knjaževac, Zaječar und Pirot.

— *Pannonica* Scheele. Stara Planina.

— *Neilreichii* A. Kern. Stara Planina.

*Centaurea cana* S. S. Auf der Basara und Midžor (Balkan). Die Individuen von der Basara haben mehr lanzettliche Blätter, während die vom Midžor schmal-lineare Blätter besitzen.

— *decipiens* Thuill. Stara Planina.

— *nigrescens* Willd. Stara Planina.

— *Tartarea* Vel. Auf der Basara bei Pirot.

*Crepis rhoeadifolia* M. B. Auf dem Rtanj und auf der Vrška Čuka.

*Hypochaeris Pelivanovići* Petrovič. Alpenmatten des Midžor (Balkan).

## Enumeratio plantarum annis 1888, 1889, 1890 et 1891 in Macedoniâ australi collectarum

autore **L. Charrel** (Salonichi).

(Schluss.<sup>1)</sup>)

*Typha latifolia* Linné (indicata eum dubio). Khortiatis; *T. angustifolia* L. Salonicae.

*Orchis Morio* L. Tchaïrli-dagh; *O. tridentata* Scop. Khortiatis; *O. mascula* L. Khortiatis; *O. latifolia* L. Khortiatis; *O. sambucina* L. Khortiatis; *O. pseudosambucina* Tenore. Khortiatis.

*Platanthera montana* Schm Khortiatis.

*Cephalanthera ensifolia* Murr. Khortiatis.

*Epipactis latifolia* All. Pournar-dagh.

*Crocus Olivieri* J. Gay in montosis Salonicae; *C. aureus* S. S. Livadia; *C. ch. janthus* Herbert. Kiretch-Keni.

<sup>1)</sup> Vergl. Nr. 41, S. 380.

- Romulea Linaresii* Parlatores. Salonicae.
- Iris Sintenisii* Janka. Kiretch-Keni, Khortiatiss; *I. Germanica* L. Khortiatiss; *I. Reichenbachiana* Heuff. adhuc non reperta in Macedonia. Kiretch-Keni.
- Galanthus Graecus*** Orphanides. Livadia, adhuc non repertus in terrâ continentali.
- Narcissus pseudo-narcissus* L. ubique cultus.
- Colchicum latifolium* G. G. Kiretch-Keni.
- Lilium candidum* L. absque dubio ad Kiretch-Keni spontaneum;  
*L. Martagon* L. ubique in silvis.
- Gagea foliosa* Presl. Salonicae; *G. Bohemica* (Zauschn.). Salonicae;  
*G. reticulata* Pallas  $\gamma$ . *fibrosa* Boissier. Salonicae.
- Ornithogalum nutans* L.  $\beta$ . *prasandrum* Baker ubique in montosis;  
*O. umbellatum* L. Salonicae; *O. nanum* S. S. ubique; *O. nanum*  $\beta$ . *longipes* Bess. Salonicae.
- Allium ampeloprasum* L.  $\beta$ . *leucanthum* Regel. Salonicae; *A. atro-violaceum* Bess. Salonicae; *A. flavum* L.  $\beta$ . *minus* Boiss. Khortiatiss; *A. stamineum* Bss. Kiretch-Keni; *A. stamineum*  $\beta$ . *Hymettium* Bss. Khortiatiss, Tchaïrli-dagh, Pournar-dagh; *A. nigrum* L. ubique in montosis.
- Muscari Charrelii*** Heldreich. Distributum in herbario Graeco normali a clero Heldreich. Salonicae, Cassandreae; *M. neglectum* Guss. Salonicae; *M. commutatum* Guss. Salonicae; *M. botryoides* L. varietas *Kernerii* Marchesetti. Kiretch-Keni, Khortadj.
- Hyacinthus Orientalis* L. circum urbem Salonicae, depauperatum.
- Asphodelus fistulosus* L. Salonicae.
- Paris quadrifolia* L. Pournar-dagh. A divo Boissiero non indicata in Oriente Europaeo.
- Convallaria majalis* L. Kiretch-Keni in umbrosis.
- Polygonatum vulgare* L. Khortiatiss.
- Asparagus officinalis* L. Salonicae aufuga.
- Smilax aspera* L.  $\beta$ . *Mauritanica*. Cassandrea.
- Luzula albida*** D. C.  $\beta$ . *rubella* Tchaïrli-dagh non indicata in Fl. Orient. d. Boissieri.
- Juncus atratus* Krock. Tchaïrli-dagh; *J. buffonius* L. var. *fasciculatus* Koch Cassandreae.
- Cyperus schoenoides* Griseb. Cassandrea; *C. glaber* L. Serrès.
- Scirpus setaceus* L. Kiretch-Keni; *S. holoschoenus* L.  $\alpha$ . *genuinus*. Salonicae.
- Eriophorum angustifolium* Roth. Tchaïrli-dagh.
- Carex Linkii* (Schk.) Salonicae; *C. gynobasis* Vill. Khortiatiss.
- Panicum Crus galli* L.  $\beta$ . *echinatum* Willd. Tekkéli; *P. erucaeforme* S. S. Salonicae.
- Beckmannia erucaeformis* L. Khortiatiss.
- Andropogon hirtus* L. Salonicae.
- Phacelurus digitatus* S. S. ubique.

- Oryza sativa* L. Annis triginta praecedentibus non culta, in paludosis Tekkeli crescit.
- Phalaris paraloxa* L. ubique; *P. coerulescens* Desf. Salonicae, Cassandra.
- Mibora minima* L. Salonicae frequens.
- Alopecurus utriculatus* L. ubique.
- Stipa tortilis* Desf. Salonicae; *S. capillata* L. Kiel-tépé.
- Piptatherum coerulescens* Desf. ubique in montosis.
- Agrostis spica-venti* L. Salonicae.
- Lagurus ovatus* L. Cassandreae.
- Calamagrostis Epigeios* L. Tchaïrli-dagh; *C. sylvatica* Schrad. Tchaïrli-dagh.
- Aira minuta* Loeffl. Salonicae.
- Eleusine Indica*** L. Tertia statio Europaea. Ad moenia Salonicae.
- Diplachne serotina* L. Salonicae, Cassandreae.
- Arundo Donax* L. ubique.
- Koeleria splendens* var. *australis* Kern. Kiel-tépé, non descripta in Fl. Orient.
- Eragrostis megastachya* Link. forma *Thessalonica* mihi! spiculis quinque centimetris longis et comam albam formantibus. Elegantissima forma.
- Briza minor* L. Tchaïrli-dagh, Salonicae.
- Aeluropus littoralis* Willd. ubique in maritimis.
- Dactylis glomerata* L.  $\beta$ . *Hispanica* Roth. in siccis.
- Schismus calycinus* L. prima statio cognita in Europâ orientali. Salonicae.
- Glyceria fluitans* L. Khortiatis.
- Atropis festucaeformis* Host. Salonicae.
- Vulpia sciuroides* Roth. Cassandreae.
- Nardurus tenuiflorus* Schrad. Salonicae rarior.
- Catapodium loliaceum* Huds. Cassandreae.
- Sclerochloa dura* L. ubique.
- Bromus rigidus* Roth. Cassandreae.
- *intermedius* Guss. Salonicae.
- *patulus* M. et K. Salonicae.
- Brachypodium distachyum* L. Salonicae.
- *sylvaticum* Huds. Tchaïrli-dagh.
- *pinnatum* L. Khortiatis.
- *ramosum* L. Cassandreae.
- Agropyrum littorale* Host. Salonicae.
- Aegilops caudata* L. Kiel-tépé.
- *comosa* S. et S. Salonicae.
- Lolium perenne* L. Salonicae aufuga.
- *rigidum* Gaud.
- *rottbollioides* Heldr. Salonicae.
- *rigidum* var. *subulatum* Visiani. Cassandreae.

- Hordeum maritimum* With. Salonicae.  
*Pinus silvestris* L. Tchairli-dagh.  
— *Halepensis* Mill. Cassandrae.  
*Biota Orientalis* L. ubique culta.  
*Cupressus sempervirens* L. ubique culta.  
*Asplenium Adiantum nigrum* L. ubique.  
— *septentrionale* L. ubique.  
*Aspidium aculeatum* L.  $\beta$ . *Swartzianum* Koch. In montosis frequens.  
*Nephrodium Filix mas* L. Tchairli-dagh.

## Beiträge zur Flora der Balkanhalbinsel.

Von Dr. E. v. Halácsy (Wien).

### IX.

#### Florula insulae Thasos.

P. Sintenis und J. Bornmüller, die durch ihre wiederholten Reisen wesentlich zur Kenntniss der orientalischen Flora beitrugen, hielten sich in den Monaten Mai, Juni und Juli des Jahres 1891 auf der Insel Thasos auf, um die Flora derselben zu durchforschen. Die mitgebrachte reiche Ausbeute wurde von ihnen mir zur Determination übergeben, und ich halte es für angezeigt, dieselbe hier in ihrer Gänze zu publiciren, da die Flora der genannten Insel bis auf wenige Angaben Grisebach's bisher fast unbekannt war.

*Anemone stellata* Lam. Auf dem Mt. Trapeza.

*Ficaria ranunculoides* Moench. Auf dem Mt. Elias.

*Ranunculus Illyricus* L. Auf dem Mt. Trapeza.

— *psilostachys* Griseb. Auf dem Mt. Elias.

— ***Thasius*** n. spec. E sectione „Euranunculus“ Boiss. Fl. Or. I. p. 25. Fibris radicalibus oblongo-cylindricis; caulibus gracilibus adscendentibus, solitariis, glabris, infra medium subdichotome ramosis, foliatis, multifloris; foliis glaberrimis, radicalibus et caulinis inferioribus longe petiolatis ambitu orbiculatis, basi cordatis, tripartitis, segmentis in lobos ovatos obtusos fissis, superioribus breviter petiolatis trifidis, segmentis lanceolatis plerumque indivisis; pedunculis sparsim pilosis vel glabriusculis; calyce lutescento sepalis patentibus subglabris; petalis luteis obovato-cuneatis calyce 2—3 plo longioribus; spica fructifera globosa, axi glabra, carpellis ovato-rotundis planocompressis laevibus sparsim pilosis in rostrum subaequilongum apice subcurvatum abeuntibus.

Stengel 15—30 Cm. hoch, sehr zart, hin und hergebogen. Blätter 4—5 Cm. im Durchmesser; Blüten 15 Mm. im Durchmesser. Fruchtköpfchen erbsengross. Eine ganz ausgezeichnete,

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1892

Band/Volume: [042](#)

Autor(en)/Author(s): Charrel Louis

Artikel/Article: [Enumeratio plantarum annis 1888, 1889, 1890 et 1891, 409-412](#)