

Europaea. (Sitzungsber. d. niederrh. Gesellsch. d. Natur- und Heilkunde in Bonn 1893, S. 27—38.) 4. Abb.

Underwood L. M. Index Hepaticarum. I. Bibliography. (Mem. of the Torrey botanical Club, Vol. IV. Nr. 1.) 8°. 91 p.

Wisselingh C. van. Over de Kurklamel en het Suberine. Amsterdam (I. Müller). Gr. 8°. 51 p. 2 Tab.

Flora von Oesterreich-Ungarn.

West-, Nord- und Mittel-Ungarn. ¹⁾

Referent: Dr. Vincenz v. Borbás (Budapest).

* *Symphytum Ullepii* Wettst., Rothkloster (11).

Sempervivum soboliferum Sims, bei Zaskov (10).

Bupleurum coloratum Schur, Drechselhäuschen, Rother Lehm, Blatnitsa (Borb. 1890, 1892). — *B. tenuissimum* L. und *B. affine* Sadl., Neusiedler See (2). — **Chaerophyllum aromaticum* L. var. *cinerascens* Borb. foliolis subtus conspicue cano-pubescentibus, Petrozsény (Borb. 1872). — *Cerefolium nitidum* (Wahlenb.), Uj-Tátrafüred (Borb. 1890). — *Foeniculum capillaceum* Gilib., verwildert bei Kis-Maros (6). — *Eryngium campestre* L., Ober-Podgoria, 500 M. s. m. (21). — *Oenanthe aquatica* L. und *Sium latifolium* L. var. *heterophyllae* Borb., Rákos bei Budapest (6). — *Peucedanum officinale* L., Podersdorf am Neusiedler See (2). — *Turgenia latifolia* (L.), Parndorf (2).

Thalictrum simplex L., Poprád-Felka (19).

Th. aquilegifolium L., Rende (21). — *Ranunculus sceleratus* L., Vörösvágás, 700 M. s. m. (21). — *Aquilegia nigricans* Baumg., an mehreren Orten bei den Herkulesbädern (15). — **Aconitum Schurii* Beck (*A. paniculatum* et *A. toxicum* Schur), Ócsém teteje, Frumoasze, Bucsecs, Stefflestye (1). — *Aconitum Cammarum* Jacq. et *A. Hosteanum* Schur, Liptó-Ujvár (Borb. 1890). — *Delphinium orientale* Gay, Szeged, Pilis, Monor, Farkasvölgy und Szépárok bei Ofen, Fegyvernek (Ref.). — *D. Consolida* L. var. *adenopodium* Borb., Békás-Megyér (Borb. 1890).

Helianthemum rupifragum Kern, Sivibrada (19).

Roseda Phyteuma L. Alsó-Pahok (14); Keszthely (Borb.). — *R. luteola* L., bei Arács (Ref.).

Corydalis pumila Rehb., Wolfsthal (2). — *C. capnoides* L., Rothkloster (Ullep. in 11).

¹⁾ Vergl. Oesterr. botan. Zeitschr. 1893, S. 66.

- Roripa palustris* Leyss., Kőszeg (21, 14). — *R. armoracioides* Tausch var. *Davica* Borb., Arad (11). — **R. anceps* Wahlenb. (*R. amphibia* × *palustris*!), einmal bei Neu-Pest (Borb. 1887). — *R. Kernerii* Menyh., Rákos bei Budapest, unweit des Storch-(Gólya-) Gasthauses (Storek in 11 ist ein Druckfehler).
- Aethionema gracile* DC., Balaton-Füred, Arács, Sz.-Király-Szabadi (6, Borb. 1893).
- Arabidopsis Thaliana* (L.), Pozsony (16). — *Alyssum saxatile* L., Badaacsony, Nagy-Somló bei Somló-Vásárhely (Ref.). — *Draba lasiocarpa* Roch. Sivibrada, Drevenyik (19). — *Sisymbrium orientale* L., *leio-* und *hebecarpum*, bei Budapest häufig (Ref.). — *S. Loeselii* L., Keszthely (Borb.). — *Lepidium crassifolium* W. et Kit., Neusiedler See von Winden bis Appetlan (2), Duna-Pataj (Borb. 1879). — *Soria Syriaca* (L.), von Bruck gegen den Neusiedler See (2), Balaton-Füred (Borb. 1891). — *Neslia paniculata* (L.), Ilija bei Selmechánya, Stubnya, Vésztő (Ref.). — *Turrilis glabra* L., Palics (Borb. 1879).
- Biscutella laevigata* L. var. *trachycarpa* Borb. ined. siliculis tuberculato-scabris, mit dem Typus am Adlersberge bei Budapest.
- Viola Jioi* Janka, Herkulesbäder (15). — *V. lucorum* Rchb., Steirergrund bei Pozsony. — *V. leucoceras* Borb. 1890 (*V. ceticia* Beck. *V. neglecta*? Schm., *V. lucorum* × *Riviniiana*), ebenda, aber selten (17). — *V. erictorum* Schrad., Popräd (Borb. 1890); — *V. Kalksburgensis* Wiesb. und *V. cyanea* Čelak. var. *perfimbrata* Borb., Wolfsthal bei Hainburg (2). — *V. arenaria* DC., Keszthely (Borb. 1891).
- Aldrovanda vesiculosa* L. wächst im Békésér Comitate kaum mehr infolge der Trockenlegung (Ref.).
- Sabulina Banatica* Heuff., wäre nach (1) nur *Alsine setacea* M. et Koch. — *Alsine graminifolia* Gm., Arzsána bei Plugova (Borb. in 1). — *Buda marginata* (DC.), bei der Hunyadyquelle in Budapest (Borb. 1878). — *B. rubra* L., Zaskov (10). — *Cerastium moesiacum* Friv. (*C. Transylvanicum* Schur), Arpás (Vortup), Sina alp. Fogaras (1). — *Vaccaria grandiflora* (Fisch.), Vésztő, Palics, Szeged (Borb. 1879).
- Athaea pallida* W. et Kit. Csikihegy bei Budapest, Puszta-Tenyő, Puszta-Pó, Mező-Tur (Borb. 1884), Martonvásár (11). — *A. officinalis* L. var. *argutidens* Borb., Budapester Gegend, Vésztő (11), aber *A. micrantha* Wiesb. ist davon gut verschieden und ist die letztere mehr mit *A. Taurinensis* verwandt. — *A. canabina* L., Paks, Kömlöd (11).
- Tilia vulgaris* Hayne, Auwinkel bei Budapest (Ref.).
- Geranium pratense* L., Uj-Borlova in cott. Krasso-Szórény (Borb. 1889), Erlau (Borb. 1864), Batizfalva, Stubnya (Borb. 1890), Zaskov (10); — *G. dissectum* L., Szliács (Borb. 1871).

- Epilobium rossum* Schreb., Stuhnya, Mosocz, Blatnitzza (Borb. 1892), Zaskov (10). — *E. Dodonaei* Vill., Kralovan (Ref.).
- Oxalis stricta* L., Duna-Pataj (Borb. 1879).
- Aria terminalis* L. var. *semiterminalis* Borb. 1878 (var. *mollis* in 2), Berge bei Budapest (Ref.).
- Robus saxatilis* L., Zaskov (10). — *R. coronae Hungariae* Borb. (ex *Adenophoris*, foliolis supra asterotrichis), Orsova. — *R. microsetus* Borb. (*R. Bertricensis* Hol., non Wirtg.), N. Podhrágy. — *R. retinervis* Borb. (sternhaarige *Radula*), ibid. — *R. brachythyrus* Borb., eine Form der „*Caesii*“ vom Svábhegy bei Budapest mit oberseits sternhaarigen Blättern (3), (Cfr. Oesterr. botan. Zeitschr. 1892, S. 362). — **R. lasiaxon* Borb. et Waiss., eine mit dem *R. Caflischii* Focke verwandte Form der *Adenophori*, mit horizontal abstehenden Haaren der blühenden Zweige, Köszeg (Waiss.!); — *R. Wiesbauri* Sabr. (angeblich *R. macrostemon* × *Vestii*, aber *R. Vestii* scheint auch eine hybride Form zu sein!), Pozsony (16). — *R. rivularis* M. et Wirtg. var. *subsericeus* Sabr., Menyháza (16).
- Potentilla rupestris* L., Badacsony (Borb. 1891). — *P. Serpentina* Borb., Salomonfalva (21). — *P. Wolfiana* Siegf. (*P. canescens* × *obscura*, Oesterr. botan. Zeitschr. 1892, S. 146) und *P. canescens* Bess. var. *oligotricha* Borb., Güns. — *P. Kernerii* Borb. ist nicht, wie in (2) angegeben wird, eine *P. canescens typica*, sondern eine beständige, hie und da bei Ofen häufige Form aus der Gruppe der „*Canescentes*“ (Ref.).
- Rosa tomentosa* Sm. und *R. Ilseana* Crép., Zaskov (10). — *R. canina* L. var. *gregaria* u. *Istropolitana* H. Br., Kaiserweg bei Pozsony (2). — *R. euorophylla* Borb., Neusiedler See, var. *aciphylla* Rau, Pozsony, var. *Podolica* Tratt., Pozsony, var. *viridicata* Pug., Neusiedler See. — *R. villosinucula* Rip. u. *ascita* Déségl., Pozsony. — var. *lapilipoda* Kell., Neusiedler See. — *R. dumetorum* Thuill., *typica*, *R. cinerosa* Déségl. und *R. Walziana* Borb., Haglersberg bei dem Neusiedler See. — *R. pilosa* Op., *hirtifolia* H. Br., *platyphylloides* Chab., *Reussii* H. Br., Pozsony; — *R. collina* Jacq. var. *persimilis* Kell., *incerta* Déségl., bei Goysz, var. *tortuosa* Wierzb., Léka. — *R. Belgradensis* Panč., Thebener Kogel. — *R. trachyphylla* Rau, Pozsony, — *R. vinodora* Kern., Haglersberg, — *R. nemorosa* Libert, Neusiedl am See. — *R. setocarpa* Borb. et Hol., Thebener Kogel. — *R. Mareyana* Boullu, Haglersberg (2).
- Cytisus biflorus* L'Her., Rákos-Palota, Kecel (11). — *Trigonella Monspeliaca* L., Goysz, Neusiedler See (2). — *Melilotus procrumbens* Bess., von Breitenbrunn bis Neusiedl. — *M. macrorrhizus* W. et Kit., Neusiedler See (2). — *Trifolium parviflorum* Ehrh. und *T. striatum* L., Parndorf, Neusiedl (2). — *Astragalus exscapus* L., Auwinkel bei Budapest! (Ref.). —

Oxytropis Tatrae Borb. exsicc. 1890 (*Phaca campestris* Wallenb.), Ziegenrücken der Bélaër Alpen. — *O. pilosa* (L.) var. *Hungarica* Borb., longius villosa, pilis patentissimis, Budapest, Neusiedler See (2). — *O. sericea* DC., Bélaër Kalkalpen der Tatra (19). — *Vicia lathyroides* L., Haglersberg, var. *leucopetala* Borb. et Sabr., Pozsony (17). — *Lathyrus Nissolia* L., Héviz (14), — *L. hirsutus* L., Magyarfalva (2).

Botanische Gesellschaften, Vereine, Congresses etc.

65. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu Nürnberg.

Die Versammlung fand in der Zeit vom 10. bis 16. September d. J. statt und verlief dem in Nr. 8 mitgetheilten Programme gemäss. Stadt und Bürger von Nürnberg haben sich vereinigt, um der Versammlung einen glänzenden Verlauf zu sichern. Die botanische Abtheilung war gut besucht, aus der Zahl der Theilnehmer seien genannt: Buchner (Nürnberg), F. Cohn (Breslau), M. Fünfstück (Stuttgart), K. Giesenhagen (München), E. Chr. Hansen (Kopenhagen), R. Hegler (Rostock), F. Heydrich (Langensalza), G. Holzner (München), G. Karsten (Leipzig), O. Kirchner (Hohenheim), P. Klemm (Leipzig), O. Kuntze (Berlin), G. Lindau (Berlin), P. Magnus (Berlin), M. Miyoshi (Tokio), C. Müller (Berlin), Oltmanns (Freiburg i. B.), O. Pazschke (Leipzig), W. Pfeffer (Leipzig), Pringsheim (Berlin), M. Raciborski (Krakau), Rehm (Regensburg), Reinitzer (Prag), A. Schulz (Halle), A. Schwarz (Nürnberg), G. B. Toni (Parma), C. Tubeuf (München), Wettstein (Prag) u. A.

In der allgemeinen Sitzung am 11. September hielt Geheimrath Dr. W. Pfeffer einen Vortrag: „Ueber die Reizbarkeit der Pflanzen“. — In den Sitzungen der botanischen Abtheilung wurden folgende Vorträge gehalten: E. Ch. Hansen: Botanische Untersuchungen über Essigsäurebakterien. — W. Pfeffer: Ueber Arbeitsleistungen der Pflanzen. — R. Wettstein: Die geographische und systematische Anordnung der Pflanzenarten. — F. Cohn: Ueber thermogene Bakterien. — F. Heydrich: Vier neue Algen. — P. Magnus: Ueber zwei von Bornmüller in Persien gesammelte Pilze. — P. Klemm: Desorganisationserscheinungen im Protoplasma. — K. Müller: Ueber das Wachstum der Pollenschläuche in den Narbenpapillen von Silenaceen. — Kayser: Ueber das Ovulum von *Croton*. — Toni: Ueber Infrafrustalarbildungen bei *Amphora ovalis*. — M. Miyoshi: Ueber Chemotropismus der Pollenschläuche. — M. Fünfstück: Ueber die Permeabilität der Niederschlagsmembranen. — G. Karsten: Ueber Elateren bei Farren. — P. Magnus:

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-
Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische
Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1893

Band/Volume: [043](#)

Autor(en)/Author(s): Borbas [Borbás] Vincenz von

Artikel/Article: [Flora von Oesterreich-Ungarn. 359-362](#)