

europeische Art als sehr auffallend verschiedener Typus, so dass ich ihre Entdeckung als den weitaus wichtigsten und werthvollsten Fund, den Herr Dr. Baldacci hener gemacht hat, bezeichnen muss.

Budapest, am 22. October 1897.

XXXII.

Wulfenia Baldaccii.

Nova species.

Perennis. Rhizomate crasso, brevi, fibroso: foliis subradicalibus, paucis, tenuibus, parvis, obovato-spathulatis, obtusis, in petiolum paulo breviorem attenuatis, obtuse crenato lobatis, crenis iterum crenulatis, ad petiolum et supra pilosis, subtus pilis paucis praecipue ad nervum medianum obsitis; pendunculis scapiformibus, 1—2, simplicibus, spithameis, pilis articulatis glanduliferis tectis, squamisque paucis ovatis, integris vel denticulatis obsitis, in racemum simplicem, gracilem, laxum, pauciflorum, demum elongatum abeuntibus: floribus dissitis, pedicellatis, pedicellis glandulosis, calyce florifero duplo fere brevioribus, fructiferis demum elongatis, erectis, strictis: bracteis lanceolatis; calycibus corollis $2\frac{1}{2}$ -plo brevioribus, sepalis 5, linear-lanceolatis, subsetaceis, ad dorsum et margine glandulosis, apice obtusis-inseulis: calycibus fructiferis paulo auctis; corolla gracilis, coeruleae, calyce $2\frac{1}{2}$ -plo longioris tubo aequali, recto, extus pilis paucis glanduliferis adsperso, versns limbum sensim ampliato: fance pilosa; limbo bilabiato, labio superiore breviore, bifido, crenulato, fance subincumbenti: inferiore trilobo, lobis ovatis, obtusis, intermedio paulo majore: staminibus binis,¹⁾ tubo sub labio superiore insertis, antheris geminis, basi connatis; stylo gracili, longissimo, corallam excedente: stigmate capitato; capsula glanduloso-pilosa, ovata, biloculari, septieida et loculicida, placentatione centrali, seminibus minutis, ovoideis, dilute fuscis.

Planta 14—19 cm alta: folia 4·5—8·5 cm longa, 1·5—3 cm lata: racemus 5—7 cm longus: pedicelli flor. 1·5 mm. fructif. ad 5 mm longi; calys flor. 3·5, fructifer 5 mm longus: corella 15 mm longa: capsula 4·5 mm longa, 2 mm lata.

Habitat in Albaniae septentrionalis rupestribus ad regionem Fagi montis Parun district. Skutari. nbi Idibus Juliis a. 1897 detexit am. et oculatissimus Dr. Ant. Baldacci Boloniensis, cui species nova eximia generisque in Europa secunda dedicata sit.

¹⁾ Generi *Wulfeniae* (Hookeri Fl. of Brit. Ind. IV. p. 248 exceptam, ubi tamen sphalma typogr.!) semper stamina 2 adscribuntur, adtamen in *Wulfenia Carinthiaca* hinc-indē stamina 4 observavi.

A *Wulf. carinthiaca* Jacqu. Misc. II., p. 66, tab. 8, Ieon. pl. rar. p. 1. tab. 2! differt s tatura humili, foliis minoribus, profundius inciso-crenatis lobatisve, supra pilosis nec glabris, seapi et inflorescentiae indumento, racemo elongato, laxo, floribus dissitis, corollae calyce $2\frac{1}{2}$ -plo longioris tubo recto, tenuiore, longiore; calycibus multo minoribus, glandulosis: pedicellis floriferis calyce duplo brevioribus, capsulis glandulosis, minoribus.

A *Wulfenia orientali* Boiss. Diagn. Ser. I. No. 4. p. 75! Flor. orient. IV. p. 433. foliis parvis non coriaceis, pilosis, pedicellis brevioribus, inflorescentiae indumento, capsulis minoribus etc. longius distat.

Habitu proprius accedit ad *Wulfeniam Amherstianam* (Wallich Cat. p. 410 sub *Paedrota* 1828) Benth. Serophular. Indic. p. 46 (1835) et apud De Cand. Prodr. X. p. 455!; Hooker, The Flora of British India IV. (1885) p. 290—261! Himalajicam, quam secundum specimen cultum herbarii Schott a me in herbario Haynaldiano (nunc Mus. Nat. Hungar.) visum, racemo laxo calycibusque minutis nostratum planta convenit quidem. sed racemus in *Wulfenia Amherstiana* longior (8—10 cm), multiflorus, bracteae duplo longiores, (4—7 mm) setaceae, pedicelli brevissimi (1—2 mm) post anthesin nutantes, nec erecti, stricti, corolla brevior (7 mm) ad medium fere in lobos subaequales (inferiore paullo longiore) valde acuminatos porrectos quinquefida, calyces glabri, folia majora, ad marginem et petiolum tantum et subtus ad nervos, supra glabra, minus profunde crenata.

Budapest, am 20. October 1897.

Literatur-Uebersicht¹⁾).

September 1897.

Brehm V. Beiträge zur Kenntniss der Flora des Kaiserwaldes in Böhmen und des Egerlandes. (Deutsche botan. Monatsschr. XV. Jahrg. Nr. 9. S. 244—246.) 8°.

Čelakovský L. Nachtrag zu meiner Schrift über die Gymnospermen. (Engler's Botan. Jahrb. XXIV. Bd. 2. Heft, S. 202—231.) 8°.

Eine gedankenreiche und wichtige Abhandlung über die Blüten der Gymnospermen. Zur Andeutung des Inhaltes sei hier ein Theil des Schluss-

¹⁾ Die „Literatur-Uebersicht“ strebt Vollständigkeit nur mit Rücksicht auf jene Abhandlungen an, die entweder in Oesterreich-Ungarn erscheinen oder sich auf die Flora dieses Gebietes direct oder indirect beziehen, ferner auf selbständige Werke des Auslandes. Zur Erzielung thunlichster Vollständigkeit werden die Herren Autoren und Verleger um Einsendung von neu erschienenen Arbeiten oder wenigstens um eine Anzeige über solche höflichst ersucht.
Die Redaction.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1897

Band/Volume: [047](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [XXXII. Wulfenia Buldaccii 408-409](#)