Florula Strophadum.

Von Dr. E. v. Halácsy (Wien).

Die Strophaden (auch Strivali, Strophano, Stamphanes genannt) bilden eine kleine Inselpruppe im Jonischen Meere an der Westküste Messeniens, südlich von Zante. Nur selten werden dieselben von Barken angelaufen und wurden bisher noch nie von einem Floristen betreten. Im Mai dieses Jahres besuchte selbe, ornithologischer Studien wegen, O. Reiser[1]), Custos des bosnisch-hercegovinischen Landesmuseums in Sarajevo, und fand hiebei, wie auf allen seinen bisherigen Reisen in Griechenland, Gelegenheit, auch der Flora seine Aufmerksamkeit zuzuwenden. Das gesammelte Materiale wurde von ihm zur Bestimmung mir übergeben und enthält die nachfolgend angeführten 56 Arten. Unter diesen ist nur eine — *Convolvulus lineatus* —, welche für die Flora Griechenlands neu ist, alle übrigen sind bereits bekannte Bürger des Landes.

1. *Delphinium junceum* DC.
2. *Rapistrum orientale* DC.
3. *Wilckia maritima* (L.).
4. *Capparis rupestris* S. et Sm.
5. *Frankenia hirsuta* L.
6. *Silene vespertina* Retz.
7. *Linum spicatum* (Pers.).
8. *Lavatera punctata* All.
9. *Geranium rotundifolium* L.
10. *Geranium purpureum* Vill.
11. *Ruta bracteosa* DC.
12. *Calycotome villosa* (Vahl.).
13. *Anthyllis Dillenii* Schult.
14. *Melilotus indica* All.
15. *Medicago tribuloides* Desv.
16. *Medicago litoralis* Rhode.
17. *Medicago recta* Willd.
18. *Trifolium Cherleri* L.
19. *Trifolium angustifolium* L.
20. *Trifolium scabrum* L.
21. *Lotus tetragonolobus* L.
22. *Scorpiurus subvillosa* L.
23. *Daucus carota* L.
24. *Torilis arvensis* (Huds.).
25. *Torilis nodosa* (L.).

---

[1]) Reiser schreibt in einem Briefe über die Strophaden: „Es sind blos zwei etwas grössere Inseln und das Uebrige blos kleine, von der Brandung zeitweise überspülte und daher gänzlich vegetationslose Klippen. Beide Inseln sind flach und sehr trocken, grösstentheils sind sie von *Pistacia terebinthus* überzogen, blos einige Theile sind mit Getreide bebaut. Bezüglich der Pflanzen bemerke ich, dass Alles, was am 14. Mai auf diesen beiden Inseln blühte und theils auch in Frucht sich befand, von mir eingesammelt wurde“.

26. *Bupleurum protractum* Lk. et Hoffm.
27. *Pinardia coronaria* (L.).
28. *Filago eriocephala* Guss.
29. *Phagnalon rupestre* (L.).
30. *Pallenis spinosa* (L.).
31. *Evax pygmaea* L.
32. *Galactites tomentosa* Moench.
33. *Sonchus glaucescens* Jord.
34. *Picridium picroides* (L.).
35. *Scolymus hispanicus* L.
36. *Catananche lutea* L.
37. *Chlora perfoliata* L.
38. *Erythraea centaurium* Pers.
39. *Convolvulus lineatus* L.
40. *Prasium majus* L.
41. *Micromeria gracea* (L.).
42. *Plantago psyllium* L.
43. *Plantago serraria* L.
44. *Plantago lagopus* L.
45. *Rumex pulcher* L.
46. *Parietaria judaica* L.
47. *Ornithogalum narbonense* L.
48. *Phalaris coerulescens* Desf.
49. *Phalaris nodosa* L.
50. *Cynosurus echinatus* L.
51. *Gastridium lendigerum* (L.).
52. *Lagurus ovatus* L.
53. *Dactylis hispanica* Roth.
54. *Scleropoa rigida* (L.)
55. *Catapodium loliaceum* (Huds.).
56. *Psiturus nardoides* Trin.

Berichtigung.

Von Dr. V. v. **Borbás** (Budapest).

In der „Oesterr. Botan. Zeitschr.“ 1898, p. 385, lese ich, dass aus der Gattung *Gypsophila* bisher kein Bastard bekannt wäre. Einen unzweifelhaften Bastard zwischen *G. paniculata* und *G. arenaria* aber habe ich in „Természetraszi Füzetek“, XIII., 1890, p. 84—85, als *G. digenea* beschrieben. Seither habe ich diese Pflanze öfters zwischen Budapest und Rákos-Palota untersucht und 100 Exemplare davon für die Flora exsicc. Austro-hungarica nach Wien eingeschickt. Eine ausführliche Beschreibung findet sich a. a. O.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution

Jahr/Year: 1899

Band/Volume: 049

Autor(en)/Author(s): Halacsy [Halácsy] Eugen von

Artikel/Article: Florula Strophadum. 24-25