

Floristische Beiträge.

Von Karl Reching (Wien).

I. Niederösterreich.

Alnus glutinosa × *incana*. Freudenau, Lobau.

Salix cinerea × *repens*. Laxenburg ♀ (1922); Münchendorf (1915); Marchegg (1901); Sarasdorf (1922); Moosbrunn (1921); Vöslau (1915).

Urtica dioica L. var. *subinermis* Uechtr. Baumgarten—Zwerndorf. Bis 2·5 m hoch.

Rumex aquaticus × *Hydrolapathum* (*R. maximus* Schreb.). Klosterneuburg (1923); Marchegg (1885), leg. M. F. Müllner, det. K. R. 1923. *R. aquaticus* L. wurde bisher an der March noch nicht gefunden.

Rumex conglomeratus Murr var. *lyratus* Reching. Foliis basalibus lyratis. Klosterneuburg (1923).

Rumex conglomeratus × *crispus* (*R. Schulzei* Hausskn.). Donau-Auen bei Stopfenreit (1923).

Rumex conglomeratus × *crispus* var. *lingulatus* Schur (*R. inundatus* Simonk.). Lobau (1922).

Rumex conglomeratus × *paluster* (*R. Wirtgeni* G. Beck). Klosterneuburg (1903); Donau-Au bei Stockerau (1903).

Rumex conglomeratus × *sanguineus* (*R. Ruhmeri* Hausskn.). Lobau (1922); Klosterneuburg (1922); Donau-Au bei Stopfenreit (1923).

Rumex conglomeratus × *silvester* (*R. Salisburgensis* Fr. et Rech.). Zwerndorf—Angern (1923).

Rumex conglomeratus × *stenophyllus* (*R. Niesslii* Wildt). Angern (1921).

Rumex crispus var. *strictissimus* Reching. Baumgarten a. March (1923).

Rumex crispus × *paluster* (*R. Areschougii* G. Beck). Baumgarten a. March (1923).

Rumex crispus × *Patientia* (*R. confusus* Simonk.). Bei Schloßhof in der Nähe einer gesprengten Brücke (1924).

Rumex crispus × *sanguineus* (*R. Sagorskii* Hausskn.). Albern (1923).

Rumex crispus var. *strictissimus* Rech. × *silvester* Wallr. (*R. Gieshühlensis* Rech.). Zwerndorf (1923).

Rumex crispus × *stenophyllus* (*R. intercedens* Rech.). Marchegg—Baumgarten (1923).

Rumex Hydrolapathum × *obtusifolius* (*R. Weberi* Fisch. Benz). Mannswörth (1923).

Rumex obtusifolius × *sanguineus* (*R. Duftii* Hausskn.). Neuwaldegg, Lainzer Tiergarten (1924).

Rumex paluster Sm. Schwechat (1923); Mannswörth (1894).

Rumex Patientia L. Schloßhof, in der Nähe der gesprengten Brücke (1924). Der einzige Fundort in Niederösterreich nördlich der Donau.

Chenopodium leptophyllum Nutt. Wien, Karlsplatz (1924), bestätigt von A. Thellung.

Amarantus albus L. Marchegg (1923); Wien, Minoritenplatz, Baustelle (1924).

Amarantus adscendens Lois. forma *procumbens* (Gaudin). Wien, Karlsplatz (1922). Det. Thellung.

Amarantus retroflexus L. var. *Delilei* (Richt. et Lor.) Thell. Wien, Karlsplatz (1922); Ackerunkraut bei Marchegg (1923).

Amarantus chlorostachys W. var. *aristulatus* Thell. Klosterneuburg (1922).

Amarantus chlorostachys W. var. *pseudoretroflexus* Thell. = *A. Powellii* S. Wats. Wien, Karlsplatz (1924). Det. Thellung.

Silene pseudo-Otites Besser var. *arenaria* Podpéra. Weikendorfer Remise (1924).

Delphinium orientale L. Unter Getreide, Weikendorfer Remise (1924).

Clematis recta L. Donau-Au bei Stopfenreit (sehr selten); bedeckte weite Strecken etwas feuchter Wiesen bei Winzendorf (1896).

Clematis integrifolia L. Rand der Baumschule Rosenthal (jetzt städt.), unter Buschwerk (Rest der ehemaligen Vegetation) (1923).

Myosurus minimus L. Baumgarten a. March (1923).

Papaver dubium L. var. *Lecocquii* Fedde. Hinterbrühl (1924).

Sinapis arvensis L. var. *stricta* Čelakovský. Albern (1923).

Roripa amphibia × *austriaca* (*R. hungarica* Borb.). Klosterneuburg (1922); Angern (1923).

Roripa amphibia × *Kernerii* (*R. Küllödensis* Prodán). Angern (1923).

Roripa austriaca × *Kernerii* (*R. Filarszkyana* Prodán). Angern.

Roripa Kernerii Menyh. Angern—Stillfried (1921); Zwerndorf (1923).

Barbarea arcuata Opiz. Lobau, Auen bei Stopfenreit (1923).

Barbarea stricta Andr. Drösing, Zwerndorf (1923).

Alyssum murale W. K. Vöstenhof (1924).

Rosa vinodora A. Kerner. Lainzer Tiergarten (1923).

Trifolium flexuosum Jacq. (Formenkreis d. *T. medium*). Wiesen bei Schloßhof (sehr typisch!) (1924).

Trifolium strictum L. Lainzer Tiergarten (1923).

Onobrychis arenaria (W. K.) DC. Hohenruppersdorf; Weikendorfer Remise (1924); Stillfried (1893); Gießhübel bei Brunn (1903); Reit im Gebiete des Kampflusses.

Vicia striata MB. Feldränder um Neuhof bei Unter-Siebenbrunn (1924); Zwerndorf (1923).

Euphorbia Cyparissias $\times$ *Esula* (*E. Pseudoesula* Schur). Lainzer Tiergarten; Lobau; Donau-Au bei Krems (1923).

Euphorbia Cyparissias $\times$ *virgata* (*E. Schroeteriana* Thell.). Lobau (1923), von A. Thellung bestätigt.

Euphorbia lucida W. K. Schloßhof (1924).

Euphorbia lucida $\times$ *virgata*. Schloßhof (1924).

Rhamnus tinctoria W. K. Hundsheimer Berg (1923).

Malva moschata L. Lobau (1922).

Helianthemum ovatum (Viv.) Dunal f. *obscurum* (Pers.) Janchen. Weikendorfer Remise, auf sandigen Heiden (1924). Im Herb. d. naturhist. Museums in Wien liegen Exemplare einer als *H. arenicolum* Borbás bestimmten Form, von Borbás 1888 bei Budapest gesammelt und von Reichenbach aus der Leipziger Gegend, die mit meiner Pflanze genau übereinstimmen.

Lythrum Salicaria $\times$ *virgatum* (*L. scabrum* Simonk.). Schloßhof (1924).

Hedera Helix L. Blühend am Waldrand bei Vöslau (Goldeck) an einer alten Mauer (1922).

Scandix pecten Veneris L. Ackerunkraut bei Engelhartstetten (1923).

Caucalis muricata Bischoff. Mit *Cauc. daucoides*. Ackerunkraut bei Engelhartstetten.

Cynoglossum hungaricum Simonkai. Weikendorfer Remise (1924).

Cynoglossum hungaricum $\times$ *officinale* (*C. austriacum* Rech. in Annal. d. naturhist. Mus. Wien, 1924). Weikendorfer Remise (1924).

Cynoglossum montanum $\times$ *officinale* (*C. Modorense* Rech. in Allg. botan. Zeitschr., Bd. 20 [1914], S. 20). Lainzer Tiergarten (1923).

Symphytum officinale L. var. *uliginosum* (A. Kerner). Drösing (1923); in nicht ganz typischen Exemplaren bei Hohenau (1924).

Lamium purpureum L. floribus albis. Stillfried, an Wegrändern (1924).

Chaiturus Marrubiastrum L. In Auen zwischen Gebüsch bei Wulzeshofen, Pulkautal (1888).

Salvia nemorosa $\times$ *pratensis* (*S. silvestris* L.). Hohenau; Hohenruppersdorf (1924).

Calamintha acinos × *alpina* (*C. mixta* Ausserd.). Hinterbrühl (K. H. R. 1924¹⁾).

Lycopus europaeus × *exaltatus* (*L. intercedens* Reching.). Baumgarten a. March (1923).

Verbascum nigrum L. var. *thyrsoides* Gaudin. Lobau (1923).

Verbascum Lychnitis × *nigrum* (*V. Schiedeanum* Koch). Lobau (1922).

Verbascum Blattaria × *Lychnitis* (*V. Gaudini* Doell.). Lobau (1923).

Veronica aquatica Bernh. forma ***ternatifolia* Rech.**, nov. forma. Foliis ternatis. Mehrfach in den Donau-Auen bei Stopfenreit unter typischen Exemplaren (1923).

Veronica aquatica Bernh. var. *glandulifera* Čelak. Drösing; an der Donau bei Mannswörth-Fischamend.

Veronica aquatica Bernh. Drösing; Stripfing; zwischen Schwechat und Albern, Stripfing, Zwerndorf.

Veronica Anagallis L. var. *anagalliformis* Boreau. Drösing (1921).

Veronica anagalloides Guss. Zwischen Engelhartstetten und Stopfenreit; Zwerndorf.

Plantago lanceolata L. Bei Engelhartstetten auf Feldern gebaut (1923).

Lonicera Caprifolium L. Lobau.

Dipsacus laciniatus × *silvester* (*D. fallax* Simonk.). Baumgarten und Zwerndorf a. March.

Dipsacus pilosus L. Lobau, in größter Menge, bis 1·8 m hoch bei Mannswörth (1923).

Aster lanceolatus W. Klosterneuburger Au (1922).

Aster Tradescanti L. Ufer der March zwischen Marchegg und Baumgarten (1923).

Erigeron speciosus DC. Weikendorfer Remise (1924).

Galinsoga quadriradiata R. et P. Wien, Burgplatz (1923).

Arctium minus × *tomentosum*. Zwerndorf (1923).

Crepis alpestris Tausch. Reissalpe (1910).

Potamogeton lucens × *natans*. Mannswörth (1923). Früher schon als *P. fluitans* publiziert.

Alisma stenophyllum Samuelsson. Sumpfige Gräben bei Loimersdorf, 1923 (K. H. R.); Angern—Zwerndorf (1923); Klosterneuburg (1922); Lobau (1922); Praterspitz (Freudenau) 1920.

Melica transsilvanica Schur. Donaudamm bei Albern (1923).

Melica flavescens Simonk. Hardegg, auf Felsen (1913).

¹⁾ Von meinem Sohn (Karl Heinrich R.) gesammelt.

Bromus erectus L. var. *pubiflorus* Borb. et var. *Hackelii* Borb. Lobau.

Ventenata avenacea Koch. Lainzer Tiergarten (1923).

Typhoides arundinacea Mnh. var. *picta* (L.). Wiesen bei Zwern-dorf unter zahllosen, typischen Exemplaren, sicher nicht verwildert (1923).

Juncus alpinus $\times$ *lampocarpus*. Nasse Wiesen bei Vöslau (1915).

Juncus ranarius Perr. et Song. Stillfried, im Sande der March (1923).

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla var. *fluitans* Coss. et Germ. Lobau (1923); Mannswörth.

Allium rotundum L. Zwischen Albern und Schwechat.

Allium vineale L. var. *compactum* (Thuill.) Aschers. Schloßhof (1924).

Allium Scorodoprasum L. *lusus bicephalus* Rechinger. Auf trockenen Wiesen bei Schloßhof. Hier fast nur zweiköpfige Individuen. Es scheint sich hier fast eine Lokalrasse ausgebildet zu haben (1924).

Convallaria maialis L. Sehr selten in den March-Auen bei Drösing und Baumgarten.

II. Steiermark.

Equisetum variegatum All. Im feuchten Geröll bei Grundlsee, Unter-Kainisch.

Lycopodium inundatum L. Torfmoor bei Lupitsch nächst Aussee.

Juniperus Sabina L. Steilabhang des Loser gegen den Alt-Ausseer-See, sehr spärlich (1923).

Carpinus Betulus L. Bäume an einem Waldrand ober Lupitsch (bei Aussee), ca. 800 m s. m.

Salix aurita L. Torfmoor Wasnerin bei Aussee (nur ein Strauch); bei Lupitsch, Kainisch (1921).

Salix aurita $\times$ *cinerea*¹⁾. Irdning (1922).

Salix aurita $\times$ *grandifolia*. Kainisch (1922); Lupitsch bei Aussee und an der Traun (1924).

Salix aurita $\times$ *nigricans*. Torfmoor bei Kainisch (1923).

Salix aurita $\times$ *purpurea*. Torfmoor bei Kainisch (1922).

Salix aurita $\times$ *repens*, auch combinat. *superrepens*. Kainisch (1922).

Salix cinerea $\times$ *repens*. Kainisch (1922).

Salix glabra Scop. var. *angustifolia* Anderss. Nordabhang des Loser; am vorderen Lahngang-See (1923).

¹⁾ Die Revision eines Teiles der Formen der Gattung *Salix* verdanke ich meinem Freunde Ad. Toe p f f e r.

Salix glabra × *grandifolia*. Todtes Gebirge: Bärensteig (K. H. R., 1923).

Salix glabra × *nigricans*. Ob.-Österr. S.-Ufer d. Hallstätter Sees Obertraun und Hallstatt, 500 m s. m.

Salix glabra × *retusa*. Combinatio medians: *Vollmanni* Toepff. ♀. Trisselwand bei Aussee (Lily R., 1922). — Combinatio *superretusa* Toepff.: *Fenzliana* A. Kerner. Trisselwand bei Aussee (Lily R., 1922).

Salix grandifolia var. *parva* Toepff. Todtes Gebirge: Vorderer Lahngang-See (1923); Bärensteig, 1700 m s. m. Salzburg: Hochkönig (Lily R., 1923).

Salix grandifolia × *cinerea*. Todtes Gebirge: bis 1700 m (Bärensteig), bzw. 1550 m s. m. am vorderen Lahngang-See (1923); an diesen Fundorten ohne *S. cinerea*. Der *S. grandifolia* näherstehend, von ihr nur durch die Striemen und den teilweise noch an einjährigen Zweigen erhaltenen Filz verschieden.

Salix grandifolia × *hastata*. Todtes Gebirge. Bärensteig (Lily R., 1922).

Salix grandifolia × *incana*. Ob.-Österr. Hallstatt (1923).

Salix hastata L. Todtes Gebirge: Wilder Gößl (1906), Bruderkogel und Bärensteig. Zinken und Saarstein (1923).

Rumex alpinus × *silvester* (*R. austriacus* Teyb.). Todtes Gebirge: Henar-Wiesen-Alm (K. H. R., 1924).

Rumex aquaticus × *crispus* (*R. conspersus* Hartm.). Ennstal, Sümpfe am Salzabach bei St. Martin (K. H. R., 1924).

Rumex aquaticus × *silvester* (*R. finitimus* Hausskn.). Ennstal, Sümpfe am Salzabach bei St. Martin (K. H. R., 1924).

Rumex Friesii Gr. Godr. Am Grundl-See.

Vaccaria grandiflora Fisch. Schuttplatz bei Aussee (1923).

Thalictrum minus L. Bei Pürgg; Todtes Gebirge: Am vorderen Lahngang-See (K. H. R., 1924).

Arabis bellidifolia Jacq. Grubegg bei Aussee (leg. F. Leeder, 1923).

Sorbus ambigua Michalet. Feuerkogel (Röthelstein) bei Aussee (1923); Todtes Gebirge: Backenstein (K. H. R., 1924).

Sorbus austriaca G. Beck. Lupitsch bei Aussee (1923).

Sorbus Aria × *Chamaemespilus*. Nordabhang des Breuning-Zinken bei Aussee (L. R., 1923).

Polygala alpestris Rchb. Saarstein bei Aussee (Lily R., 1923).

Euphrasia montana Jord. Wasnerin (Torfmoor) bei Aussee (1923).

Ilex Aquifolium L. Lupitsch bei Aussee (1923).

Lythrum Salicaria L. foliis ternatis. Alt-Aussee (1924).

Epilobium alpestre $\times$ *montanum*. Aussee (1921). Det. Dr. Rubner.

Epilobium alsinifolium $\times$ *montanum*. Aussee (1920). Det. Dr. Rubner.

Primula glutinosa $\times$ *minima*. Kärnten: Sonnblick, Feldseescharte —Jamniger Alm (Lily R., 1923).

Stachys alpina L. var. *mollissima* Schulth. Salzburg: Waldlichtung bei Parsch.

Verbascum austriacum $\times$ *nigrum* (*V. subnigrum* G. Beck). Ennstal, zwischen St. Martin und Stuttern (K. H. R., 1924).

Verbascum nigrum $\times$ *Thapsus* (*V. collinum* Schrad.). Ennstal, zwischen St. Martin und Stuttern (K. H. R., 1924).

Asperula Neilreichii G. Beck. Trisselwand bei Aussee (Lily R., 1923).

Galium Vaillantii DC. Ackerunkraut, Aussee und Alt-Aussee.

Centaurea macroptilon Borbás. In Schilf im Ennstal bei Trautenfels (1922). Det. Hayek.

Prenanthes purpurea L. forma *integrifolia* Issler. Aussee, in Wäldern. Ob.-Österr.: Hallstatt.

Potamogeton gramineus L. forma *terrestris* Fr. Alt-Ausseer-See.

Potamogeton gramineus $\times$ *lucens* (*P. Zizii* M. K.). Alt-Ausseer-See (1923).

Potamogeton pusillus L. Sehr selten. Ausseer-See (1923).

Zannichellia palustris L. Alt-Ausseer-See (1923).

Alisma stenophyllum (Asch. et Graebn.) Samuelsson. Grundl-See (1924).

Heleocharis mamillata Lindbg. Torfmoor ober Lupitsch nächst Aussee (1923).

III. Burgenland.

Equisetum ramosissimum Duf. Weiden am See, Podersdorf (1923).

Salix aurita $\times$ *cinerea*. Neusiedl am See (1922).

Salix Caprea $\times$ *cinerea*. Gschieß (1924).

Salix cinerea $\times$ *repens*. Gschieß (1924).

Rumex conglomeratus $\times$ *silvester* (*R. Salisburgensis* Fritsch et Reching.). Weiden am See (1924).

Rumex conglomeratus $\times$ *paluster* (*R. Wirtgeni* G. Beck). Weiden am See (1923).

Rumex conglomeratus $\times$ *crispus* (*R. Schulzei* Hausskn.). Weiden am See, Illmitz (1923).

Rumex crispus L. var. *irramosus* Peterm. Weiden am See (1923).

Rumex crispus × *paluster* (*R. Areschougii* G. Beck). Weiden am See; Jois, Gols (1924).

Rumex crispus × *Patientia* (*R. confusus* Simonk.). Illmitz, Podersdorf, Weiden am See, Jois.

Rumex crispus × *stenophyllus* (*R. intercedens* Rech.) Gols (1924).

Rumex obtusifolius L. Im nordöstlichen Burgenland anscheinend nicht ursprünglich, nur in Weiden und Jois je ein vereinzelt Exemplar bei menschlichen Ansiedlungen (1924).

Rumex paluster Sm. Jois, Weiden, Gols, Pamhagen.

Rumex muritimus L. Fehlt im Burgenland.

Rumex paluster × *Patientia* (*R. Peisonis* Reching., Annal. d. Naturhist. Museums Wien, 1924). Weiden am See (1924).

Rumex paluster × *stenophyllus* (*R. heteranthus* Borb.). Gols (1924).

Rumex Patientia L. In großen Mengen am Südost-Abhang des Haglersberges bei Jois (1924).

Rumex stenophyllus Ledeb. Feuchte Brachfelder bei St. Andrä, Apetlon.

Polygonum Bellardi (Duby) Rechb. Zwischen Apetlon und Wallern (1924); Podersdorf (1906).

Amarantus retroflexus L. var. *Delilei* (Richt. et Lor.) Thellung. Weiden am See (1924).

Thalictrum minus L. Zicklacke bei St. Andrä (K. H. R., 1923).

Thalictrum galioides Nestler. St. Andrä gegen die Zicklacke (K. H. R., 1923).

Myosurus minimus L. St. Andrä (1923).

Roripa austriaca × *silvestris*. Gschieß (1924).

Reseda lutea L. var. *crispa* J. Müller. St. Margarethen bei Ruß (1924).

Sedum Hillebrandtii Fenzl. Bei Illmitz (1923), Apetlon (1924).

Onobrychis arenaria (W. K.) DC. Weiden—Gols (1924).

Euphorbia Gerardiana × *pannonica* (*E. angustifrons* Borb.). St. Andrä (1923).

Malva pusilla With. Jois (1924).

Heracleum Sphondylium L. proles (hybrida?) *H. Friesii* Thellung = *H. Sphondylium* subsp. *chloranthum* Neumayer; ob auch = *H. chloranthum* Borbás ist fraglich. Thellung in litter. 15. Dez. 1924. Bei Jois (1924).

Bifora radians MB. Häufig als Ackerunkraut bei Kaisersteinbruch (1924).

Cynoglossum hungaricum Simonk. Haglersberg bei Jois (1924).

Chaiturus Marrubiastrum L. Im Dorfe Äpetlon, Weiden am See.

Salvia nemorosa × *pratensis*. Oslopp.

Linaria genistifolia L. forma *angustana* Wierzb. (*L. perangustata* Borb.). Podersdorf (K. H. R., 1923).

Veronica Anagallis L. var. *anagalliformis* Boreau. St. Andrä, Podersdorf (1923).

Veronica aquatica Bernh. Podersdorf, Weiden am See, St. Andrä, Gols.

Veronica Velenovskyi Uechtr. Weiden am See (1924).

Euphrasia Kernerii Wettst. Weiden am See (1924).

Plantago maior L. var. *salina* Wirtgen. Feuchte, etwas salzige Heiden bei Podersdorf, 1924 (vergl. Pilger in Fedde, Repert. nov. sp., Bd. 18, 1922).

Jurinea mollis Rehb. Sehr selten, bei Podersdorf (1924).

Zannichellia pedicellata Wahlb. et Rosén. Illmitz—Podersdorf (K. H. R., 1923).

Alisma stenophyllum Samuelsson. Podersdorf—Weiden (1923); St. Jörgen bei Eisenstadt (1903); Gols, Jois (1924).

Alisma gramineum Gmelin. St. Andrä (1923). Det. Samuelsson.

Setaria verticillata P. B. var. *robusta* A. Br. Wüste Plätze bei Weiden am See (1924).

Juncus Gerardi Loisel. var. *atrifuscus* Trautvetter (syn. *J. atrofuscus* Rupr.). In großer Menge bei St. Andrä, Illmitz, Podersdorf, in salzigem Schlamm (1923).

Juncus ranarius Perr. et Song. Im Sand bei Podersdorf (1906).

Schoenoplectus pungens Palla. Podersdorf (1906); Illmitz (1923). An beiden Fundorten vorwiegend in der var. *monostachys* Sonder.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1925

Band/Volume: [074](#)

Autor(en)/Author(s): Rechinger Karl sen.

Artikel/Article: [Floristische Beiträge 131-139](#)