



Foto: M. Weigerstorfer

## SKABIOSEN-FLOCKENBLUME

*Centaurea scabiosa* L.

**FAMILIE:** Korbblütler (Asteraceae)

**WISSENSWERTES:** Oft werden Skabiosen-Flockenblumen von Gallwespen befallen, was an den dicken Anschwellungen der Stängel erkennbar ist.  
Von den fünf in Österreich vorkommenden Unterarten tritt in Oberösterreich nur die Typusunterart auf.

**VORKOMMEN  
IN ÖSTERREICH:** alle Bundesländer

**STANDORT:** Trockenwiesen, Wegränder, Felsrasen

**BESCHREIBUNG:** Ausdauernde, 30-150 cm hohe Pflanze, deren Blütenköpfe einzeln an der Spitze der Äste sitzen. Die Blüten sind purpurn, zuweilen rosa oder weiß und am Rande auffällig vergrößert. Als Blütenbesucher treten z. B. Bienen, Schwebfliegen, Käfer und Schmetterlinge auf.

**BLÜTEZEIT:** Juni-Oktober

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Steckbriefe von Tieren und Pflanzen aus dem Ökopark](#)

Jahr/Year: 2000-2020

Band/Volume: [019](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Skabiosen-Flockenblume \*Centaurea scabiosa\* L. 1](#)