



WOLLIGER SCHNEEBALL

Viburnum lantana L.

FAMILIE: Geißblattgewächse (Caprifoliaceae)

WISSENSWERTES: Fast alle Teile des Wolligen Schneeballs sind giftig. Ob auch die Beeren, im Volksmund als "Schwindelbeeren" bezeichnet, giftig sind ist umstritten.

**VORKOMMEN
IN ÖSTERREICH:** alle Bundesländer

STANDORT: Trockenwarme Gebüsche, Eichenmischwälder, Föhrenwälder, Waldsäume; kalkliebend

BESCHREIBUNG: 1-3 m hoher, winterkahler, in milder Klimalage wintergrüner Strauch mit unzerteilten, behaarten Blättern. Alle Blüten des Wolligen Schneeballs sind gleich und ihr Geruch ist harnartig (Methylamin). Die Früchte sind eiförmig, anfangs rot und später schwarz. Da sie unterschiedlich reifen findet man in einem Fruchtstand längere Zeit beide Farben nebeneinander vor.

BLÜTEZEIT: April-Juni (Oktober)

VERWENDUNG: Der Wollige Schneeball eignet sich in Gärten sowohl als Solitärpflanze, wie auch für die Schnitthecke.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Steckbriefe von Tieren und Pflanzen aus dem Ökopark](#)

Jahr/Year: 2000-2020

Band/Volume: [083](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Wolliger Schneeball Viburnum lantana L. 1](#)