

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE EN FRANCE

DU

VANNEAU HUPPÉ

(*VANELLUS CRISTATUS*)

D'APRÈS LES DONNÉES DE L'ENQUÊTE TERRITORIALE
DE 1885 ET 1886

PAR

M. LOUIS TERNIER

Le Vanneau huppé est un Oiseau dont l'observation est facile. Il voyage au grand jour, en bandes nombreuses assez souvent, son vol est caractéristique, son cri plaintif et bien modulé attire l'attention, sa présence sur nos marchés, en quantités considérables, le désigne comme un gibier courant.

Toutes ces particularités ont fait du Vanneau l'objet de remarques multiples et précises, lors de l'enquête territoriale sur les Oiseaux de passage.

Le Vanneau huppé niche sur beaucoup de nos provinces, la plupart situées au Nord et au Nord-Ouest de notre pays, mais il n'est guère possible de grouper un certain nombre de départements formant une zone de nidification en ce qui concerne cette espèce.

Il m'a paru plus intéressant, au point de vue de la distribution géographique du Vanneau, de réunir ceux de nos départements sur lesquels les Vanneaux sont com-

muns et de mettre à part ceux sur lesquels il sont relativement rares.

Je dis relativement, car le Vanneau fait, partout en France, des apparitions et ne semble arrêté dans ses pérégrinations que par les hautes montagnes.

J'ai donc divisé la France en deux zones :

La première comprend ceux de nos départements sur lesquels les Vanneaux sont communs.

La seconde englobe ceux sur lesquels leur présence est rare ou accidentelle.

Tableau de la distribution géographique du Vanneau huppé en France.

PREMIÈRE ZONE.

DÉPARTEMENTS SUR LESQUELS LES VANNEAUX SONT COMMUNS.

1. — Nord.

ARRIVÉE : août, septembre, octobre, novembre; vent nord-est; direction sud.

DÉPART : mars, avril, direction nord.

Très communs sur les côtes.

Quelques-uns nichent.

2. — Pas-de-Calais.

ARRIVÉE : de juillet à octobre; vents : nord-est, est; direction ouest.

DÉPART : mars, avril.

Nichent en avril et mai.

Communs.

NOM LOCAL : *Auvergne*.

3. — Somme.

ARRIVÉE : mars, avril, mai; vents : nord et est.

DÉPART : août, septembre, octobre, novembre; vents : est, nord, nord-est; direction sud.

Très communs et sédentaires pendant six mois sur les marais.

Nichent.

NOMS LOCAUX : *Auvergne* et *Auverge*.

4. — Aisne.

ARRIVÉE : février, mars.

DÉPART : octobre, novembre.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DU VANNEAU. 79

Nichent en avril, mai, juillet, aux environs de Laon seulement où ils sont sédentaires et communs.

5. — Ardennes.

ARRIVÉE : mars, avril ; vent sud-ouest ; direction nord.

DÉPART : octobre, novembre ; vent sud ; direction sud-ouest.

Communs aux passages.

6. — Marne.

ARRIVÉE : février, mars, avril ; vent sud ; direction nord.

DÉPART : octobre, novembre ; vent nord, direction sud.

Communs. Ne nichent pas.

7. — Seine-Inférieure.

ARRIVÉE : d'août à novembre ; vents : nord et ouest ; direction ouest et sud.

DÉPART : mars, avril.

Communs aux passages.

Nichent accidentellement.

8. — Oise.

ARRIVÉE : février, mai, juin.

DÉPART : novembre et décembre.

Assez communs. Nichent régulièrement.

9. — Seine-et-Marne.

Passent au printemps et à l'automne.

Quelques-uns nichent.

Très communs aux environs de Meaux lors des passages.

10. — Seine-et-Oise.

ARRIVÉE : septembre à novembre ; vents : nord, sud-ouest.

DÉPART : mars, vent nord, direction nord.

Nichent accidentellement.

Assez communs aux passages.

11. — Eure.

ARRIVÉE : d'août à novembre ; vent nord ; direction sud-ouest.

DÉPART : février, mars, avril ; vent sud ; direction nord-est.

— J'ai tué des Vanneaux sur les marais de l'Eure dès le mois d'août et j'en ai également rencontré pendant tout l'hiver, tant sur les marais que dans les plaines de l'intérieur.

Je ne crois pas que ces Oiseaux nichent, malgré une observation.

NOM LOCAL : *Vannet*.

L'espèce est commune aux passages.

12. — **Calvados.**

ARRIVÉE : d'août à novembre.

DÉPART : de mars à mai.

Nidification très accidentelle.

Assez communs.

NOMS LOCAUX : *Pivi*, *Vanneau*, *Vannet*.

13. — **Manche.**

ARRIVÉE : d'octobre à décembre ; vents variables.

DÉPART : février, mars.

Communs surtout aux îles des Minquiers et sur les marais de Carentan où ils nichent.

NOM LOCAL : *Pivi*.

14. — **Ille-et-Vilaine.**

ARRIVÉE : décembre, janvier.

DÉPART : février, avril.

Nichent en avril, mai, juin.

Assez communs.

NOMS LOCAUX : *Pie-marvaige*, *Pi-huitte*.

15. — **Côtes-du-Nord.**

ARRIVÉE : novembre et décembre ; vents : nord, est, nord-est ; direction variable.

DÉPART : février, mars, avril ; vents variables ; direction nord-est.

Nicheraient en mai aux environs de Dinan.

Assez communs en hiver.

NOM LOCAL : *Corniquet*.

16. — **Finistère.**

ARRIVÉE : de septembre et surtout d'octobre à décembre ; vents : est, nord-est ; direction : ouest et sud.

DÉPART : février, mars ; vents : sud-ouest, sud.

Sédentaires et nichant accidentellement sur quelques localités.

Très communs.

NOMS LOCAUX : *Korniquel-Nel* ; *Buan*.

17. — **Morbihan.**

ARRIVÉE : septembre à décembre ; vents : nord-est, est ; direction : sud, sud-ouest.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DU VANNEAU. 81

DÉPART : février, mars ; vents : sud-ouest, ouest ; directions : nord, nord-est, est.

Nidification accidentelle.

Très communs.

NOM LOCAL : *Kerniquet*.

18. — Loire-Inférieure.

Communs et sédentaires toute l'année (observation de M. Bureau).
Nicheraient en mai.

Passent en février, mars et en novembre.

NOM LOCAL : *Pie-morais*.

19. — Vendée.

ARRIVÉE : octobre, novembre, décembre ; vents : sud, sud-est, sud-ouest ; direction variable.

DÉPART : février, mars, vent ouest.

Nichent en avril, mai, juin.

Communs.

Sédentaires sur quelques localités.

20. — Charente-Inférieure.

ARRIVÉE : de septembre à décembre ; vent nord ; direction sud.

DÉPART : février, mars, avril ; vents : nord, nord-ouest, sud ; direction nord.

Nichent en petit nombre.

Très communs aux passages.

NOM LOCAL : *Vannas*.

21. — Gironde.

ARRIVÉE : octobre à décembre ; vents variables ; direction sud.

DÉPART : février, mars, avril.

Communs lors des passages.

NOMS LOCAUX : *Martinelle*, *Louhène*.

22. — Landes.

ARRIVÉE : octobre, novembre, décembre ; vents : nord, nord-est ; direction sud.

DÉPART : Janvier, février, mars ; vent sud-est ; direction nord.

Nichent accidentellement.

Très communs.

NOMS LOCAUX : *Oucume*, *Arganus*, *Benéou*, *Baneau*.

23. — Basses-Pyrénées.

ARRIVÉE : octobre, novembre, décembre ; vents : nord, nord-ouest ; direction sud.

DÉPART : Janvier à avril ; directions : est, nord.
NOM LOCAL : *Pighette de Ma.*

24. — **Lot-et-Garonne.**

ARRIVÉE : octobre à novembre.
DÉPART : février, mars.
Assez communs.

25. — **Gers.**

ARRIVÉE : octobre, novembre.
DÉPART : Janvier, mars.
Assez communs.
NOM LOCAL : *Péberino.*

26. — **Haute-Garonne.**

ARRIVÉE : octobre à décembre ; vents : nord, est, ouest, nord-est ;
direction sud.
DÉPART : Janvier à avril ; vents : sud, ouest, est, direction variable.
Rares. Communs seulement aux environs de Villefranche.

27. — **Tarn.**

ARRIVÉE : septembre, octobre et surtout novembre ; vent nord ; direc-
tion sud.
DÉPART : Janvier, février, mars, avril ; vent sud ; directions : nord,
est.
Assez communs aux passages.
NOMS LOCAUX : *Lou Vaneau, Vannel.*

28. — **Aveyron.**

Passent en février, mars et en novembre aux environs de Rodez et
d'Espalion, où ils sont assez communs.
Rares ailleurs.

29. — **Aude.**

ARRIVÉE : novembre, décembre ; vents : nord, nord-ouest ; direction
sud.
DÉPART : Janvier, février, mars, avril ; vent sud ; direction nord.
Communs.
Nicheraient accidentellement ?
NOMS LOCAUX : *Vanelle, Vanelo.*

30. — **Pyrénées-Orientales.**

ARRIVÉE : octobre ; vent nord.
DÉPART : février et mars.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DU VANNEAU. 83

Rares. Excepté aux environs de Céret où ils sont communs.

NOM LOCAL : *Pigre*.

31. — **Hérault.**

ARRIVÉE : octobre, novembre.

DÉPART : février, mars, avril.

Assez communs aux passages, ne s'arrêtent pas.

NOM LOCAL : *Vannelle*.

32. — **Gard.**

ARRIVÉE : octobre, décembre ; vents : nord, sud ; direction sud.

DÉPART : février, mars, avril ; vents : nord, sud-ouest ; direction nord.

Nicheraient aux environs de Nîmes.

Communs dans le Sud seulement.

Rares ailleurs.

NOMS LOCAUX : *Vannelle, Vanella, Vanello?*

33. — **Bouches-du-Rhône.**

ARRIVÉE : juillet, mais surtout d'octobre à décembre ; vent nord ; direction variable.

DÉPART : mars.

Communs seulement aux environs d'Arles, bords du Rhône.

NOMS LOCAUX : *Vaneu, Vaneou.*

34. — **Vaucluse.**

ARRIVÉE : octobre, novembre, décembre.

DÉPART : février, mars, avril.

Ne font que passer.

Assez communs au bord des cours d'eau.

NOM LOCAL : *Vaneou.*

35. — **Drôme.**

ARRIVÉE : septembre et octobre ; vent sud ; direction sud.

DÉPART : mars, avril, mai, juin.

Communs aux environs de Montélimar seulement. Rares ailleurs.

36. — **Var.**

ARRIVÉE : novembre et surtout décembre ; vent du nord.

DÉPART : février, mars, avril.

Communs sur certaines localités. Rares sur d'autres.

Nicheraient accidentellement.

NOMS LOCAUX : *Lou Vanéou, Vaneou.*

37. — **Ain.**

ARRIVÉE : septembre à décembre ; vents : nord, nord-est ; direction sud.

DÉPART : février, mars, avril, vent sud, direction nord.

Assez communs sur certaines localités aux passages.

38. — **Saône-et-Loire.**

ARRIVÉE : mars, avril.

DÉPART : octobre, novembre.

Communs aux environs de Chalon.

NOM LOCAL : *Vaniau*.

39. — **Doubs.**

ARRIVÉE : février, mars, avril ; vents : est, ouest, sud, sud-ouest, direction est.

DÉPART : octobre, novembre ; vents : nord-est, est, ouest ; directions : ouest, sud.

Très communs aux environs de Baume (bords du Doubs).

Une nichée observée en avril.

40. — **Haute-Saône.**

ARRIVÉE : octobre, novembre, décembre ; vents : nord, est, direction sud-ouest.

DÉPART : février, mars, avril.

Communs.

41. — **Vosges.**

ARRIVÉE : mars, avril ; vents : sud-ouest, ouest, direction est, (indiquée du sud à l'est).

DÉPART : octobre, novembre, décembre ; vents : est, nord.

Nichent en mars, avril, mai.

Communs aux environs de Neufchâteau.

Rares ailleurs.

42. — **Meurthe-et-Moselle.**

ARRIVÉE : mars, avril ; vents : sud et ouest ; directions : nord, nord-est.

DÉPART : septembre, octobre, novembre ; vents : nord, nord-est, sud-ouest ; direction : sud, sud-ouest.

Nichent aux environs de Nancy.

Communs sur certaines localités, rares ailleurs.

43. — **Haute-Marne.**

ARRIVÉE : février, mars, vents variables.

DÉPART : octobre, novembre.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DU VANNEAU. 85

Communs aux passages.

Quelques-uns nichent.

44. — Côte-d'Or.

ARRIVÉE : mars, avril.

DÉPART : septembre à décembre.

Quelques couples nichent régulièrement.

Communs.

45. — Yonne.

ARRIVÉE : mars, avril.

DÉPART : août à novembre.

Nichent aux environs d'Auxerre, notamment sur les bords de l'Yonne, où ils sont communs.

Rares ailleurs.

46. — Loiret.

ARRIVÉE : février, mars; vents : sud et ouest; direction nord.

DÉPART : octobre, novembre; vents : nord-est, nord-ouest, direction sud.

Nichent en avril, mai, juin.

Très communs.

NOMS LOCAUX : *Vannerelle*, *Pi-huit*.

47. — Loir-et-Cher.

Rares sur tout le département, excepté aux environs de Romorantin où ils sont très communs et nichent en mai, juin.

NOM LOCAL : *Vannelle*.

48. — Indre-et-Loire

ARRIVÉE : mars, avril, vents variables.

DÉPART : octobre, novembre; vents nord, nord-ouest; direction sud.

Communs aux environs de Chinon où ils nichent en avril.

49. — Sarthe.

Nicheraient l'été dans les bois de sapins?

Seraient communs l'hiver sur les landes.

Suivant un autre observateur, ne se trouvent que sur les lieux humides. Deux observations seulement.

NOM LOCAL : *Pilchien*.

50. — Indre.

ARRIVÉE : d'août à décembre.

DÉPART : mars, avril, juin.

Nichent rarement.

Assez communs sur certaines localités.

51. — **Eure-et-Loir.**

ARRIVÉE : mars, avril.

DÉPART : octobre, novembre.

Nichent aux environs de Châteaudun où ils sont communs.

Rares ailleurs excepté dans les plaines de Chartres.

NOM LOCAL : *Vannette*.

DEUXIÈME ZONE.

DÉPARTEMENTS SUR LESQUELS LES VANNEAUX SONT RARES.

52. — **Seine.**

Passent printemps, automne.

53. — **Meuse.**

ARRIVÉE : février, mars, avril; vents variables; direction : nord et est.

DÉPART : octobre, novembre, décembre; vents variables; direction : sud et ouest.

De passage seulement.

Plutôt rares, excepté sur les marais.

54. — **Aube.**

Passent printemps et automne.

Rares.

Quelques couples nichent.

55. — **Orne.**

Passent au printemps et à l'automne.

Rares.

Nicheraient aux environs d'Alençon ?

NOM LOCAL : *Vannet*.

56. — **Mayenne.**

ARRIVÉE : mai, juin; vent sud-est.

DÉPART : septembre à novembre, vent nord-est.

Nichent en avril et mai.

NOMS LOCAUX : *Huime, Pic, Mouette*.

57. — **Maine-et-Loire.**

Passent automne et printemps.

Sédentaires et nichant sur quelques localités.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DU VANNEAU. 87.

Rares.

NOM LOCAL : *Ti-huit*.

58. — **Deux-Sèvres.**

Passent au printemps et à l'automne.

Rares.

59. — **Vienne.**

Très rares.

60. — **Cher.**

Passent à l'automne et au printemps.

Rares.

NOM LOCAL : *Vannelle*.

61. — **Nièvre**

ARRIVÉE : novembre, vent sud? direction sud.

DÉPART : mars, vent nord? direction nord

Rares.

62. — **Jura.**

Passent à l'automne, octobre et novembre.

Repassent au printemps.

Assez rares.

63. — **Charente.**

Arrivent en décembre.

Repassent en mars, avril.

64. — **Haute-Vienne.**

Pas d'observations.

65. — **Creuse.**

ARRIVÉE : mars, avril.

DÉPART : octobre, novembre.

Quelques-uns nichent accidentellement en mai.

Les Vanneaux sont parfois nombreux au bord des étangs bien que les observateurs les indiquent comme rares sur le département.

66. — **Allier.**

Passent de septembre à novembre.

Repassent en février, mars, avril.

Plutôt rares.

67. — **Loire.**

Passent mars et novembre.
Nicheraient ?

68. — **Rhône.**

Rares. Passent seulement.

69. — **Puy-de-Dôme.**

Passent au printemps et à l'automne.
Rares.

70. — **Corrèze.**

Passent régulièrement en octobre, novembre, décembre, et repassent en mars, avril.

71. — **Dordogne.**

Passent régulièrement en novembre et en mars.
NOM LOCAL : *Vanneo*.

72. — **Lot.**

Très rares.

73. — **Tarn-et-Garonne.**

Passent très accidentellement en novembre et février.

74. — **Hautes-Pyrénées.**

ARRIVÉE : septembre, novembre ; vent nord, direction sud.
DÉPART : janvier, février, mars ; vent nord ; direction nord.
Passent seulement.
NOMS LOCAUX : *Baneau*, *Banious*? *Banéus*? *Banéou*.

75. — **Ariège.**

ARRIVÉE : octobre à décembre ; vents : sud, sud-ouest ; direction sud.
DÉPART : février, mars.
Ne font que passer.
NOMS LOCAUX : *Laouzetto*, *Laouzette*, *Banéou*.

76. — **Cantal.**

Passent au printemps et à l'automne.
Très rares.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DU VANNEAU. 89

77. — **Lozère.**

Passent octobre, repassent mars.

Rares.

NOM LOCAL : *Banel*.

78. — **Haute-Loire.**

Passent au printemps et à l'automne.

Rares.

79. — **Ardèche.**

Passent octobre, novembre.

Repassent mars, mai, juin.

Rares.

80. — **Isère.**

Passent en hiver.

Rares.

81. — **Savoie.**

Passent en septembre, octobre, novembre.

Repassent en mars, avril.

82. — **Haute-Savoie.**

Ne font que passer.

83. — **Hautes-Alpes.**

Passent en mai et octobre.

Rares.

84. — **Basses-Alpes.**

Ne font que passer à des époques variables.

Rares.

85. — **Alpes-Maritimes.**

Passent en novembre et décembre.

Repassent en février, mars, avril.

Plutôt rares.

NOMS LOCAUX : *Couïfat*, *Gudieu*.

86. — **Territoire de Belfort**

ARRIVÉE : fin février, mars ; vent ouest ; direction nord.

DÉPART : novembre, décembre ; vent ouest ; direction sud.

Séjourne peu. Accidentels.

NOMS LOCAUX : *Vanneau*, *Cul-blanc*.

87. — **Corse.**

ARRIVÉE : novembre, décembre ; vents : nord, nord-ouest, est ; direction : nord-est, sud.

DÉPART : mars, avril ; vents : sud, sud-ouest, nord-ouest ; direction : nord, sud ?

Plutôt rares.

NOMS LOCAUX : *Pivièta, Mige, Cristana, Gallo marino, Pie.*

Sur la carte ci-jointe les numéros correspondent à ceux du tableau.

La partie teintée en noir représente la première zone, celle sur laquelle les Vanneaux sont communs.

La partie blanche figure la seconde zone, sur laquelle les Vanneaux huppés sont rares ou de passage accidentel seulement.

La lettre N désigne les endroits où des nichées ont été observées.

La lettre S indique les lieux où le Vanneau est indiqué comme accidentellement sédentaire.

Avant d'examiner les conclusions qu'on doit tirer du tableau et de la carte qui précèdent, rappelons brièvement quelles sont les habitudes du Vanneau huppé.

Si le Pluvier peut être considéré comme un Oiseau de rivage, préférant les plages aux plaines et aux prairies, le Vanneau doit, au contraire, figurer parmi les Échassiers qui ne fréquentent que d'une façon accidentelle les grèves vaseuses et les limites du flot, au bord de la mer.

C'est un Oiseau de prairie, qui se cantonne surtout dans les prés humides, dans les *marais*, ce qui ne veut pas dire les marécages, car il n'aime pas l'eau profonde ; il affectionne les lieux où l'herbe est légèrement baignée par l'eau douce et quelquefois par l'eau salée, sur les bords accidentellement envahis par la mer ; il est aussi un visiteur des grandes plaines, surtout à l'époque des labours ; il se rencontre, en un mot, partout où il peut trouver des vers de terre.

Mais, à l'encontre du Pluvier doré et, remarquons-le



CARTE N° 1. — Vanneau huppé.

en passant, à l'encontre aussi du Pluvier argenté ou varié, (*Squatarola helvetica*) improprement appelé *Vanneau suisse*, et qui est un vrai Pluvier, malgré son pouce rudimentaire, le Vanneau huppé ne descend presque jamais sur les plages et les grèves que laisse à nu la marée en se retirant.

Depuis vingt-quatre ans que je chasse régulièrement au bord de la mer, je ne me souviens avoir vu qu'une grande bande de Vanneaux s'abattre sur le sable et les lagunes vaseuses abandonnés par le flot retiré.

J'y ai tué des individus *isolés*, bien souvent, mais les voliers, sur les côtes maritimes, m'ont toujours paru éviter ces endroits recherchés au contraire par les Pluviers dorés et variés.

Cependant, à l'embouchure des fleuves, *au fond* de la baie de Seine, notamment, là où la marée découvre de larges espaces vaseux, les Vanneaux se départissent un peu de leurs habitudes et se posent quelquefois sur les blancs-bancs ou bancs non herbeux.

Pareille observation paraît avoir été faite par M. le Dr Quinet, un naturaliste-belge distingué et chasseur passionné, aux rives du Bas-Escaut.

« Il fréquente volontiers, dit M. le Dr Quinet, en parlant du Vanneau, les Schorres et *les rives vaseuses du Bas-Escaut*, et depuis le Doel jusqu'à Flessingue, le chasseur ou le touriste pourra admirer ces intelligents volatiles, car cet oiseau est encore amoureux des terres basses ou fraîchement travaillées, comme il sait se complaire aux bords vaseux de la mer ou se contenter de se reproduire aux steppes de la Russie dans les plaines arides et les terrains sablonneux, à peine semés de quelques touffes de verdure. »

En Normandie, le Vanneau fréquente aussi les bords vaseux de la Seine, de la Risle, de l'Orne, mais, je le répète, il évite assez volontiers les bords de la mer, les grèves et les plages, trouvant, dans les prairies et les marais qui avoisinent les côtes, des lieux de stationnement qu'il leur préfère incontestablement.

Aussi voyons-nous, en consultant la carte qui accompagne cette notice, que le Vanneau est commun en France dans tous les pays de bas niveau, partout où existent des prairies et des grandes plaines, dans toutes les contrées de pays plat.

Et, si à propos d'autres migrateurs, nous avons vu le relief du sol jouer un rôle important dans la distribution des espèces étudiées, nous pouvons affirmer qu'en ce qui touche les Vanneaux, la carte orographique de la France peut servir à dresser avec la plus grande précision celle de la dispersion de ces Oiseaux sur notre territoire.

La zone blanche, celle où les Vanneaux sont rares, commence avec les collines du Perche et de Normandie, (département de l'Orne), se continue avec celles du Maine, le plateau de Gâtine, les collines du Poitou, puis vient se grouper avec les monts de la Marche, du Limousin, du Cantal, de l'Auvergne, du Puy-de-Dôme, du Mont-Dore, pour gagner la ligne de partage des eaux avec les monts du Forez, du Velay, du Vivarais, du Beaujolais, incliner à gauche, avec les monts du Morvan, s'étendre sur l'Est avec les monts du Jura, les Alpes et se ramifier dans le Nord aux abords de l'Argonne. Du côté des Pyrénées, les Vanneaux dédaignent les départements des Hautes-Pyrénées et de l'Ariège et s'ils se retrouvent sur les Basses-Pyrénées et les Pyrénées-Orientales, c'est que le voisinage des côtes explique dans une certaine mesure leurs apparitions régulières.

L'enquête nous aura donc révélé un fait intéressant, à savoir que les hauts plateaux ne sont point fréquentés par les Vanneaux et que les montagnes élevées paraissent les arrêter dans leur mouvement.

Je ne crois pas, en effet, que les Vanneaux traversent *régulièrement*, même en voyage, alors qu'ils sont « en route » le grand plateau central qui forme presque toute la zone blanche de la carte.

○ Ils doivent suivre de préférence, dans leur mouvement de descente vers le Sud, deux voies différentes. La

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DU VANNEAU. 95

contrée d'origine des Vanneaux est la Hollande. C'est de ce pays que partent les grandes bandes qui se répandent en Belgique et en France à l'automne. Les petits voliers peuvent être le résultat des nichées observées sur notre territoire ou provenir de la nidification sur les îles de la Grande-Bretagne.

Mais, abstraction faite des mouvements isolés et en ne prenant que le grand déplacement des contrées d'origine aux lieux d'hivernage, on remarque que dès le mois d'août, et même dès le mois de juillet, les Vanneaux apparaissent sur les départements maritimes du Nord-Ouest : le Nord, Pas-de-Calais, Somme, Seine-Inférieure, Eure, Calvados, etc., et que ce n'est que vers le mois de septembre, d'octobre et de novembre que les voliers sont signalés sur les départements de l'Ouest, et seulement en octobre, novembre et décembre sur ceux du Sud-Ouest.

La descente s'effectue donc, pour ceux qui suivent les côtes, de juillet à décembre, depuis le département du Nord jusqu'au département des Basses-Pyrénées.

Les Vanneaux qui prennent la route de terre peuvent gagner les départements limitrophes de la Méditerranée en passant par les départements de l'Ain et de la Drôme pour se répandre en octobre, novembre et décembre sur la Provence et les départements du midi.

Il n'est pas sans intérêt de noter que les Vanneaux, comme presque tous les Oiseaux de passage, sont toujours *communs* sur *tous* les départements maritimes.

Étant donnée la constatation déjà mentionnée que le Vanneau n'est pas un Oiseau de rivage, il est certain que le climat tempéré des bords de la mer joue cependant un rôle dans son aviation.

Le Vanneau huppé n'est pas un migrateur dans le sens absolu du mot.

L'espèce ne disparaît pas complètement de nos contrées en hiver.

Beaucoup d'observateurs mentionnent la présence du Vanneau pendant les grands froids.

Il effectue cependant des passages bien apparents à l'automne et au printemps.

C'est un Oiseau à classer parmi ceux qui *descendent* simplement, sans entreprendre une vraie migration, un volatile à déplacements dans la *direction* du midi, mais qui laisse toujours des trainards dans nos pays de climat tempéré.

Ces voyageurs à escales, qui stationnent, même pendant l'hiver, n'ont pas droit au titre de migrateurs proprement dits.

Les Cigognes, les Grues, les Cailles, les Hirondelles et autres Oiseaux qui quittent franchement leurs résidences d'été pour passer *tout d'un coup* au midi, voilà les vrais migrateurs.

Ceux qui descendent mollement, s'arrêtant en route, sont les oiseaux à déplacements, qui font du *cabotage* et ne connaissent point le long cours.

Les Vanneaux sont à classer parmi les grands *Caboteurs*.

Oiseaux de passage, ils le sont assurément, mais ils n'opèrent pas une véritable migration et ne peuvent prendre place auprès des grands migrateurs que je viens de citer.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornis - Journal of the International Ornithological Committee.](#)

Jahr/Year: 1899

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Ternier Louis

Artikel/Article: [DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE EN FRANCE DU VANNEAU HUPPE 77-96](#)