Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE EN FRANCE

DE

L'OUTARDE CANEPETIÈRE

(*OTIS TETRAX*)

D'APRÈS LES DONNÉES DE L'ENQUÊTE TERRITORIALE DE 1886

PAR

M. L. TERNIER

Je n'ai eu à compulser, au sujet de cet Oiseau, que les feuilles de 1886.

Le résultat de l'examen de ces feuilles d'enquête a été négatif en ce qui touche le sens de la migration des Canepetières.

Il a été assez satisfaisant en ce qui concerne les dates d'arrivée et de départ des Oiseaux, et leur distribution géographique dans ses grandes lignes.

Les observations sur la nidification m'ont paru suffisamment exactes pour être notées. Quelques-unes concordent, du reste, avec ce que j'ai pu constater personnellement.

Mais il reste bien entendu qu'en ce qui regarde l'ensemble des observations je me borne ici, comme je l'ai fait jusqu'à présent, à condenser simplement les résultats de l'enquête pour en former un tout, sous la seule responsabilité des observateurs consultés, après avoir seulement écarté les erreurs trop manifestes ou les confusions entre un Oiseau et un autre.

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Voici le tableau résumant les observations pour l'année 1886.

La première partie comprend les départements sur lesquels l'Outarde canepetière est marquée comme commune ou assez commune; la seconde englobe ceux sur lesquels elle est rare ou accidentelle :

DÉPARTEMENTS SUR LESQUELS L'OUTARDE CANEPETIÈRE EST COMMUNE OU ASSEZ COMMUNE

1. — **Aisne.**

Commune.
Séjourne en août et septembre seulement.

2. — **Marne.**

Commune.

3. — **Haute-Marne.**

Assez commune aux environs de Saint-Dizier et de Vassy.
Rare ailleurs.

4. — **Aube.**

Très commune, troupes nombreuses.
Arrivée : mars, avril.
Départ : septembre.
Niche en mai, juin; 4 à 5 œufs.

5. — **Yonne.**

Commune aux environs de Sens.
Rare ailleurs.
Arrivée : février, mars.
Départ : septembre, octobre.
Niche, mai, juin, juillet; 4 à 5 œufs.

6. — **Cher.**

Commune sur certains points.
Rare ailleurs.
Arrivée : avril, mai.
Départ : septembre, octobre.
Niche en juin; 2 à 5 œufs.
Noms locaux : *Canepetière, Pétrille, Canepétraire, Canepétrote.*

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

7. — Indre.

Commune (observations de M. Martin et observation personnelle).
Arrivée : mars, avril.
Départ : octobre.
Niche en avril (M. Martin) et mai ; 4 à 5 œufs.
Nom local : *Pétrat*.

8. — Loir-et-Cher.

Commune.
Arrivée : mars, avril.
Départ : octobre.
Niche en mai ; 2 à 4 œufs.
Noms locaux : *Canepetière*, *Canepétrasse*.

9. — Eure-et-Loir.

Très commune.
Arrivée : avril, mai.
Départ : septembre, octobre.
Niche en mai, juin ; 4 œufs.
Noms locaux : *Outarde*, *Canepétrasse*.

DÉPARTEMENTS SUR LESQUELS L'OUTARDE CANEPETIÈRE EST RARE OU ACCIDENTELLE.

10. — Meurthe-et-Moselle.

Accidentelle.

11. — Vosges.

Accidentelle.

12. — Nord.

Accidentelle ; rencontrée trois fois seulement aux environs de Bergues (de Neezemacker).

13. — Somme.

Indiquée comme très rare par un observateur.
Commune, suivant un autre.
Sans autres indications.

14. — Eure.

Accidentelle (observation personnelle).

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

15. — **Seine-et-Oise.**

Accidentelle.

16. — **Seine-et-Marne.**

Rare.
Passe en avril et en octobre.

17. — **Loiret.**

Rare.
Passe en février, mars.

18. — **Sarthe.**

Rare.

19. — **Mayenne.**

Accidentelle.

20. — **Manche.**

Très rare.

21. — **Côtes-du-Nord.**

Rare.
Arrivée : mai, juin.
Départ : septembre, octobre.
Nicherait en juin ; 3 à 5 œufs.

22. — **Finistère.**

Accidentelle.

23. — **Loire-inférieure.**

Rare.
Arrivée : mars, avril.
Départ : septembre, octobre, novembre.
Nicherait en juin ? ?

24. — **Vendée.**

Indiquée comme commune par un observateur.
Rare suivant les autres.

25. — **Charente-Inférieure.**

Rare ; passe mars, avril, septembre et octobre.
Nicherait en mai ?

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

26. — **Allier.**

Très rare; je ne l'ai jamais vue personnellement.

27. — **Haute-Loire.**

Passerait en février, mars, septembre, octobre et novembre.

28. — **Lozère.**

Passerait en mars, avril, et septembre et octobre.

29. — **Vaucluse.**

Accidentelle.
Noms locaux : *Estarde, Poule de Carthage.*

30. — **Pyrénées-Orientales.**

Rare.
Passe en mai, juin, août et septembre.

31. — **Ariège.**

Indiquée comme commune par un observateur.
Comme rare, par les autres.
Confondue par un d'eux.
Arriverait en avril et mai.
Repartirait en octobre.
Renseignements très douteux.

32. — **Haute-Garonne.**

Passerait en août et octobre.

33. — **Gers.**

Rare.
Passe en automne.

34. — **Hautes-Pyrénées.**

Rare.
Passerait au printemps et à l'automne.

35. — **Basses-Pyrénées.**

Rare.
Passe en mars, avril, mai, septembre, octobre, novembre et décembre.

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

La carte dressée suivant les données de ce tableau présente trois zones.



Carte n° 1. — Outarde canepetière.

La première, teintée en noir, indique ceux des départements sur lesquels l'Outarde canepetière est commune ou assez commune.

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

La seconde teintée en gris comprend ceux sur lesquels l'Outarde canepetière est rare ou accidentelle.

La troisième en blanc figure ceux sur lesquels les renseignements font défaut ou sont insuffisants.

L'examen du tableau et de la carte ne révèle rien qui puisse choquer les connaissances acquises sur la distribution géographique de la Canepetière en France, sur ses dates d'arrivée et de départ ni sur la nidification.

L'Outarde canepetière se cantonne de préférence dans les plaines de la Champagne et de la Beauce ; sur les départements de l'Aube, de la Haute-Marne, de la Marne, de l'Aisne, de l'Yonne, du Cher, de l'Indre, du Loir-et-Cher, de l'Eure-et-Loir.

Je l'ai observée personnellement sur quelques-uns de ces départements.

J'ai constaté sa présence accidentelle sur quelques autres, l'Eure notamment.

Elle affectionne les grandes plaines, et celles du centre de la France, dans sa partie de plus bas niveau, paraissent lui convenir plus particulièrement.

Les Canepetières arrivent, d'après l'enquête, au printemps et repartent de septembre à novembre.

Quant à la nidification, les observations paraissent exactes puisqu'elles indiquent un nombre d'œufs variant en moyenne de 3 à 5 avec écarts d'un ou deux œufs, ce qui représente le chiffre normal des pontes de la Canepetière.

L'enquête de 1886 sur la Canepetière ne présente peut-être pas un bien grand intérêt comme observations inédites. Elle a cependant prouvé une fois de plus que les observateurs en majorité ont consciencieusement répondu aux questions qui leur étaient posées. Cette constatation n'est pas sans intérêt.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Ornis - Journal of the International Ornithological Committee.

Jahr/Year: 1900

Band/Volume: 11

Autor(en)/Author(s): Ternier Louis

Artikel/Article: DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE EN FRANCE DE L'OUTARDE CANEPETIERE 277-283