

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE EN FRANCE

DES

TÉTRAONIDÉS

(*TETRAO UROGALLUS*, L. — *T. MEDIUS*, MEYER. — *T. TETRIX*, L.
TETRASTES BONASIA, L. — *LAGOPUS MUTUS*, LEACH)

PAR

M. J. DE CLAYBROOKE

Nous donnons ici, pour faire suite aux intéressants mémoires déjà publiés dans l'*Ornis* par M. Louis Ternier, un tableau de la répartition géographique en France des Oiseaux appartenant à la famille des Tétrionidés. Nous avons utilisé pour ce travail les renseignements résultant de l'enquête territoriale de 1885 et de 1886, ainsi que les trop peu nombreuses faunes locales et les observations diverses que nous avons pu nous procurer. Nous aurions souhaité que nos recherches pussent nous amener à une conclusion moins triste, puisqu'elles ne nous ont fait aboutir qu'à cette constatation que, dans presque tous les endroits où ces beaux Oiseaux étaient nombreux dans notre pays, ils ont presque disparu ou tout au moins diminué dans des proportions telles que l'on doit prévoir, sans pessimisme exagéré, leur extinction totale dans un avenir assez rapproché.

Nous ne sommes plus, hélas! au temps de Pierre Belon (vers 1540), alors que les Grands Tétrons (Coqs des bois ou Faisans huyans) étaient si communs en Auvergne et en Savoie, par exemple, « qu'on ne pouvait passer les monts

en aucune saison de l'hiver sans voir des Tétràs aux boutiques des charcutiers ou dans les hôtels dans les montagnes ». Il n'y a rien dans cette extinction qui soit de nature à nous étonner. Les Tétràonidés n'ont pas seulement le privilège d'intéresser le naturaliste : la bizarrerie captivante de leurs mœurs, la beauté de leurs formes et de leur plumage, les difficultés de leur chasse et les plaisirs qu'elle procure, enfin leur taille souvent considérable et la succulence renommée de leur chair, en font un gibier des plus recherchés et que, par suite, n'épargnent ni les chasseurs, ni les braconniers.

Nous verrons qu'il y a pourtant une exception à ce déplorable état de choses, puisque la Gélinothe, autrefois rare dans le département de Meurthe-et-Moselle, y est devenue assez commune depuis 1885 et s'y répand de plus en plus.

Malgré tout, nous n'aurons pas, comme dans les travaux de statistique zoologique analogues, à partager la France en plusieurs zones, suivant le degré de fréquence de ces Oiseaux ; nous allons voir qu'ils sont en somme assez rares même dans les localités où ils se trouvent encore, et il suffira dès lors d'indiquer les départements où on les rencontre. Ces départements sont tous situés contre nos frontières montagneuses de l'Est (Vosges, Alpes) et du Sud (Pyrénées). Nous commencerons par le nord en descendant vers le midi, puis en continuant par les Pyrénées, de l'est à l'ouest.

A

TETRAO UROGALLUS, L.

(*Tétràs urogalle, Grand Tétràs, Grand Coq de bruyère*).

1. — Meurthe-et-Moselle.

ARRONDISSEMENT DE LUNÉVILLE. *Vacqueville* (rare); *Neufmaisons* (ass. commun), dans les forêts résineuses.
(Enq. territ. 1885-86.)

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DES TÉTRAONIDÉS. 191

2. — Vosges.

ARRONDISSEMENT DE SAINT-DIÉ, à *Saint-Dié* (commun); *Lubine*; *Fraize* (commun).

ARRONDISSEMENT DE REMIREMONT. *Piétat de Gerbémont* (rare); *Cornimont*, sur les hauteurs (ass. commun, mais tend à disparaître).

Sédentaire. Niche d'avril à juin. Nom local : *Faisan* (Lubine), *Rousse* la ♀, et *Grianot*, le jeune (Fraize).

(Enq. territ. 1885-86.)

Au commencement du XIX^e siècle, Sébastien Gérardin (de Mirecourt) (1) indique la forêt communale d'Épinal comme renfermant très fréquemment le T. urogalle, qui existait encore en plus grand nombre dans les bois environnant *Gérardmer* (arr. de Saint-Dié) et *Bruyères* (arr. d'Épinal).

La collection Marmottan, au Muséum d'histoire naturelle de Paris, comprend 2 ♂ et 1 ♀ capturés à *Remiremont* (1868 et 1881) et à *Raon-l'Étape* (arr. de Saint-Dié) (7 avril 1884).

D'après Godron (2), cette espèce est assez commune dans les forêts de la chaîne des Vosges, depuis *Bitche* jusqu'à *Girromagny*.

3. — Haute-Marne.

ARRONDISSEMENT DE CHAUMONT. *Nogent-en-Bassigny* (rare).

De passage, en avril; part de la fin de septembre à la première semaine d'octobre, le jour.

(Enq. territ. 1885-86.)

4. — Haute-Saône.

ARRONDISSEMENT DE LURE. *Château-Lambert*; *Saint-Antoine*.

Sédentaire.

(Enq. territ. 1885.)

5. — Territoire de Belfort.

Girromagny (très rare), sur la crête des montagnes (Voy. *Vosges*, obs. Godron, 1862).

Sédentaire.

(Enq. territ. 1886.)

6. — Doubs.

ARRONDISSEMENT DE PONTARLIER. *Mouthe* (commun).

Sédentaire.

(Enq. territ. 1885.)

(1) S. G., *Tableau élément. d'ornithologie ou Hist. nat. des Oiseaux que l'on rencontre communément en France*, 1806.

(2) G., *Zoologie de la Lorraine*, 1862.

7. — Jura.

ARRONDISSEMENT DE SAINT-CLAUDE. *Saint-Laurent*, dans les grands massifs boisés et peu fréquentés.

(Enq. territ. 1885.)

D'après le frère Ogérien (1) : rare en 1863 dans les forêts des *Crozetts*, de *Leschères*, des *Piards*, de *Trémontone*, de *Préuvel*, du *Frasnois*; plus abondant au mont *Rizoux*, dent de *Vaulion*, au crêt du *Chalam*, dans les forêts de *Momez* et des *Rousses*; autrefois commun.

8. — Ain.

ARRONDISSEMENT DE GEX. AUX environs de *Gex* (assez rare), sur les sommets à 1300 mètres d'altitude et au-dessus, le matin et le soir seulement, très sauvage.

ARRONDISSEMENT DE NANTUA. *Châtillon-de-Michaille* (rare).

Sédentaire. Niche juin et juillet. Chante du 1^{er} avril au 1^{er} juin. Nom local : *Tetras Faisan* (Gez).

(Enq. territ. 1885-86.)

9. — Savoie.

ARRONDISSEMENT D'ALBERTVILLE (très commun), sur la crête des montagnes; *Grésy-sur-Isère* (très rare); *Beaufort*; *Ugines* (commun).

ARRONDISSEMENT DE SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE. *Epierre*; *La Chapelle* (ass. commun, mais tend à disparaître), dans les grands bois de sapins sur les plus hauts sommets (2).

Sédentaire. Niche d'avril à juin. Nom local : *Faisan*.

(Enq. territ. 1885-86.)

10. — Pyrénées-Orientales.

ARRONDISSEMENT DE PRADES. *Les Angles*; *Bolquère*; *Fontrabiouse*; *Formiguères*; *La Llagonne*; *Mont-Louis*; *Railleu* (rare). Forêts arides de pins, endroits les plus fourrés, très sauvage.

Niche. Nom local : *Pouil salbaché*.

(Enq. territ. 1885-86.)

Ad. Lacroix (3) le cite comme habitant les forêts les plus élevées des montagnes de ce département.

D'après L. Companyo (4), on le trouve dans les grands bois des régions les plus élevées de la *Cerdagne* et du *Capsir*; il y est sédentaire.

(1) Le fr. Og., *Histoire naturelle du Jura et des dép. voisins*, 1863.

(2) On le chasse au fusil en mai et aux filets de juillet à septembre (Enq. territ.).

(3) A. L., *Catalogue raisonné des Oiseaux observés dans les Pyrénées et régions limitrophes*, 1873-75.

(4) L. C., *Hist. nat. du département des Pyrénées-Orientales*, 1863.

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE DES TÉTRAONIDÉS. 193

11. — Ariège.

ARRONDISSEMENT DE FOIX. *Le Bosc*; *Château-Verdun* (sapinières); *Foix* (grandes forêts); *Gourbit* (rare); *Le Pla* (très commun); *Prayols* (forêts de sapins, ou, à leur défaut, grands massifs de hêtres); *Siguer* (à 1460 mètres au-dessus de la mer); *Tarascon* (rare); *Vie-Dessos*.

ARRONDISSEMENT DE SAINT-GIRONS. *Castillon*; *Massat* (rare); *Moulis* (ass. commun); *Orgibet* (hautes montagnes); *Saint-Girons* (ass. commun); *Scix*, *Sentein* (hautes montagnes boisées); *Ustou* (bois de hêtres et, l'hiver, sapinières).

Sédentaire. Niche de février à août. Nom local : *Paon* ou *Poul salvaché* (Le Bosc, Le Pla); *Coq de montagne* (Siguer); *Coq* ou *poule sauvage* (Château-Verdun, Siguer), *Fuisan* (Saint-Girons), *Pwon* (Sentein).

D'après Ad. Lacroix (*loc. cit.*), le *T. urogallus* est commun dans le département, où il niche régulièrement.

12. — Haute-Garonne.

ARRONDISSEMENT DE SAINT-GAUDENS. *Bagnères-de-Luchon*.

Sédentaire. Commence à chanter en mai. Nom local : *Paon sauvage*.

(Enq. territ. 1885-86.)

Ad. Lacroix (*loc. cit.*) indique comme localités *Fos*, *Saint-Béat* (assez rare), dans les grandes forêts de pins et de sapins.

Collection Marmottan (Muséum d'hist. nat. de Paris) : un ♂ capturé à Luchon (1876).

13. — Hautes-Pyrénées.

ARRONDISSEMENT DE BAGNÈRES-DE-BIGORRE. *Aneizan* (sapinières); *Aragnaouet* (commun); *Arreau* (ass. commun, parties élevées en hiver); *Bize*; *Camparan* (hautes forêts de sapins exposées au soleil); *Gènerest* (hautes montagnes); *Saint-Laurent*; *Tramezrigues*.

ARRONDISSEMENT D'ARGELES. *Barèges* (commun); *Cauterets* (rare); *Luz* (commun).

Sédentaire. Niche de mai à juillet. Commence à chanter à l'aube au milieu de mai. Nom local : *Paon* (Aragnaouet).

(Enq. territ. 1885-86.)

Dans la collection Marmottan (Muséum d'hist. nat. de Paris), une ♀ provenant de Bagnères-de-Bigorre (1887).

Ad. Lacroix (*loc. cit.*) considère cet oiseau comme commun dans les grands bois des parties les plus élevées.


14. — Basses-Pyrénées.

ARRONDISSEMENT D'OLORON. *Bélous*; *Urdois* (rare), à 1000 ou 1400 mètres.

Sédentaire.

(Enq. territ. 1885-86.)

D'après Alb. Granger (1), l'espèce est très rare et de passage accidentel dans ce département (Muséum de Bayonne).



A. — Distribution géographique du *Tetrao urogallus*. (Les numéros des départements portés sur la carte correspondent à ceux du texte, pour cette espèce.)

Enfin, le *T. urogallus* a été encore signalé dans d'autres régions, dont voici la liste :

D'après l'Enquête territoriale de 1885, les chasseurs en tuaient quelquefois, quoique rarement, dans l'arrondissement de Dreux (Eure-et-Loir), au *Rond-du-Roi*, à *Senonches*; mais on doit se demander s'il n'y a pas ici erreur sur l'espèce observée.

(1) A. G., *Catalogue des Oiseaux sédent. ou de pass. obs. dans les départ. de la Charente-Inférieure, de la Gironde, des Landes et des Basses-Pyrénées*. 1893.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DES TÉTRAONIDÉS. 195

Dresser (citant Delarbre) dit que cet Oiseau existait encore au XIX^e siècle dans la *Noriche* et la *Catelade*, près d'*Olliergues* (Puy-de-Dôme, arrond. d'Ambert), dans la forêt de *Menet* (Cantal, arrond. de Mauriac) et dans celles de *Mont-Dore* (Puy-de-Dôme, arrond. de Clermont).

En 1838, un couple a niché à *Lomont* (Doubs, arrond. de Baumeles-Dames) et à *Montécheroux* (arrond. de Montbéliard) (Sabler).

L. Marchant (1) signale comme très rare et de passage accidentel le *T. urogallus* à *Vernot* (arrond. de Dijon, canton d'Is-sur-Tille), où un exemplaire aurait été tué en 1834; plusieurs années auparavant, on en avait déjà tué quelques-uns dans la même localité.

Époque quaternaire : Lacombe (Dordogne) et Bruniquel (Tarn-et-Garonne).

B

TETRAO (LYRURUS) TETRIX L.

(*Tétras à queue fourchée*; *Petit Coq de bruyère*, *Lyrure des bouleaux*).

1. — Vosges.

ARRONDISSEMENT DE SAINT-DIÉ. *Les Feignes* (rare); *Lubine* (commun); *Vioménil*.

Sédentaire. Niche deuxième quinzaine d'avril.

(Enq. territ. 1885-86.)

D'après Sébastien Gérardin (de Mirecourt) (2), le *T. tetrix* se trouve sur plusieurs montagnes des Vosges; mais il y serait seulement de passage.

Olphe Gaillard (3) dit qu'il n'existe plus dans les Vosges, où il était autrefois commun.

2. — Haute-Marne.

ARRONDISSEMENT DE CHAUMONT. *Pérusse* (très commun).

Sédentaire. Nom local : *Coq sauvage*.

(Enq. territ. 1885-86.)

3. — Haute-Saône.

ARRONDISSEMENT DE LURE. *Château-Lambert* (commun).

Sédentaire. Niche deuxième quinzaine d'avril.

(Enq. territ. 1886.)

(1) L. M., *Catalogue des Oiseaux obs. dans le dép. de la Côte-d'Or*, 1868.

(2) *Loc. cit.*

(3) O. G., *Contribution à la faune ornith. de l'Europe occidentale*, 1886.

4. — Doubs.

ARRONDISSEMENT DE PONTARLIER. *Mouthe* (assez rare).
Sédentaire. Niche deuxième quinzaine de juin.
(Enq. territ. 1886.)

ARRONDISSEMENT DE MONTBÉLIARD (très rare). Sédentaire (Sahler).

5. — Haute-Savoie.

ARRONDISSEMENT DE THONON (assez commun), dans les sapinières les plus élevées et dans les champs de rhododendrons et de myrtilles.

ARRONDISSEMENT DE SAINT-JULIEN. *Vétraz* (commun).

ARRONDISSEMENT DE BONNEVILLE (commun).

ARRONDISSEMENT D'ANNEY. Environs d'*Annécy* (commun), surtout au-dessus de 1400 mètres; *Les Balmettes* (devient rare).

Sédentaire. Niche de mai à juin.

(Enq. territ. 1885.)

6. — Savoie.

ARRONDISSEMENT DE CHAMBÉRY. Environs de *Chambéry* (assez commun); *Saint-Pierre-d'Albigny*.

ARRONDISSEMENT DE MOUTIERS (rare), sur les lisières des forêts les plus élevées.

Sédentaire. Niche mai et juin. Nom local : *Faisan*.

(Enq. territ. 1885-86.)

Signalé par Bailly dans le département (citation Olphe Gaillard).

Collection Bonaparte, au Muséum d'hist. nat. de Paris, 2 exemplaires venant de la Savoie (1838).

7. — Isère.

ARRONDISSEMENT DE GRENOBLE. *Auris* (hautes montagnes, forêts résineuses; sauvage); *La Mitre d'Isère* (assez commun), de 1200 à 1800 mètres d'altitude; *Mens* (ass. commun); *Saint-Hugon*, sur *La Chapelle-du-Bord* (commun); *Tréminis* (ass. commun), à 1900 mètres; *Villard-Reymond* (commun); *Vizille*, à 1500 mètres.

ARRONDISSEMENT DE SAINT-MARCELLIN. *La Rivière*.

Sédentaire. Niche mai à juillet. Nom local : *Faisan*.

(Enq. territ. 1885-86.)

8. — Drôme.

ARRONDISSEMENT DE DIE. *Glandage* (rare); *Lus-la-Croix-Haute* (ass. rare); *Romeyer* (ass. commun); *Saint-Agnan* (1200 à 1500 mètres).

Sédentaire. Nom local : *Faisan*.

(Enq. territ. 1885-86.)

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DES TÉTRAONIDÉS. 197

9. — Hautes-Alpes.

ARRONDISSEMENT DE BRIANÇON. *Aiguilles* (ass. commun), au-dessus de 1800 mètres, si ce n'est dans les plus grands froids.


(Enq. territ. 1885-86.)

10. — Basses-Alpes.

ARRONDISSEMENT DE BARCELONNETTE (commun), dans les hautes forêts.

Sédentaire. Niche en mars.

(Enq. territ. 1885-86.)



B. — Distribution géographique du *Tetrao tetrix*. (Les numéros des départements portés sur la carte correspondent à ceux du texte, pour cette espèce.)

Collections du Muséum d'hist. nat. de Paris, un ♂ avant la mue, tué à Senières, le 13 juillet 1851 (don de l'abbé Coire).

11. — Alpes-Maritimes.

ARRONDISSEMENT DE NICE (commun), dans les hautes forêts de sapins ; *Roquebillière*.

Sédentaire. Nom local : *Fuisan*.

(Enq. territ. 1885.)

12. — Ariège.

ARRONDISSEMENT DE FOIX. *Prudes* (commun).

Sédentaire.

(Enq. territ. 1886.)

Le *T. tetrica* a encore été signalé dans le Jura (très rare), où il en a été tué plusieurs spécimens entre *Clairveaux* (arr. de Lons-le-Sauvage) et *Saint-Claude*; il se rencontre aussi dans la forêt de *Morez* (arr. de Saint-Claude), où il niche (le frère Ogérien, *loc. cit.*).

D'après L. Companyo (*loc. cit.*), l'espèce est plus répandue que les autres et habite les bois et bruyères des hautes *Corbières*, dans les régions fraîches.

Sébastien Gérardin (*loc. cit.*) dit qu'il se complait sur les *montagnes de l'Ain*.

Époque quaternaire : *Massat* (Ariège).

C

TETRASTES BONASIA, L.

(*Tétraz gélinotte, Poule des bois*).

— Ardennes.

ARRONDISSEMENT DE SEDAN. *Villers-Cernay* (ass. commun).

Nom local : *Gélinot*.

(Enq. territ. 1885.)

Collection Marmottan, au Muséum d'hist. nat. de Paris; un ♂ et une ♀ provenant des Ardennes (1886).

2. — Meurthe-et-Moselle.

ARRONDISSEMENT DE BRIEY (ass. commun), depuis 1885; on n'en voyait que peu auparavant; *Villancy*; *Briey*.

ARRONDISSEMENT DE NANCY. *Frouard* (commun); *Vézelize* (ass. rare).

ARRONDISSEMENT DE LUNÉVILLE. *Neufmaisons* (commun); *Vacqueville* (rare).

Sédentaire. Niche mai-août.

(Enq. territ. 1885-86.)

Bois de *Longwy*, arr. de Briey (très rare) (Godron, *loc. cit.*).

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DES TÉTRAONIDÉS. 199

3. — Haute-Marne.

ARRONDISSEMENT DE CHAUMONT. *Andelot* (très commun il y a quarante ans; disparu; *Chaumont*; *Nogent* (très rare); *Pérusse* (très commun).

ARRONDISSEMENT DE LANGRES. *Bourbonne* (commun dans les forêts où abondent les coudriers); *Bussières* (commun); *Fays-Billot* (rare); *Langres* (ass. commun); *Neuilly-l'Évêque* (rare).

Sédentaire, sauf à Nogent où il est de passage, arrivant en avril et partant de la fin de septembre au 10 octobre, le jour.

(Enq. territ. 1885-86.)

Sédentaire en été, très rare (Lescuyer) (1).

4. — Vosges.

ARRONDISSEMENT DE NEUFCHATEAU. Commun dans tout l'arrondissement, surtout dans le sud, à *Bulgnéville* et *Lamarche* (forêt de *Saint-Julien*), où l'espèce tend à se multiplier et à se reproduire de plus en plus.

ARRONDISSEMENT DE MIRECOURT. *Haréville* (commun); *Madecourt* (rare).

ARRONDISSEMENT D'ÉPINAL. *Rambervillers* (commun).

ARRONDISSEMENT DE SAINT-DIÉ. *Fraize*; *Grand-Vallin*; *Lubine*.

ARRONDISSEMENT DE REMIREMONT. *Granges de Plombières*; *Saint-Maurice*.

Sédentaire. Niche avril et mai.

(Enq. territ. 1885-86.)

Collection Marmottan, au Muséum d'hist. nat. de Paris, un ♂ et une ♀ provenant de Mirecourt (1868-69).

Bois qui sont au pied et sur le penchant des Vosges (Séb. Gérardin, *loc. cit.*).

Se rencontre dans les Vosges [Dresser (2), citant Bailly (3)] (Krøner).

5. — Territoire de Belfort.

Girromagny (ass. commun); *Chaux*.

(Enq. territ. 1885.)

6. — Yonne.

ARRONDISSEMENT DE TONNERRE. *Châtel-Gérard* (de passage).

(Enq. territ. 1885-86.)

(1) L., *Classification des Oiseaux de la vallée de la Marne*, 1889.

(2) H. S. Dr., *A hist. of Birds of Europe*.

(3) B., *Ornithol. de la Savoie*.

7. — Côte-d'Or.

ARRONDISSEMENT DE DIJON. *Auxonne*; *Forêt de Crochère*.

Sédentaire.

(Enq. territ. 1885.)

Gray, commun, sédentaire (G. Wattebled) (1).

8. — Haute-Saône.

ARRONDISSEMENT DE GRAY. *Saint-Adrien* (commun).ARRONDISSEMENT DE VESOUL. *Amance*; *Montbozon*; *La Rochère* (commun); *Vesoul* (commun).ARRONDISSEMENT DE LURE. *Château-Lambert* (commun); *Conflans*; *Luxeuil*; *Saint-Antoine*.

Sédentaire. Niche de fin mars au 15 mai.

(Enq. territ. 1885-86.)

9. — Doubs.

ARRONDISSEMENT DE BAUME-LES-DAMES (ass. rare).

ARRONDISSEMENT DE BESANÇON, dans les localités à coudriers, forêts des hautes montagnes ou plaines couvertes de hautes bruyères; *Ormans*.ARRONDISSEMENT DE PONTARLIER. *Mouthe* (commun).Sédentaire (sauf à *Baume-les-Dames*, où il est de passage, de mars à octobre).

(Enq. territ. 1885-86.)

Ass. commun dans l'arrond. de *Montbéliard* (Sahler) (2).

10. — Jura.

ARRONDISSEMENT DE SAINT-CLAUDE. *Saint-Laurent*.

Sédentaire.

(Enq. territ. 1885.)

Ass. commun, sédentaire; autrefois très commun sur les hauts plateaux boisés, fourrés épais; très sauvage (le frère Ogérien, *loc. cit.*).

11. — Ain.

ARRONDISSEMENT DE GEX (ass. rare), à partir de 800 mètres.

ARRONDISSEMENT DE NANTUA. *Châtillon-de-Michaille* (rare).Sédentaire. Niche juin-juillet. Nom local: *Poulaillette* (Gex).

12. — Haute-Savoie.

ARRONDISSEMENT DE THONON, forêts de haute montagne.

ARRONDISSEMENT DE SAINT-JULIEN. *Vétraz*, forêts peu élevées.(1) G. W., *Liste des Oiseaux observés aux environs d'Auxonne*.(2) S., *Catalogue raisonné des an. vertébrés qui se renc. dans l'arrond. de Montbéliard*, 1867.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DES TÉTRAONIDÉS. 201

ARRONDISSEMENT DE BONNEVILLE. *Taninges*, forêts de haute montagne.

ARRONDISSEMENT D'ANNEY, hautes montagnes. *Les Balmettes* (1) (rare).

Sédentaire (à *Vétraz*, disparaît en hiver). Niche de juin au 25 août.

Nom local : *Poulailette* (Les Balmettes), *Perdrix* (Taninges).

Faucigny; ass. commun dans les forêts de *Banges* et dans les bois des montagnes à *Chantagnes*, *Rumilly* et *Anney* (Bailly, *loc. cit.*).

13. — Savoie.

ARRONDISSEMENT DE CHAMBÉRY (ass. rare).

ARRONDISSEMENT D'ALBERTVILLE (ass. commun), bois montagneux.

ARRONDISSEMENT DE MOUTIERS (très rare), exclusivement dans les forêts.

ARRONDISSEMENT DE SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE. *Épierre*, canton de *La Chapelle*, dans les grands bois les plus élevés.

Sédentaire. Niche mai.

(Enq. territ. 1885-86.)

Savoie. *Tarantaise* (Bailly, *loc. cit.*).

14. — Isère.

ARRONDISSEMENT DE GRENOBLE. *Auris*, coteaux et basses montagnes, lieux boisés, frais et humides; *Côte du Moulin*; *La Mare d'Isère* (ass. rare), bois fourrés; *Saint-Hugon* sur *La Chapelle-du-Bard* (commun), forêts épaisses; *Tréminis* (rare); *Vizille*, hautes futaies, lieux frais.

ARRONDISSEMENT DE SAINT-MARCELLIN. *La Rivière*; *Presles*.

Sédentaire. Niche juin.

(Enq. territ. 1882-86.)

Dauphiné (Bailly, cité par Dresser, *loc. cit.*); Crespon (2); Alpes du Dauphiné (commun) (Bouteille).

15. — Drôme.

ARRONDISSEMENT DE DIE. *Lus-la-Croix-Haute* (rare), hauts sommets; *Romeyer*, forêts; *Saint-Agnan*.

Sédentaire. Niche juin.

(Enq. territ. 1885-86.)


Crespon (*loc. cit.*) dit que les Gélinothtes sont rares dans la région du Gard et départements voisins; elles n'y apparaissent que par

(1) L'observateur, M. Duparc, dit (1885) que la Gélinothte a été presque complètement détruite dans la contrée par les Renards et les Martre

(2) J. Cr., *Ornith. du Gard et des pays circonvoisins*, 1840.

intervalles plus ou moins éloignés et seulement en automne ou en hiver. On en a vu beaucoup dans l'Hérault en 1839. On les trouve en outre sur les hautes montagnes des *Pyrénées*, de la *Provence*.

Alph. Gaillard (*loc. cit.*) indique les localités suivantes : Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées (rare). Quelquefois à Bordeaux (Dubalen); *Luchon*, *Saint-Béat* (Haute-Garonne ; Ariège (rare, Lacroix); Pyrénées-Orientales (rare, Lacroix).



C. — Distribution géographique du *Tetrastes bonasia*. (Les numéros des départements portés sur la carte correspondent à ceux du texte, pour cette espèce.)

Pyrénées-Orientales, de passage à l'époque des vendanges.

Nom local : *Grebul* en catalan (Companyo, *loc. cit.*).

Loire-Inférieure, accidentel ; on en a tué près de Nort, pendant le long et rude hiver de 1830 (Blandin (1)).

Landes et Basses-Pyrénées, rare, de passage accidentel. Musée de Bayonne (A. Granger, *loc. cit.*).

(1) Bl., *Catalogue des Oiseaux observés dans le départ. de la Loire-Inférieure*, 1864.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DES TÉTRAONIDÉS. 203

D

LAGOPUS MUTUS, Leach. (= *alpinus*, Brandt).

(*Lagopède alpin*, *Perdrix blanche ou des neiges*, *Jalabre*, *Tétras des neiges* ou *Plumigan*.)

1. — Haute-Savoie.

ARRONDISSEMENT DE THONON (ass. rare), en compagnies peu nombreuses dans les rochers.

ARRONDISSEMENT DE SAINT-JULIEN, hautes montagnes. *Vétraz-Monthoux*.

ARRONDISSEMENT D'ANNECY, hauts sommets rocailleux, à 1 750 mètres au moins.

Sédentaire. Niche de fin avril à mai. Nom local : *Albine* (Annecy, Vétraz) ou *Ardenne* (Vétraz).

(Enq. territ. 1885.)

2. — Savoie.

ARRONDISSEMENT D'ALBERTVILLE (ass. commun), hautes montagnes, pentes rocheuses et pied des glaciers.

ARRONDISSEMENT DE MOUTIERS. Mêmes localités.

Sédentaire.

(Enq. territ. 1885-86.)

Régions les plus élevées des Alpes (Bailly, *loc. cit.*).

3. — Isère.

ARRONDISSEMENT DE GRENOBLE (ass. commun), en troupes de quatre cinq au plus. *Auris*; *Saint-Hugon sur La Chapelle-du-Bard*; *Theys*; *Villard*; *Vizille*; de 1 500 à 2 500 mètres; très sauvage en été.

Sédentaire. Niche août. Nom local : *Jalabre* (Villard) ou *Gelabre* (Vizille).

(Enq. territ. 1885-86.)

Alpes du Dauphiné (Bouteille).

4. — Drôme.

ARRONDISSEMENT DE DIE. *Lus-la-Croix-Haute* (ass. rare); *Romeyer*, neiges et précipices.

Sédentaire : Nom local : *Zalabre* (Romeyer).

(Enq. territ. 1885-86.)

5. — Hautes-Alpes.

ARRONDISSEMENT DE BRIANÇON. *Aiguilles* (ass. commun), hauts sommets, ne descend jamais au-dessous de 2000 mètres et reste au-dessus des massifs forestiers; environs de *Briançon*.

ARRONDISSEMENT DE GAP. *Saint-Bonnet*, à partir de 2800 mètres; ne descend jamais.

Sédentaire. Niche juin-juillet. Nom local : *Jalabre* (Briançon).

6. — Basses-Alpes.

ARRONDISSEMENT DE BARCELONNETTE (très commun); *Les Saucières-Jaunières*.

Sédentaire. Niche juin. Nom local : *Jalabria*.

(Enq. territ. 1885-86.)

Collection du Muséum d'hist. nat. de Paris, quatre exempl. ♂ et ♀ tués à Sanières en 1851; une ♀ de Barcelonnette (abbé Coire, 1832).

7. — Alpes-Maritimes.

ARRONDISSEMENT DE NICE, sur les hautes montagnes, neiges; *Roquebillière*; *Saint-Martin*.

Sédentaire.

(Enq. territ. 1885.)

Rencontré par lord Lilford au *col de Tende* (Dresser, *loc. cit.*).

8. — Pyrénées-Orientales.

ARRONDISSEMENT DE PRADES, dans les parties hautes des montagnes, 2000 à 3000 mètres; *Les Angles*; *Bolquière*; *Formiguères*; *Fontpédrouze* (rare), pics les plus élevés; *Olette*, lieux solitaires et marécageux des hautes altitudes; *Osseja*; *Prades*; *Taurinya*; *Thues*.

Sédentaire. Niche juin. Nom local : *Perdiou* (Olette), ou *Perdiou blinco* (Prades).

(Enq. territ. 1885-86.)

Sédentaire sur les points les plus élevés et toujours près des neiges éternelles; très commun (Ad. Lacroix, *loc. cit.*).

Hautes régions du département, sédentaire, descend dans la vallée par les froids très rigoureux (L. Company, *loc. cit.*).

9. — Ariège.

ARRONDISSEMENT DE FOIX. *Château-Verdun*; *Gourbit* (commun); *Le Pla* (très commun); *Prayols* (tend à disparaître); *Siguer*, hautes montagnes.

ARRONDISSEMENT DE SAINT-GIRONS, hautes montagnes, par compagnies

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DES TÉTRAONIDES. 205

de quinze à vingt; *Castillon*; *Orgibet*; *Saint-Girons* (1 400 mètres); *Pic des Trois-Seigneurs* (2 199 mètres); *Seix*; *Sentein*; *Ustou* (1 500 à 2 800 mètres).

Sédentaire. Niche juillet. Nom local : *Carascle*.

(Enq. territ. 1885-86.)

Commun, sédentaire, près des neiges éternelles (Ad. Lacroix, *loc. cit.*).

10. — Haute-Garonne.

ARRONDISSEMENT DE SAINT-GAUDENS. *Bagnères-de-Luchon*, hautes montagnes au bord des glaciers.

Sédentaire.

(Enq. territ. 1885.)

Luc d'Oo, monts *Crabioulès*, à la limite des neiges éternelles; descend en hiver dans les régions moyennes; commun, niche régulièrement (Ad. Lacroix, *loc. cit.*).

11. — Hautes-Pyrénées.

ARRONDISSEMENT DE BAGNÈRES-DE-BIGORRE. *Aragnaouet* (commun).

ARRONDISSEMENT D'ARGELÈS. *Barèges*; *Cauterets*; *Viella*.

Sédentaire. Niche juin. Nom local : *Gariolo* (Aragnaouet).

(Enq. territ. 1885.)

Sédentaire sur les hautes montagnes, très commun (Ad. Lacroix, *loc. cit.*).

Collection Marmottan, au Muséum d'hist. nat. de Paris, cinq exempl. ♂ et ♀ de *Bagnères-de-Bigorre* (1883-88) et de la vallée de *Campan* (1870).

12. — Basses-Pyrénées.

ARRONDISSEMENT D'OLORON. *Bedous* (très rare), de 1 400 à 1 500 mètres; *Urdos*.

Sédentaire.

(Enq. territ. 1885.)

Collections du Muséum d'hist. nat. de Paris, un ♂ et une ♀ provenant de la contrée (cap. Loche, 1852).

Basses-Pyrénées, hauts sommets (Olphe Gaillard, *loc. cit.*).

Yonne. Environs d'*Auxerre*, un individu tué en 1861; accidentel, extrêmement rare (D^r Robe) (1).


Doubs, arr. de *Montbéliard*, hautes montagnes, très rare (Sahler).

1) D^r R., *Catalogue des Oiseaux de l'Yonne*, 1887.

Jura. *Le Reculet*, sur la *Dôle* et près des *Rousses* (le fr. *Ogérien*, *loc. cit.*).

Tarn, Aude. Très rare, de passage (Ad. Lacroix, *loc. cit.*).

Vosges, *Le Donon* ; accidentel (Sébastien Gérardin, *loc. cit.*).



D. — Distribution géographique du *Lagopus mutus*. (Les numéros des départements portés sur la carte correspondent à ceux du texte, pour cette espèce.)

Un individu au Musée d'Arcachon (Alb. Granger, *loc. cit.*).

Époque quaternaire : *Les Eyzies* (Dordogne) ; *La Madeleine* (Dordogne) ; *Massat* (Ariège) ; *Gourdan* (Haute-Garonne) ; *Lourdes* (Hautes-Pyrénées) ; *Salève* (Haute-Savoie) ; *Cavernes du Périgord*.

Pour clore ce travail sur la distribution des Tétrœonidés, mentionnons qu'un *Lagopède rouge* (*Lag. scoticus*, Lath.) a été abattu en 1871, en Seine-Inférieure, par un chasseur havrais (Lemetteil) (1).

(1) E. L., *Catalogue raisonné ou Hist. descr. et méth. des Oiseaux de la Seine-Inférieure*, 1874.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornis - Journal of the International Ornithological Committee.](#)

Jahr/Year: 1902 - 1904

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): De Claybrooke J.

Artikel/Article: [DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE EN FRANCE
DES TETRAONIDES 189-206](#)