

59. *PODICEPS AMERICANUS* Garnot.

Podiceps rollandi Tacz. (nec Quoy & Gaim.) Orn. du Pérou, iii. p. 494.

Puno: Un mâle très adulte et deux femelles adultes du 15 décembre 1895 et une femelle plus jeune du 23 mars 1896.

♂ ad. Al. $111\frac{1}{2}$, culm. $20\frac{1}{4}$, tars. 34 mm.

♀ ♀ ad. „ 108, $107\frac{1}{2}$, „ $16\frac{1}{2}$, 16, „ 35, $34\frac{1}{2}$ „

Ces oiseaux sont généralement un peu plus petits que ceux d'*Ingapirca* (lac Junin).

60. *CENTROPELMA MICROPTERUM* (Gould).

Puno: Trois oiseaux d'avril et juin 1896.

V.—ON A NEW SPECIES OF *ARBORICOLA*.

By R. BOWDLER SHARPE and CHARLES CHUBB.

A COLLECTION recently sent home by Mr. P. N. Graydon from the Lamag Estate in Sandakan, N.E. Borneo, contains an example of a species of *Arboricola* allied to *A. charltoni*, for which we propose the name

ARBORICOLA GRAYDONI, sp. n.

Arborophila charltoni Nicholson (nec Eyton), Ibis, 1883, p. 89 (Segilind River); Everett, List B. Borneo, p. 200 (1889); Sharpe, Ibis, 1890, p. 140 (Sandakan); Elliot, Auk, 1891, p. 15 (Sapagaya River).

Arboricola charltoni (part.) Grant, Cat. B. Brit. Mus. xxii. p. 221 (1893).

a. Ad. Lamag, Jan. 1902, "Lampikong." Bill black, tipped with yellow; feet deep red; iris yellow.

The bird which has hitherto been called *Arborophila charltoni* from Borneo seems to us to be a distinct species from the Malaccan bird. It differs from the true *A. charltoni* in its much darker coloration, in having the band across the lower throat deep maroon-chestnut instead of chestnut-rufous, the centre of the breast and flanks chestnut instead of pale cinnamon, and the ear-coverts of a lighter buff, almost whitish, instead of

cinnamon-buff. We have therefore had much pleasure in naming the species after Mr. Philip Graydon.

A complete account of the collection will appear in the next part of the 'Ornis.'

VI.—NOUVELLES OBSERVATIONS SUR LA FAUNE ORNITHOLOGIQUE DE BELGIQUE.

Par le Dr. ALPH. DUBOIS,

Conservateur au Musée royal d'histoire naturelle de Belgique.

CES observations forment un complément à celles qui ont été publiées précédemment dans l'*Ornis** et intéressent particulièrement la faune indigène.

Avant tout je dois signaler la capture d'une espèce qui n'a pas encore été observée en Belgique ; c'est celle d'un Gerfaut blanc (*Hierofalco candicans*), tiré à La Panne (côte de Flandre) dans le courant du moi de mai 1900. Cet oiseau est un mâle adulte et se trouve dans la collection de M. Lucien Maskens, à Bruxelles.

M. J. Sibille m'informe qu'un mâle de Pic noir (*Dryocopus martius*) a été pris à la tenderie (aux lacets) à Grand-Halleux au mois d'octobre 1904 ; un autre aurait été vu dans la forêt de Hertogenwald. M. J. Gerard-Filot m'écrivit qu'il a reçu pour sa collection une femelle du même Pic noir, tirée par un garde près de Sprimont le 30 octobre 1904.—Le *Dryocopus martius* a donc été observé cinq fois en Belgique de 1882 à 1904 †.

A Grand-Halleux on a pris également à la tenderie du mois d'octobre 1904, une femelle du Pic à tête cendrée (*Gecinus canus*), toujours rare et de passage accidentel dans notre pays (*J. Sibille*).

M. Marcel de Contreras, de Bruxelles, a eu l'occasion d'enrichir sa collection de quelques oiseaux fort rares, savoir :

1°. Une femelle de Grive pâle (*Turdus obscurus*), tuée à Bastogne en octobre 1899.

* Voy. *Ornis*, t. ix. (1897-98) p. 127.

† Voy. pour la première capture : *Bull. Soc. Zool. France*, **xxi**, p. 193.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornis - Journal of the International Ornithological Committee.](#)

Jahr/Year: 1904 - 1908

Band/Volume: [13](#)

Autor(en)/Author(s): Sharpe Richard Bowdler, Chubb Charles

Artikel/Article: [ON A NEW SPECIES OF ARBORICOLA. 133-134](#)