

Compte rendu  
des observations ornithologiques faites en Belgique  
pendant les années 1887 à 1889

publié sous la direction du

**Dr. Alphonse Dubois**

Conservateur au Musée royal d'histoire naturelle de Belgique.

M. C. O. I. P.

---

C'est Ad. Quetelet, l'éminent secrétaire perpétuel de notre Académie royale, qui fut le promoteur, en Belgique, des observations périodiques sur les règnes animal et végétal. En 1842, l'Académie publia les premières observations ayant rapport aux oiseaux indigènes, et en continua la publication jusqu'en 1874, époque de la mort de Quetelet.

A l'appel du Comité ornithologique international et permanent, diverses stations purent être rétablies, et en 1886 je pus faire paraître les travaux d'une douzaine de collaborateurs. Les observations de 1885 et de 1886 ont été publiés dans le Bulletin du Musée royal d'histoire naturelle de Belgique (tome IV, p. 177 et tome V, p. 99); mais j'ai pensé que l'Ornis étant spécialement créé pour ce genre de publications, c'est dans ce recueil qu'elles devaient trouver place.

Dans les pages qui vont suivre se trouvent réunies les observations de 1887 et de 1888, ainsi que quelques observations intéressantes faites pendant les premiers mois de 1889. Si je donne ces dernières avant que l'année ne soit écoulée, c'est que mes nombreuses occupations ne me permettent plus, à mon grand regret, de m'en occuper dans la suite.

Je continuerai cependant à fournir à l'Ornis tous les renseignements qui me seront adressés au sujet des espèces rares de notre pays, et j'espère que mes honorables collaborateurs voudront bien continuer à me les communiquer.

Parmi les espèces signalées, il s'en trouve quelques unes de fort rares et même nouvelles pour la Belgique. J'attire donc spécialement l'attention des ornithologistes sur les espèces suivantes dont il est fait mention plus loin: *Emberiza chrysophris*, Pall., *Melanocorypha tatarica*, Gm., *Cypselus melba*, Lin., *Aquila fasciata*, Vieill., *Actitis macularius*, Lin., *Querquedula formosa*, Georgi et *Diomedea exulans*, Lin.

Les centres qui ont été spécialement l'objet d'observations sont: 1<sup>o</sup>. les communes situées à l'Est, au Nord et au Nord-Ouest de Bruxelles, c'est-à-dire la forêt de Soignes et ses environs, Dieghem et Laeken; 2<sup>o</sup>. Carlsbourg (Luxembourg belge); 3<sup>o</sup>. Hasselt; 4<sup>o</sup>. Papignies (Hainaut); 5<sup>o</sup>. Tavier (Namur); 6<sup>o</sup>. la côte maritime et Anvers.

Nos collaborateurs sont:

Pour l'agglomération bruxelloise: MM. G. Vincent, aide-naturaliste au Musée royal d'histoire naturelle, A. Duvivier et Roels, préparateur au Musée. — Pour Anvers: M. A. Croegaert. — Pour Carlsbourg: MM. les frères Macédone et Athimus. — Pour Hasselt: M. E. Claes, avocat. — Pour Papignies: M. C. Fontaine. — Pour Tavier: M. F. Wautier.

Des observations isolées nous ont été adressées par MM. Ch. della Faille, Comte J. de Hemptinne, Baron Edm. de Selys-Longchamps, sénateur, Marquis de Wavrin, ainsi que par les chefs-gardes des phares, MM. F. Lützenrath, S. Pollet, Van Landtschoot et A. A. Vermorke.

Nous prions tous ces collaborateurs d'agréer nos sincères remerciements et nous espérons qu'ils voudront, bien continuer à nous tenir au courant des observations intéressantes qu'ils auront l'occasion de faire par la suite.

Pour le Comité ornithologique international et permanent

Le délégué

Bruxelles août 1889.

Dr. Alph. Dubois.

## Topographie des stations ornithologiques \*).

**Taviers.** Le village de Taviers sur Méhaigne, dont le territoire ou celui des communes voisines m'a fourni tous les sujets sur lesquels j'aurai l'avantage d'entretenir le lecteur, est situé à la pointe Nord de la province de Namur, et à une altitude de 160 à 165 mètres. Les communes de Noville et Ramillies (Brabant), de Bolinnes, Boneffe, Eghezée et Hanret qui nous environnent, présentent le même sol et se trouvent dans les mêmes conditions que Taviers: terrain riche, argileux, presque entièrement occupé par la culture des céréales et des betteraves à sucre. Ce terrain offre peu de ressources pour le séjour et la reproduction des oiseaux sylvains et pour tous ces hôtes ailés qui ne demandent en général que la tranquillité et les bons gîtes des forêts, des marais et de vastes terrains incultes. Dans toute la commune nous ne trouvons pas deux hectares de bosquets.

Seule la Méhaigne, qui traverse de l'Ouest à l'Est les villages de Noville, Bolinnes, Hanret, Taviers, Boneffe et Branchon, en fertilisant et inondant malheureusement trop souvent les prairies et les pâturages qui se trouvent sur ses bords, seule, dis-je, la Méhaigne offre dans les plantations de peupliers, de saules et d'aunes qui se trouvent en grand nombre sur ses bords, un abri aux oiseaux chanteurs, et dans ses pâturages humides des endroits favorables aux visiteurs aquatiques qui nous arrivent aux passages.

Quand on se trouve sur la chaussée romaine qui longe notre territoire sur la limite de la province de Brabant, on voit du côté Sud, à une distance de 2 à 3 lieues, les forêts des bords de la Meuse; du côté opposé, le versant de l'Escaut et les plaines du pays brabançon qui s'étendent aussi à l'Ouest; enfin, à l'Est, le riche territoire de la Hesbaye et les premières communes de la province de Liège.

F. Wautier.

---

\*) Pour la topographie des stations non décrites ici, voyez les comptes rendus précédents (Bullet. du Mus. roy. d'hist. nat. de Belg. t. IV et V).

**Papignies.** Papignies se trouve le long de la Dendre, canalisée depuis 1866, et à 8 kilomètres d'Ath. Le sol de notre commune est très fertile et offre beaucoup de prairies. On y cultive principalement le froment, le seigle, l'avoine, le trèfle, la pomme-de-terre, la betterave, le lin et la chicorée.

C. Fontaine.

## Observations ornithologiques (1887—1888).

1. *Loxia curvirostra*, Lin. — Bec-croisé ordinaire. — Kruisbek\*).

**Anvers.** Il a séjourné toute l'année (1889) dans nos environs et plusieurs couples ont niché. (Croegaert). — **Ronsele-lez-Gand.** Le 6 juillet 1888, j'ai vu une dizaine de ces oiseaux, et mon jardinier m'assura qu'ils étaient ici depuis avant l'hiver. J'ai pu m'en assurer depuis, et j'ai même trouvé un nid avec 4 jeunes le 19 février 1889. Depuis le 6 juillet 1888, je n'ai pas été une semaine sans voir des becs-croisés. (de Wavrin.) — Cette espèce est souvent assez abondante dans diverses parties du pays; en novembre et décembre 1888 une bande a séjourné dans les bois de sapins des environs de Nessonvaux (A. D.).

2. *Loxia pityopsittacus*, Bechst. — Bec-croisé perroquet. — Groote Kruisbek.

Deux mâles ont été tirés pendant l'hiver de 1887 à Forestles-Bruxelles; mâle et femelle ont également été tués la même année à Westerloo (prov. d'Anvers), mais je n'ai pu savoir la date exacte. Quoi qu'il en soit, ces captures sont à signaler,

\*) Je donne comme d'habitude les noms en latin, en français et en flamand.

car le *L. pityopsittacus* ne se montre en Belgique que très-accidentellement. (A. Dubois.)

2<sup>bis</sup>. *Loxia leucoptera*, var. *bifasciata*, Brm. — Bec-croisé bifascié. — Witbandige Kruisbek.

**Anvers.** C'est la première fois, à ma connaissance, que cet oiseau a paru dans nos environs. Il y en avait par petites bandes. La première capture a été faite le 8 juin 1889, et depuis lors jusqu'à la fin de l'année on a toujours remarqué de ces oiseaux dans les bois de sapins de Schooten et des environs. A plusieurs reprises on en a présenté de vivants au Marché. (Croegaert). Suivant M. de Selys-Longchamps, on en a pris la même année dans la province de Liège.\*)

3. *Pyrrhula europaea*, Vieill. — Bouvreuil vulgaire. — Goudvink.

**Carlsbourg** (Luxembourg belge). Disparaît complètement en hiver; était de retour le 5 mars. Il construit son nid sur des sapins et plusieurs ont été découverts. Deux entre autres : le premier, le 24 mai, contenait 4 oeufs qui ont été couvés en 15 jours, et les petits y restèrent pendant 16 jours; le second, le 29 du même mois renfermait 5 oeufs, couvés cette fois en 14 jours et les petits quittèrent leur nid 15 jours après (1887). Cet oiseau n'a pas été vu en 1888. Faut-il attribuer cette absence à la grande humidité de la saison estivale? (Macédone et Athimus). — **Papignies** (Hainaut). Très rare; un seul sujet mâle a été tué en juin 1875. (C. Fontaine.) — **Taviers** (prov. de Namur). Très rare en tout temps. (F. Wautier.)

4. *Fringilla coelebs*, Lin. — Pinson ordinaire. — Vink.

**Anvers.** Une variété couleur lie de vin a été prise dans nos environs le 20 octobre 1889. (Croegaert). —

\*) Pendant les mois de novembre et de décembre 1887, on voyait chez les marchands de volaille et sur les marchés de Bruxelles, des quantités de durs-becs (*Pinicola enucleator*), mais je ne pense pas qu'on en ait pris en Belgique; suivant les marchands, ces oiseaux provenaient de l'Allemagne et de Bohême. Si je signale le fait, c'est qu'il m'a paru intéressant, car jamais on n'a vu de ces oiseaux sur les marchés de Bruxelles. Ils doivent donc avoir été extraordinairement abondants dans certaines contrées de l'Europe centrale. (A. Dubois.)

**Blankenberghe** (phare). Commun, vu dès le 1<sup>er</sup> février jusque fin décembre 1887; observé durant presque toute l'année 1888. (Van Landtschoot.) — **Carlsbourg**. Dans les premiers jours du mois d'août 1887, l'un de nous vit au milieu d'une bande de pinsons un oiseau tout blanc, dont le cri ressemblait tout-à-fait à celui de cette espèce; il fut capturé vers le milieu du mois d'octobre et nous pûmes alors constater que c'était bien un pinson blanc. (Macédone et Athimus.) — **Hasselt**. Grand passage le 29 septembre 1887. (Claes.) — **Papignies**. Commun. (Fontaine.) — **Ronsele-lez-Gand**. Chantait dès le 9 mars 1888, le 29 mai une nichée quittait le nid. (de Wavrin.) — **Taviers**. Très commun, et en hiver de grandes bandes d'autres pinsons moins bons chanteurs et moins gros se montrent au pays. (Wautier.)

5. *Fringilla montifringilla*, Lin. — Pinson d'Ardenne. — Kweeker.

**Bruxelles-E**. Un grand nombre de ces oiseaux ont passé au bois de la Cambre tout l'hiver 1887/88 et ne sont partis qu'en avril. (G. Vincent.) — **Carlsbourg**. Une bande de plus de 200 partit le 28 février 1887; quelques uns revinrent pendant les froids et les neiges qui survinrent en mars. Le 12 novembre un était de retour. Le départ général eut lieu le 28 mars 1888 et une vingtaine nous revinrent dès le 22 octobre. Il est à remarquer qu'en hiver, lorsque le soleil se montre un peu plus ardent, cet oiseau nous quitte aussitôt, mais pour nous revenir lorsque le froid redouble. (Macédone et Athimus.) — **Papignies**. Rare. (Fontaine.) — Il était très abondant à Schaerbeek-lez-Bruxelles pendant l'hiver de 1887/88, on en voyait dans tous les jardins. Je n'en ai pas observé dans cette localité en 1888/89. (A. Dubois.) — **Taviers**. Il y a quelques années on les voyait en hiver en très grande quantité. Ils sont moins nombreux dans nos parages actuellement. (Wautier.)

5<sup>bis</sup>. *Serinus hortulanus*, Koch. — Serin cini. — Gele sijsje.

**Anvers**. Un beau mâle a été pris à Grobbendonck le 7 novembre 1889 et une femelle à Brasschaet le 15 novembre. (Croegaert.)

6. *Linaria cannabina*, Lin. — Linotte ordinaire. — Kneutje.

**Carlsbourg.** Nous quitte pendant la mauvaise saison et nous revient avec les beaux jours. Le 22 février 1887 une centaine faisaient leur réapparition. (Macédone et Athimus.) — Niche dans les montagnes boisées des bords de la Meuse et de l'Ourthe. (A. Dubois.) — **Hasselt.** Repasse le 4 mars 1887, passe le 3 octobre et en 1888, le 4 octobre. (Claes.) — **Papignies.** Rare en hiver. (Fontaine.) — **Taviers.** Ne doit pas nicher dans nos environs mais elle est commune lors du passage des béguinettes. (Wautier.)

7. *Aegiothus linarius*, Lin. — Sizerin boréal. — Vlasvink.

**Papignies.** Très rare; un seul sujet, mâle, capturé le 5 janvier 1881. (Fontaine.) — **Taviers.** Je n'ai pas distingué les variétés. On ne les prend pas d'ailleurs toutes les années, mais en grand nombre lorsqu'ils se montrent. (Wautier.)

8. *Chrysomitris spinus*, Lin. — Tarin ordinaire. — Sijsje.

**Anvers.** Plusieurs couples ont niché en 1889 à Brasschaet. (Croegaert). — **Carlsbourg.** L'un de nous a vu trois jeunes de cette espèce en juillet 1887 et une trentaine d'adultes le 18 du mois d'août, ce qui fait croire que cet oiseau niche parfois dans les Ardennes, bien qu'il ne paraisse pas tous les ans dans ce pays. Très rare en 1888; un jeune fut pris le 22 juillet dans notre jardin. (Macédone et Athimus.) — **Dieghem.** En 1887, de nombreux jeunes ont été observés durant tout l'été; dès l'automne ces oiseaux ont disparu, et pendant l'hiver c'est à peine si l'on en a aperçu quelques sujets. Le 5 mai 1888 j'ai encore pu observer un mâle et une femelle se becquetant, ce qui paraît indiquer que ce couple avait l'intention de nicher dans la localité, mais aucun nid n'a été découvert. (Duvivier.) — **Gand.** Le 28 juin 1887, j'ai vu une bande de six tarins à Bottelaere-lez-Gand, et revu la même bande pendant plusieurs semaines. Le 26 août on m'apporte un jeune mâle qui provient d'une nichée de six; j'interroge le garde, qui m'apprend que l'individu chez qui il s'est procuré mon oiseau en a pris au piège une quinzaine, mais n'a trouvé qu'un nid dont provient le mien. Ce nid, qui a été trouvé à Gavere-lez-Gand, était placé dans

un buisson à la lisière d'un petit bois et à un bon mètre de hauteur. (de Wavrin.) — En juillet 1887 il y a eu un grand passage de tarins dans la Flandre orientale; j'en ai observé 6 ou 7 à Tamise; à Osterzeele on en a pris 19, tous étaient des jeunes. (de Hemptinne.) — **Hasselt.** Ces oiseaux nous ont quittés le 3 avril 1887. (Claes.) — **Papignies.** Commun lors du passage d'automne. (Fontaine.) — **Taviers.** Passe en troupes pendant les mois de février, mars et avril, s'arrêtant sur les aunes qui bordent la Méhaigne. (Wautier.)

9. *Carduelis elegans*, Steph. — Chardonneret. — Distelvink.

**Carlsbourg.** Trois furent observés vers la fin de février 1887. Un couple arriva le premier mai et construisit son nid sur un sapin. La femelle mit beaucoup d'entrain à ce travail, tandis que le mâle va et vient sans paraître se soucier de ce que fait sa compagne. On n'en a pas vu un seul pendant l'année 1888. (Macédone et Athimus.) — **Papignies.** En général assez rare. (Fontaine.) — **Taviers.** Ne niche pas dans notre canton et ne s'y montre qu'accidentellement. Dans le temps, dit-on, on en voyait des bandes nombreuses à l'arrière saison et souvent ils établissaient leur nid sur les pruniers et les arbres de nos vergers. Je pense que l'on doit attribuer la disparition des chardonnerets au changement de culture; depuis une vingtaine d'années l'industrie sucrière a pris un grand développement et nous ne voyons plus des jachères, des folles herbes et des chardons en quantité suffisante pour attirer et retenir ces oiseaux dans nos parages. Peut-être aussi leur beau plumage et leur chant agréable ont-ils contribué à leur destruction. (Wautier.)

10. *Ligurinus chloris*, Briss. — Verdier ordinaire. — Groenling.

**Carlsbourg.** Cet oiseau nous quitte momentanément pendant les grands froids de l'hiver, pour nous revenir dès que le soleil reprend un peu de vigueur. Il abondait le 26 février 1887 et les jours suivants, mais une recrudescence de neige et de froid survenue en mars, l'obligea de s'éloigner jusqu'aux premiers jours d'avril. Plusieurs nids de cette espèce ont été découverts : un à la date du 28 avril, il contenait 3 oeufs et



le 1<sup>er</sup> mai il y en avait 5; l'incubation dura 15 jours et le 2 juin le nid était vide. (Macédone et Athimus.) — **Laeken-lez-Bruxelles.** Observé un passage le 17 avril 1887. (Roels.) — **Papignies.** Généralement commun. (Fontaine.) — **Taviers.** Assez commun. (Wautier.)

11. *Passer domesticus*, Briss. — Moineau domestique. — Huismusch.

Commun partout. — Un individu couleur isabelle fut tiré à Alken pendant l'été 1887. (Claes.) — Un sujet tout blanc s'est montré la même année à Taviers. (Wautier.)

12. *Passer montanus*, Briss. — Moineau friquet. — Boommsch.

Découvert à Dieghem en 1888 un nid contenant 17 oeufs! (Duvivier).

13. *Coccothraustes vulgaris*, Pall. — Gros-bec ordinaire. — Appelvink.

**Anvers.** Pris dans nos environs le 27 sept. 1889. (Croegaert.) — **Carlsbourg.** N'a été vu qu'une seule fois, le 2 mai 1887. — **Nieuport** (phare). Observé par bandes du 9 octobre 1887 au 13 novembre. (Vermorke.) — **Papignies.** Assez rare, mais niche dans la localité. (Fontaine.) — **Taviers.** Se prend quelquefois aux lacets, mais en petite quantité, quoique cependant il niche dans le canton. (Wautier.)

14. *Plectrophanes lapponicus*, Lin. — Plectrophane montain. — Ijsgors.

**Anvers.** Une femelle a été prise dans nos environs le 28 octobre 1889. (Croegaert.) — M. le Comte J. de Hempinne m'informe que plusieurs de ces oiseaux ont été tués en octobre 1887 près de Comblain-au-Pont (Liège); l'un d'eux que j'ai eu entre les mains était un jeune. (A. Dubois.) — Un mâle, faisant partie de ma collection, fut capturé près d'Alost le 19 octobre 1887. (Duvivier.)

15. *Plectrophanes nivalis*, Lin. — Plectrophane de neige. — Sneeuwgor.

**Ostende** (phare). Le 1<sup>er</sup> janvier 1887 j'ai observé une vingtaine de ces oiseaux et leur nombre n'a fait qu'augmenter; le 6 il y en avait bien 600; le 14 février les 20 derniers ont quitté nos parages. Ces oiseaux sont généralement communs en hiver. (Pollet.) — **Papignies**. On ne le voit que rarement en hiver. (Fontaine.)

16. *Miliaria europaea*, Swains. — Bruant proyer. — Graauwe gors.

**Papignies**. Rare; a niché ici en 1884. (Fontaine.)

17. *Emberiza citrinella*, Lin. — Bruant jaune. — Geelgor.

**Carlsbourg**. Ils nous restent en toutes saisons, hormis pendant les plus grands froids où ils se retirent, pensons-nous, dans les gorges de la Semois ou dans les plaines de Sedan et de Mézières. — Des observations de plusieurs années nous confirment dans l'opinion que la plupart des oiseaux, même sédentaires, quittent en tout ou en partie nos hauteurs ardennaises, lorsque survient une neige abondante et que la gelée forme au-dessus une croûte de glace. Les moineaux, les pinsons d'Ardenne, les roitelets, les troglodytes et les mésanges seuls nous restent. (Macédone.) — **Papignies**. Très commun dans la localité. (Fontaine.) — Entendu chanter pour la première fois à Bottelaere-lez-Gand le 7 mars 1888. (de Wavrin.) — **Taviers**. Commun dans les haies de nos vergers et nombreux dans les cours des fermes aux jours de neige. (Wautier.)

18. *Emberiza chrysophrys*, Pall. — Bruant à sourcils jaunes.

M. le Comte J. de Hemptinne m'a montré un oiseau de cette espèce qu'il a depuis longtemps dans sa collection sans être bien certain de sa détermination. Ce bruant a été pris au filet à Evergem-lez-Gand en octobre 1877. C'est donc une espèce à ajouter à notre faune, et comme c'est la première fois qu'elle a été prise en Belgique, j'ai cru devoir la signaler ici, bien que sa capture soit antérieure à 1887. (A. Dubois.)

19. *Emberiza cia*, Lin. — Bruant fou. — Grijsze gors.

Un de mes amis possède en volière un beau mâle adulte de cette rare espèce, acheté à un oiseleur qui l'avait capturé aux environs de Bruxelles au printemps de 1887, mais je n'ai pu savoir l'endroit exact. (A. Dubois.)

20. *Emberiza hortulana*, Lin. — Bruant ortolan. — Ortolaan.

**Carlsbourg.** A été vu une fois le 26 février 1887 à l'époque du passage. (Macédone et Athimus.) — **Hasselt.** De retour le 23 avril 1887 et le 22 avril 1888. (Claes.) — **Papignies.** On le voit rarement dans la localité. (Fontaine.) — **Taviers.** On en prend quelquefois aux passages. (Wautier.)

21. *Emberiza schoeniclus*, Lin. — Bruant des roseaux. — Rietgors.

**Papignies.** Assez rare. (Fontaine.) — **Taviers.** On l'observe au moment des passages. (Wautier.)

22. *Sturnus vulgaris*, Lin. — Etourneau commun. — Spreeuw.

**Blankenberghe** (phare). Grands passages de l'E. à l'O. le 10 octobre 1887. — Le 15 mars et 2 novembre 1888, passages nocturnes et 14 se tuent contre le feu du phare. (Van Landtschoot.) — **Carlsbourg.** Nichent dans les cavités des arbres et particulièrement des hêtres; sont abondants au printemps et en automne; ils s'éloignent pendant les froids rigoureux et les neiges persistantes. (Macédone et Athimus.) — **Knocke** (phare). Passage du 4 janvier au 29 mars et en octobre 1887, après 10 h. du soir, et plusieurs se tuent contre le feu du phare. Passages du 21 janvier au 24 mars 1888 entre 8 h.  $\frac{1}{2}$  du soir 3 h.  $\frac{1}{2}$  du matin, et du 2 au 26 novembre, toujours pendant la nuit. (Lützenrath.) — **Nieuport** (phare). Grands passages nocturnes en mars, en octobre et en novembre; plusieurs se tuent contre le feu. (Vermorke.) — **Ostende** (phare). Observé surtout en janvier, février, mars, avril et juin; il y en a qui nichent au fort Napoléon (1887). — Observé à peu près aux mêmes époques en 1888, mais ces oiseaux n'ont pas niché aux environs. (Pollet.) — **Papignies.** Très commun dans la localité. (Fontaine.) — **Taviers.** Niche

partout dans les arbres et dans les bâtiments et on en voit par milliers vers le mois d'octobre. (Wautier.)

23. *Corvus corax*, Lin. — Corbeau. — Raaf.

**Carlsbourg.** Observé de temps en temps un couple aux passages de 1887. (Macedone, Athimus.) — J'apprends qu'il a niché plusieurs années de suite à Hoboken-lez-Anvers. (A. Dubois.)

24. *Corvus corone*, Lin. — Corneille noire. — Kraai.

**Carlsbourg.** Très commune; niche dans nos bois; elles se réunissent en bandes nombreuses pendant l'hiver. (Macedone, Athimus.) — **Knocke** (phare). Observée communément pendant presque toute l'année, mais elle ne niche pas aux environs. (Lützenrath.) — **Ostende** (phare). Commune en hiver, du 11 octobre jusqu'au 15 mars. (Pollet.) — **Papignies.** Commune en hiver. (Fontaine.) — **Taviers.** Niche par paire dans les peupliers et bois blancs de la Méhaigne. (Wautier.)

25. *Corvus cinereus*, Briss. — Corneille mantelée. —  
Bonte Kraai.

**Anvers.** Le 16 décembre 1889 on a déniché au Biest près de Schooten, 4 jeunes à demi taille. Ils avaient les plumes encore en tuyaux. Le fait est d'autant plus étrange, qu'à ma connaissance l'espèce ne niche jamais en Belgique. (Croegaert.) — **Blankenberghe** (phare). Observée du 29 février 1887 au 13 avril 1888. (Van Landtschoot.) — **Carlsbourg.** Ne fut aperçue qu'une fois, le 10 mars 1888; ne séjourne pas chez nous. (Macedone, Athimus.) — **Hasselt.** Départ 9 avril; a séjourné dans le pays du 17 octobre 1887 au 12 avril 1888; revenue le 11 octobre. (Claes.) — **Knocke** (phare). Observée en grand nombre du 1<sup>er</sup> octobre 1887 jusqu'au 29 avril 1888; revenue le 10 octobre. (Lützenrath.) — **Ostende** (phare). Arrivée le 1<sup>er</sup> octobre 1887; vu le dernier individu le 9 mai 1888. (Pollet.) — **Papignies.** Commune en hiver. (Fontaine.) — **Taviers.** Les corneilles mantelées étaient dès les premiers jours d'octobre 1887 réunies en assez grand nombre aux choucas et aux freux; à cette époque nous avons eu quelques

jours de froid assez vif. Elles se retirèrent ensuite pour revenir de nouveau le 15 décembre quand la gelée reparut. (Wautier.)

26. *Corvus frugilegus*, Briss. — Corneille freux. — Roek.

**Carlsbourg.** Un individu a été tué le 10 mars 1888; nous n'avions pas encore observé cette espèce dans notre rayon d'observations. (Macedone, Athimus.) — **Nieuport** (phare). Observé du 5 octobre au 7 novembre 1887 se dirigeant de l'Est à l'Ouest. (Vermorke.) — **Ostende** (phare). Passages du 6 octobre au 30 novembre 1888. (Pollet.) — **Papignies**. Commun en hiver, rare en été. (Fontaine.) — **Taviers**. Les freux nichent en abondance dans le pays, principalement sur les arbres dépendant de l'ancienne abbaye de Bonneffe. Sur les peupliers de certaines drèves et des petits bois de cette commune, on voit des nids de freux par centaines. J'en ai vu jusque 18 et 20 sur le même arbre; à Taviers sur une rangée de 15 arbres il y eut 90 ou 92 nids! — Ces oiseaux font du bien à l'agriculture en détruisant surtout un grand nombre de vers blancs, ennemis de la betterave; mais le trop grand nombre de ces auxiliaires de l'agriculture ne laisse pas d'être préjudiciable, surtout pour les semailles tardives, aussi fait-on la guerre aux jeunes freux à l'époque où ils sortent du nid. (Wautier.)

27. *Coryus monedula*, Lin. — Choucas des clochers. —  
Kaauw.

**Carlsbourg.** Le 2 mai 1887, quatre petites bandes de 7 à 13 individus ont été vues se dirigeant vers le Nord. (Macedone, Athimus.) — **Ostende** (phare). Observé du 1<sup>er</sup> avril au 30 juin 1888; cet oiseau est en général peu commun et ne niche pas aux environs. (Pollet.) — **Papignies**. Très rare dans la localité. (Fontaine.) — **Ronsele-lez-Gand**. Le 17 mai 1888 une nichée de choucas quitte le nid. (de Wavrin.) — **Taviers**. Se réunit aux freux et aux corneilles mantelées en hiver, mais nous abandonne au printemps pour retourner aux rochers des bords de la Meuse. (Wautier.)

28. *Pica caudata*, Lin. — Pie ordinaire. — Ekster.

**Carlsbourg.** Rare; s'est montrée le 9 avril 1887. — **Papignies.** Commune. (Fontaine.) — **Taviers.** Très commune. (Wautier.)

29. *Nucifraga caryocatactes*, Lin. — Casse-noix. — Notenkraaker.

**Hasselt.** Un individu de la grande race fut tué le 13 novembre 1888 à Curange-lez-Hasselt; il était tout seul. (Claes.) — **Papignies.** A été observé de loin en loin. (Fontaine.) — **Taviers.** Quatre de ces oiseaux furent tués en 1867 ou 1868; on en a plus vu depuis. (Wautier.)

30. *Garrulus glandarius*, Lin. — Geai commun. — Vlaamsche gaai.

**Carlsbourg.** Se rencontre toute l'année; découvert un nid avec six oeufs le 2 juin 1887. Quand ils ont faim, ces oiseaux deviennent féroces; nous en avons vu en plein hiver s'approcher des habitations et tuer d'un violent coup de bec des pinsons et des moineaux afin de ravir leur proie. (Macédone, Athimus.) — **Papignies.** Assez commun en été. (Fontaine.) — **Taviers.** Niche très rarement ici, mais on le prend quelquefois aux lacets. (Wautier.)

31. *Oriolus galbula*, Lin. — Lorient jaune. — Wielewaal.

**Bottelaere-lez-Gand.** Le 7 mai 1888, entendu le lorient pour la première fois dans la saison. (de Wavrin.) — **Carlsbourg.** Entendu une fois seulement, le 1<sup>er</sup> mai 1887 (Macédone, Athimus). — **Hasselt.** Retour le 2 mai 1887; revenu le 3 mai 1888, départ le 19 août. (Claes.) — **Laeken-lez-Bruxelles.** Observé le 4 mai 1887. (Roels.) — **Papignies.** Assez commun en été. (Fontaine.) — **Taviers.** Assez commun. (Wautier.) — **Wareme.** Arrivée: 28 avril 1887 et 1<sup>er</sup> mai 1888. (de Selys-Longchamps.)

32. *Lanius excubitor*, Lin. — Pie-grièche grise. — Klapster.

**Anvers.** Observé dans nos environs le 28 janvier et 26 février 1889. (Croegaert). — **Carlsbourg.** Vu le 9 août

et le 27 septembre 1888. (Macédone, Athimus.) — **Papignies**. Assez rare, mais sédentaire. (Fontaine.) — **Taviers**. Rare et je n'ai jamais trouvé son nid. (Wautier.)

33. *Lanius excubitor*, var. *major*, Pall.

M. Croegaert m'informe qu'un *L. major* a été pris au commencement d'octobre 1888 à Deurne près d'Anvers; M. le Comte J. de Hemptinne en possède un sujet tué près de Gand en 1878. Les quelques captures faites en Belgique de cet oiseau, paraissent démontrer qu'il est moins rare dans notre pays qu'on ne l'a cru. (A. Dubois.)

34. *Lanius minor*, Gm. — Pie-grièche d'Italie. — Kleine Klaauwier.

**Mons**. M. Willain m'assure qu'elle est de passage régulier dans les environs de Mons et qu'elle n'est pas très rare. (Fontaine.) — Il est certain qu'on la prend quelquefois dans diverses parties du Hainaut, et qu'on la voit assez régulièrement près de Bernissart. (A. Dubois.)

35. *Lanius collurio*, Lin. — Pie-grièche écorcheur. — Graauwe Klaauwier.

**Carlsbourg**. S'est montrée la première fois le 7 mai 1887; un nid contenant cinq oeufs fut découvert le 8 juin, mais il disparut pendant l'incubation. Rare en 1888; elles abondaient dans les gorges de la Semois. (Macédone, Athimus.) — **Papignies**. Rare dans la région. (Fontaine.)

36. *Lanius rufus*, Briss. — Pie-grièche rousse. — Roodkoppige Klaauwier.

**Hasselt**. Arrivée le 29 avril 1888. (Claes.) — **Papignies**. Rare aux environs. (Fontaine.) — **Taviers**. Niche souvent sur nos arbres fruitiers d'où elle fait la guerre aux nichées de pinsons, leurs gais voisins. (Wautier.) — **Waremme** (Liège). Retour le 25 avril 1887 et le 21 avril 1888. (de Selys-Longchamps.)

37. *Parus major*, Lin. — Mésange charbonnière. — Koolmees.

**Carlsbourg.** Quelque rigoureux que soit l'hiver, cette espèce de mésange ne nous quitte jamais, non plus que ses voisines *ater*, *caeruleus* et *cristatus*. En compagnie de celles-ci, les charbonnières forment des colonies qui vont sans cesse dans nos bois, voltigeant d'une branche sur l'autre, becquetant sous la mousse et sous l'écorce souvent couvertes de givre. Rien ne peut les désunir. Un petit cri d'appel constamment répété les tient ensemble; elles paraissent si occupées qu'un coup de feu tiré au milieu du groupe ne parvient pas à les émouvoir. Dans des cachettes habilement préparées avec du gazon et de la mousse dans l'espace compris entre deux racines au pied des hêtres, le frère Athimus invite les charbonnières à y construire leur nid. Mon confrère m'affirme que ce moyen est infaillible. En effet, il m'en fit voir un qu'il avait ainsi aménagé, c'était le 9 mai; le nid contenait 9 oeufs et deux jours après, il s'en trouvait onze, les petits étaient éclos le 25 du même mois et abandonnèrent leur retraite improvisée 17 jours après l'éclosion. Trois autres couples de la même espèce ont répondu de cette manière à l'invitation faite par le frère Athimus. (Macédone.) — **Knocke** (phare). Observé le 18 novembre 1887 une unique charbonnière volant autour du phare. (Lützenrath.) — **Papignies.** Très commune. (Fontaine.) — **Taviers.** Cette mésange est commune, mais elle était bien plus abondante avant 1880. (Wautier.)

38. *Parus ater*, Lin. — Mésange noire. — Mastmees.

**Carlsbourg.** Les individus de cette espèce nichent dans des cavités naturelles ou qu'on leur fait dans les hêtres de nos forêts; divers nids ont été ainsi préparés. Les femelles pondent 8 ou 9 oeufs qu'elles couvent pendant une quinzaine de jours. L'un de nous a souvent remarqué que pendant l'incubation la femelle abandonne difficilement son nid alors même qu'on cherche à la faire partir. (Macédone, Athimus.) — **Taviers.** On la voit dès le mois de mars. (Wautier.)



39. *Parus caeruleus*, Lin. — Mésange bleue. — Pimpelmees.

**Carlsbourg.** Bien que moins abondante que les deux espèces précédentes, elle a cependant été vue toute l'année 1887. (Macédone, Athimus.) — **Papignies.** Assez commune. (Fontaine.) — **Taviers.** Commune. (Wautier.)

40. *Parus cristatus*, Lin. — Mésange huppée. — Kuifmees.

**Carlsbourg.** Plus rare encore que la mésange bleue. (Macédone, Athimus.)

41. *Parus palustris*, Lin. — Mésange nonnette. — Zwartkopmees.

**Carlsbourg.** Ne s'est montrée qu'une seule fois, le 20 février 1887. (Macédone, Athimus.) — **Knocke** (phare). N'a été vue qu'une fois, le 30 avril à 10 h. du soir par un vent S. assez fort, et venant de l'E. contre le feu du phare. (Lützenrath.) — **Papignies.** Assez commune. (Fontaine.) — **Taviers.** Rare, mais se voit quelquefois au passage de mars avec la mésange noire. (Wautier.)

42. *Acredula caudata*, Lin. — Mésange à longue queue. — Staartmees.

**Taviers.** On l'observe quelquefois mais rarement. (Waut.)

43. *Acredula caudata*, var. *longicauda*, Briss. (*rosea*, Blyth.)

**Carlsbourg.** On la rencontre parfois avec les autres mésanges, mais le plus souvent les couples se tiennent dans l'isolement, néanmoins le 27 février 1887, l'un de nous en vit une dizaine ensemble. (Macédone, Athimus.) — **Papignies.** Assez rare. Un nid de cette mésange observé en 1875 dans mon jardin à 2<sup>m</sup>, 30 d'élévation, avait deux ouvertures : l'une au nord par où elle entraît toujours, était plutôt un trou qu'une ouverture; l'autre au midi, celle-ci très-bien faite, par où elle sortait, je l'ai observé plus de trente fois. Lorsque les jeunes eurent quelques jours, l'ouverture au Nord fut fermée, mais d'une manière incomplète et, je crois, sans apporter de nouveaux matériaux. (Fontaine.) — **Taviers.** Commune. (Wautier.)

44. *Regulus cristatus*, Koch. — Roitelet huppé. — Goudhaantje.

**Carlsbourg.** Vu le 15 et le 20 février 1887, ainsi que deux couples le 4 mars. Il ne s'était pas montré l'année précédente. (Athimus, Macédone.) — **Papignies.** Assez rare. **Taviers.** Plutôt de passage, car ils sont rares et toujours isolés; je n'en ai jamais vu que quelques exemplaires. (Wautier.)

45. *Regulus ignicapillus*, Tem. — Roitelet tête de feu. —  
Vuur-goudhaantje.

**Carlsbourg.** Ce charmant petit oiseau se rencontre pendant toute l'année et partout où se trouve un petit massif de sapins. Plusieurs nids ont été observés sur ces arbres à des hauteurs qui varient entre 2 et 5 mètres. La femelle, qui paraît s'occuper seule du travail de la nidification, suspend son nid vers l'extrémité d'une branche de sapin, et lui donne une forme allongée de bas en haut, ainsi que l'a pu constater, comme nous, Mr. A. Dubois, à qui nous avons eu le plaisir d'adresser un de ces nids contenant dix petits, trouvé le 7 juin 1887. Quatre autres nids furent encore observés dont un en juillet, contenant 8 oeufs seulement, ce qui nous a fait supposer, vu l'époque avancée, qu'il pouvait bien être d'une seconde nichée. En général l'incubation dure douze jours, et les petits gardent la demeure maternelle 14 ou 15 jours. (Macédone, Athimus.) — **Papignies.** Assez rare. (Fontaine.) — **Taviers.** Rare et de passage accidentel. (Wautier.)

46. *Sylvia atricapilla*, Lin. — Fauvette à tête noire. —  
Zwartkop.

**Bottelaere-lez-Gand.** Vu le 4 et le 5 avril 1888 mâle et femelle de cette espèce, par un temps froid accompagné de neige. Ces pauvres petites fauvettes savaient à peine voler de froid ou de faim et j'en pris presque une à la main. (de Wavrin.) — **Bruxelles-Est.** Retour le 14 avril 1888. (G. Vincent.) — **Carlsbourg.** Très rare depuis plusieurs années; observé un individu le 13 août 1888. (Athimus, Macédone.) — **Hasselt.** Retour le 13 avril 1887; départ le 11 octobre 1888. (Claes.) — **Laeken-lez-Bruxelles.** Entendu chanter le 12 avril 1887; vu le 17 avril 1888. (Roels.)

— **Papignies**. Rare dans notre région. (Fontaine.) — **Taviers**. Cette fauvette a été très commune dans notre canton, mais comme conséquence de son beau chant elle n'a recueilli que la captivité et la destruction de ses nids dont on enlève les jeunes pour les élever en cage. (Wautier.) — **Waremmé**. Retour 5 avril 1887 et 16 avril 1888. (de Selys-Longchamps.)

47. *Sylvia hortensis*, Lin. — Fauvette des jardins. —  
Tuinfluiter.

**Carlsbourg**. Plusieurs nous revinrent le 5 mai 1887. Un nid, déjà commencé, fut découvert le 19 mai, et six jours après la femelle y avait déposé 5 oeufs qu'elle couva pendant 15 jours; les petits ne prirent leur vol que 16 jours après leur éclosion. A la date du 3 juillet, un autre nid fut trouvé, il renfermait 4 oeufs, le 17 les petits sont éclos... un dénicheur empêcha la suite de l'observation. Retour le 6 mai 1888. (Macédone, Athimus.) — **Hasselt**. Retour : 25 avril 1887 et 23 avril 1888. (Claes.) — **Papignies**. Commune. (Fontaine.) — **Taviers** Assez répandue. (Wautier.)

48. *Sylvia garrula*, Briss. (*curruca*, Lin.) — Fauvette baillarde. — Braamsluiper.

**Bruxelles-Est**. Arrivée: 15 avril 1887 et 20 avril 1888. (G. Vincent.) — **Dieghem** (Bruxelles-N.). Vue le 3 avril 1887. (Duvivier.) — **Hasselt**. Arrivée 17 avril 1888. (Claes.) — **Laeken-lez-Bruxelles**. Observée pour la première fois le 30 avril 1887 et le 26 avril 1888. (Roels.) — **Papignies**. Assez rare. C'est la fauvette qui perche le plus haut sur les arbres. (Fontaine.) — **Taviers**. Assez répandue. (Wautier.)

49. *Sylvia cinerea*, Briss. — Fauvette grisette. — Grasmusch.

**Bruxelles-Est**. Retour le 24 avril 1888. (G. Vincent.) — **Carlsbourg**. Nous est revenue le 3 mai 1887. Un nid contenant 4 oeufs fut découvert dans un buisson près d'un bois. A été revue du 6 mai au 28 septembre 1888. (Macédone, Athimus.) — **Dieghem** (Bruxelles-N.). Vue le 20 avril 1888. Très commune, niche partout dans les hautes

herbes des parties humides, dans les haies, dans les pois. etc. (Duvivier.) — **Hasselt.** Retour 27 avril 1887. (Claes.) — **Laeken.** Observée le 2 mai 1887 et le 26 avril 1888. (Roels.) — **Papignies.** Commune. (Fontaine.)

50. *Accentor modularis*, Lin. — Accenteur mouchet. —  
Bastaard-nachtegal.

**Bruxelles-Est.** Premier chant le 10 mars 1888. (G. Vincent.) — **Carlsbourg.** Arrivée le 5 mars 1887. Le 5 mai un nid est découvert sur une branche inférieure d'un sapin, il contient 5 oeufs: les petits éclosent le 17 du même mois, et le 28 ils prennent leur vol. Un autre nid, contenant également 5 petits, a été trouvé le 23 mai. (Macédone, Athimus.) — **Bottelaere-lez-Gand.** Le 24 mai 1888, une nichée d'accenteurs prend son vol. (de Wavrin.) — **Dieghem-lez-Bruxelles.** Sédentaire mais se rencontrant relativement peu. (Duvivier.) **Papignies.** Commun. (Fontaine.) — **Taviers.** Commun; niche dès le mois d'avril dans les fagots, ramilles et haies de la commune. Tous les hivers j'en prends qui s'introduisent dans des volières inoccupées. Je les nourris et leur rends la liberté aux premiers beaux jours. (Wautier.)

51. *Phylloscopus sibilatrix*, Bechst. — Pouillot siffleur. —  
Fluiter.

**Carlsbourg.** De retour dès le 11 avril 1887; le 23 mai un nid, contenant 6 oeufs, est trouvé sous la bruyère dans un bois. (Macédone). — **Papignies.** Très rare; je l'ai vu plusieurs fois mais sans avoir pu me le procurer. (Fontaine.)

52. *Phylloscopus trochilus*, Lin. — Pouillot fitis. — Fitis.

**Bruxelles-E.** Retour 15 avril 1888. (G. Vincent.) — **Carlsbourg.** Nous est revenu le 11 avril 1887, le même jour que son voisin le siffleur. Une femelle mit 13 jours à couvrir 6 oeufs et 15 à nourrir les petits, avant leur départ du nid maternel. (Macédone, Athimus.) — **Hasselt.** Retour 9 avril 1887 et 7 avril 1888. (Claes.) — **Papignies.** Rare, de même que le *Ph. rufus*. (Fontaine.)

53. *Phylloscopus rufus*, Bechst. — Pouillot véloce. — Tjif-tjaf.

**Bruxelles-E.** Retour le 8 avril 1888. (G. Vincent.) — **Carlsbourg.** Le 24 juin un nid fut trouvé dans un buisson assez près du sol; il contenait 6 oeufs dans un état d'incubation peu avancé, car les petits ne sortirent de l'oeuf que le 4 juillet; ils prirent leur vol le 18, soit 14 jours après leur éclosion. (Macédone, Athimus.) — **Hasselt.** Retour 5 avril 1887. (Claes.) — **Waremme.** Retour 14 mars 1887 et 18 mars 1888. (de Selys-Longchamps).

54. *Hypolais icterina*, Vieill. — Contrefaisant. — Spotvogel.

**Bruxelles-E.** Retour le 8 mai 1887 et le 5 mai 1888. (G. Vincent.) — **Carlsbourg.** Entendu le 16 mai 1887 dans un bosquet de notre jardin. Pendant plusieurs années, un oiseau de cette espèce faisait une apparition d'un jour ou seulement de quelques heures; cette année (1888) deux nous sont restés une grande partie du mois de mai. (Macédone, Athimus.) — **Dieghem-lez-Bruxelles.** Commun; niche à des hauteurs très variables dans les lilas, les oseraies, etc. (Duvivier.) — **Hasselt.** Retour 8 mai 1887 et 11 mai 1888. (Claes.) — **Laeken.** Retour 8 mai 1887 et le 20 mai 1888. (Roels.) — **Papignies.** Commun. (Fontaine.) — **Taviers.** Assez commun. (Wautier.) — **Waremme.** Retour le 5 mai 1887. (de Selys-Longchamps.)

55. *Acrocephalus aquaticus*, Gm. — Rousserolle aquatique. — Water rietzanger.

**Hasselt.** J'ai observé cet oiseau les 1<sup>er</sup> et 3 août et 29 septembre 1887. — **Papignies.** Rare, niche quelquefois dans notre région. Je l'ai observée en 1872, 1875, 1879 et 1883. (Fontaine.)

56. *Acrocephalus schænobænus*, Lin. (*phragmitis*, Bechst.) — Rousserolle phragmite. — Rietzanger.

**Anvers.** Un exemplaire a été tué dans nos environs le 5 mai 1889. (Croegaert.) — **Papignies.** Rare. (Fontaine.)

57. *Acrocephalus arundinaceus*, Briss., Lin. (*turdoïdes*, Mey.) —  
Rousserolle turdoïde. — Karekiet.

**Hasselt.** Le 23 juin 1887, pendant que je chassais aux odonates près d'un étang, mon attention fut attirée par le chant rude et strident de cet oiseau. Je me suis approché aussi près que possible et j'ai vu la rousserolle turdoïde sautiller dans les massettes (*Typha*). Vu la date et les allures de l'oiseau, j'ai été convaincu qu'il nichait dans cet endroit. (Claes.) — **Papignies.** Rare. (Fontaine.)

58. *Acrocephalus palustris*, Bechst. — Rousserolle de marais.  
— Bosch-Rietzanger.

**Dieghem.** Très commune en été et niche dans la commune. En 1887 j'observai encore cette espèce vers la fin de septembre. (Duvivier.) — **Hasselt.** Le 21 mai 1887 j'ai constaté le retour de plusieurs individus. Retour 17 mai 1888. (Claes.) — **Laeken.** Observée le 19 mai 1887. (Roels.) — **Papignies.** Commune. (Fontaine.) — **Waremmes.** Retour le 3 mai 1888. (de Selys-Longchamps.)

59. *Locustella naevia*, Briss. — Rousserolle tachetée. — Sprinkhaan-Rietzanger.

**Papignies.** Très rare; j'ai vu un mâle unique en août 1870. (Fontaine.)

60. *Turdus merula*, Lin. — Merle noir. — Zwarte lijster.

**Carlsbourg.** Du 27 février au 4 mars 1887, nous les entendîmes siffler dans nos jardins. Après cette dernière date, ils se turent pendant environ trois semaines, sans doute à cause du froid subit qui survint à cette époque. En été, on ne les retrouve que dans les bois. En 1888, deux seulement se sont montrés. (Macédone, Athimus.) — **Dieghem.** Sédentaire et abondant. En hiver j'ai toujours rencontré un grand nombre de mâles mais peu de femelles. Dans le courant de 1888 j'ai pu voir un nid avec 7 oeufs, qui bientôt donnèrent le jour à autant de petits bien robustes. En 1887 j'entendis siffler le merle dès les premiers jours de février. Cet oiseau est excessivement abondant à l'époque des passages. (Duvivier.)

— **Hasselt.** Chantait le 5 février 1887. — **Papignies.** Assez commun. (Fontaine.) — **Taviers.** Commun seulement aux passages; il a cependant niché à Taviers en 1886. (Wautier.)

61. *Turdus torquatus*, Lin. — Merle à plastron. — Beflijster.

**Dieghem.** De passage mais toujours rare; un mâle fut pris au lacet le 1<sup>er</sup> octobre 1887. (Duvivier.) — **Hasselt.** Cet oiseau passe ordinairement à l'automne par couples ou trois individus ensemble. En 1887, pour la première fois depuis douze ans, j'ai observé une bande composée d'une vingtaine de sujets; elle s'est arrêtée pendant deux ou trois jours dans le parc du château de Heullenrade. J'en ai tué plusieurs, ce qui probablement les a fait partir. (Claes.) — **Papignies.** Assez rare. (Fontaine.) — **Taviers.** De passage en octobre; on en prend toutes les années. (Wautier.)

62. *Turdus viscivorus*, Lin. — Grive draine. — Grootte lijster.

**Bruxelles-E.** Chantait au bois de la Cambre le 6 avril 1888. (G. Vincent.) — **Carlsbourg.** Nous les vîmes en troupes nombreuses à partir du commencement de mars jusqu'à la mi-avril 1887, époque où elles se dispersèrent pour s'apparier. Deux nids, contenant chacun 4 oeufs, furent observés sur de petits sapins à 1 m. 50 et à 2 m. de hauteur; l'incubation a duré 17 jours. (Macédone, Athimus.) — **Ostende.** Grands passages les 5, 6 et 7 janvier 1887. (Pollet.) — **Papignies.** Commune. (Fontaine.) — **Taviers.** Nous n'avons chez nous ni bois, ni gui, aussi ne prend-t-on cette grive que rarement aux lacets. J'en ai cependant pris deux le 20 novembre de l'année 1888. (Wautier.)

63. *Turdus pilaris*, Lin. — Grive litorne. — Kramsvogel.

**Bruxelles-E.** Arrivée le 8 novembre 1887. (G. Vincent.) — **Carlsbourg.** Du 13 février au 4 mars elle s'est montrée plusieurs fois, soit en groupe, soit isolément. — **Dieghem.** Le 9 janvier 1887, après une forte neige, de nombreuses bandes s'abattirent dans les jardins; les 16 et 23 janvier on put encore observer quelques individus, mais le temps s'étant alors amélioré on n'en vit plus. (Duvivier.) — **Hasselt.** Départ 16 avril

1887; retour 23 octobre, la masse le 5 novembre; départ 26 avril 1888; retour 8 novembre. — Les litornes ont été extrêmement rares en 1888, à peine si l'on en a observé quelques petites bandes. Cette rareté, qui s'est étendue à tous nos oiseaux d'hiver, doit certainement être attribuée à la saison très peu rigoureuse dont nous avons joui jusqu'au 31 décembre. (Claes.) — **Taviers**. Commune en mars jusqu'à la mi-avril sur les grands arbres des rives de la Mehaigne; elle est moins abondante en octobre-novembre. (Wautier.)

64. *Turdus iliacus*, Lin. — Grive mauvis. — Koperwiek.

**Bottelaere-lez-gand**. Le 8 Octobre 1887 je prends la première grive mauvis. (de Wavrin.) — **Dieghem**. De passage mais peu abondante. (Duvivier.) — **Hasselt**. Retour 11 octobre 1887, départ 16 Avril 1888. (Claes.) — **Papignies**. Commune aux passages. (Fontaine.) — **Taviers**. De passage en octobre par bandes nombreuses. (Wautier.)

65. *Turdus musicus*, Lin. — Grive chanteuse. — Zanglijster.

**Bottelaere-lez-Gand**. Le 11 août 1887 trouvé un nid avec jeunes; le 19 septembre premier passage en petite troupe; le 5 mars 1888 passage. (de Wavrin.) — **Bruxelles-E**. Pendant la nuit du 3 au 4 novembre 1887 passage; le 17 mars 1888 passage pendant la soirée. (G. Vincent.) — **Carlsbourg**. Entendu pendant les quelques beaux jours qui ont marqué la fin de février et le commencement de mars 1887. Vers le milieu d'avril elles se dispersèrent dans les bois. (Macédone, Athimus.) — **Dieghem**. Sédentaire et très commune aux passages. (Duvivier.) — **Hasselt**. Retour 26 février 1887; départ de la masse 29 avril 1888, retour le 11 septembre. (Claes.) — **Papignies**. Commune et sédentaire. (Fontaine.) — **Taviers**. Se prend en assez grande quantité à l'époque des passages et a niché par extraordinaire dans un petit bosquet à Harlue en 1887. (Wautier.)

66. *Erithacus rubecula*, Lin. — Rouge-gorge. — Roodborstje.

**Carlsbourg**. D'ordinaire cet oiseau nous reste toute l'année; il fit cependant une absence de près de deux mois



pendant l'hiver de 1886—87, apparemment à cause des neiges persistantes de cette saison. Il nous revint dans les premiers jours de mars. (Macédone, Athimus.) — **Dieghem.** Très commun pendant toute l'année, surtout en hiver. Dès la fin d'août, le rouge-gorge se rapproche des habitations et dès lors ne quitte plus les jardins jusqu'au mois d'avril, époque à laquelle il se retire dans les petits bois. (Duvivier.) — **Knocke** (phare). Observé quelquefois en novembre 1888 volant autour du phare. (Lützenrath.) — **Papignies.** Commun et sédentaire. (Fontaine.) — **Taviers.** Commun. (Wautier.)

67. *Erithacus luscinia*, Lin. — Rossignol. — Nachtegaal.

**Bottelaere-lez-Gand.** Le 20 avril 1888 le rossignol chantait. (de Wavrin.) — En mai 1887, un rossignol a fait son nid à une hauteur de 1<sup>m</sup> 50 dans un lierre qui tapissait un mur. (de Hemptinne.) — **Bruxelles.** Retour le 10 avril 1887 (Duvivier) et le 20 avril 1888. (G. Vincent.) — **Carlsbourg.** Assez commun dans les gorges de la Semois, mais s'aventure rarement sur nos hauteurs. En 1888, contrairement à ses habitudes, il a niché non loin des habitations dans un taillis de sapins bordant une route très fréquentée. Un autre couple, ou peut-être le même, s'est tenu dans notre jardin pendant une grande partie du mois de juillet. (Macédone, Athimus.) — **Hasselt.** Retour 13 avril 1887, départ 28 août; revenu le 18 avril 1888. (Claes.) — **Laeken.** Entendu le 20 avril 1887 et le 21 avril 1888. (Roels.) — **Papignies.** Assez rare. (Fontaine.) — **Taviers.** Quelques couples nichent ici chaque année. (Wautier.) — **Waremmé.** Retour 20 avril 1887 et 16 avril 1888. (de Selys-Longchamps.)

68. *Erithacus cyanecula*, Wolf. — Gorge-bleue. — Blaauwborstje.

**Bottelaere.** Observée le 12. avril 1888. (de Wavrin.) — **Hasselt.** Retour 9 avril 1887 et 2 avril 1888. (Claes.) — **Papignies.** Rare. J'en ai trois sujets dont aucun ne possède la tache blanche à la poitrine. (Fontaine.) — **Uccle-lez-Bruxelles.** Un individu a été pris le 4 mars 1887. (Duvivier.)

69. *Erithacus cærulecula*, Pall. (*suecica*, Lin. part.)

Un individu fut tiré à Genck (Limbourg belge) au printemps de 1887. (Claes.)

70. *Ruticilla phœnicura*, Lin. — Rouge-queue de muraille. — Gekraagde roodstartje.

**Carlsbourg.** Ne nous est revenu que le 20 avril 1887. Un nid fut trouvé le 26 mai, contenant 5 oeufs dans un état d'incubation déjà avancé; le 30 mai les petits éclosent et prennent leur vol le 15 juin. La masse émigra au commencement d'octobre, mais deux individus nous restèrent jusqu'au 25 du même mois. (Macédone, Athimus.) — **Dieghem.** Assez commun. En 1887 j'aperçus le premier mâle le 10 mars. En 1888 je ne pus observer cette espèce que dans les premiers jours d'avril. (Duvivier.) — **Papignies.** Commun pendant la saison. (Fontaine.) — **Taviers.** Assez commun. Niche souvent sur les têtes des vieux saules. (Wautier.) — **Waremme.** Retour 8 avril 1888. (de Selys-Longchamps.)

71. *Ruticilla titys*, Scop. — Rouge-queue titys. — Zwarte roodstart.

**Bruxelles-E.** Arrivée: 20 mars 1887; le 3 octobre vu pour la dernière fois. Retour le 7 avril 1888, mais la masse n'est revenue que le 13 et le 14 du même mois. (G. Vincent.) — Observé à Laeken jusqu'au 30 octobre 1888. (Roels.) — **Carlsbourg.** Séjournerent ici en petit nombre du 7 avril au 20 octobre 1887. En 1888 il ne revint que le 15 avril. (Macédone, Athimus.) — **Hasselt.** Retour 24 mars 1887, et le 30 mars 1888; vu pour la dernière fois le 2 octobre. (Claes.) — **Papignies.** Cette espèce a toujours été rare dans la localité; je ne l'ai plus revu depuis 1872. (Fontaine.) — **Taviers.** Assez abondant et fait entendre son chant très tôt au printemps. Cet oiseau est d'une familiarité étonnante; j'en ai trouvé deux nids dans des maisons en construction, et cela malgré les ouvriers encore occupés aux travaux de la charpente de ces maisons. (Wautier.) — **Waremme.** Arrivée: 4 avril 1887 et 7 avril 1888; ne niche pas à Longchamps (de Selys).

72. *Saxicola œnanthe*, Lin. — Motteux cendré. — Gewone tapuit.

**Bruxelles.** Passages les 23 août, 9, 22 et 23 septembre et 1<sup>er</sup> octobre 1887. Retour 2 avril 1888; le 26 avril il en passe encore. (G. Vincent.) — **Carlsbourg.** Observé dès le 9 avril; d'autres ont été vus en mai. En 1888 ils nous sont revenus avec le beau temps dès le 28 mars. (Macédone, Athimus.) — **Dieghem.** En 1887, j'ai pu observer cette espèce dès les premiers jours d'avril; elle apparut alors pendant quelques jours dans les jardins, puis alla s'établir dans les carrières de sable qui sont nombreuses à Dieghem. (Duvivier.) — **Hasselt.** Retour 13 avril, départ 6 octobre 1887; en 1888 le retour eut lieu le 31 mars. (Claes.) — **Papignies.** Assez commun en été. (Fontaine.) — **Taviers.** Assez-commun. (Wautier.)

73. *Pratincola rubetra*, Lin. — Traquet tarier. — Paapje.

**Bruxelles-E.** Départ le 8 septembre 1887; le 14 il en passe en grand nombre. (G. Vincent.) — **Carlsbourg.** Une dizaine d'individus furent aperçus le 1<sup>er</sup> mai 1887; ils furent de retour le 28 mars 1888. (Macédone, Athimus.) — **Dieghem.** Se montra dès les derniers jours de mars 1887. Cet oiseau est ici très commun et on en trouve de nombreux nids dans les prairies. (Duvivier.) — **Hasselt.** Départ 13 septembre 1887; retour 23 avril 1888. (Claes.) — **Papignies.** Commun en été. (Fontaine.) — **Taviers.** Commun dans nos prairies. (Wautier.) — **Wareme.** Retour 27 mars 1888. (de Selys-Longchamps.)

74. *Pratincola rubicola*, Lin. — Traquet rubicole. — Roodborst-tapuit.

**Anvers.** Passe l'hiver dans nos environs. (Croegaert.) — **Dieghem.** Commun en été; en 1887 j'ai vu le premier sujet, un mâle, le 7 mars; le 11 je pus observer de nombreux couples et quelques jours après ils devenaient abondants. En 1888 je ne vis cet oiseau pour la première fois que vers le milieu de mars. (Duvivier.) — **Hasselt.** Retour 1<sup>er</sup> mars 1887, la masse le 31 mars; retour 16 mars 1888. (Claes.) — **Papignies.** Rare en été; il passe ici les hivers peu rigoureux. (Fontaine.)

75. *Cinclus aquaticus*, Bechst. — Cincle d'eau. — Waterspreeuw.

**Dieghem.** Je l'ai observé plusieurs fois dans les roseaux qui bordent l'étang près de la station du chemin-de-fer, mais depuis deux ans je ne l'aperçois plus. (Duvivier.)

76. *Motacilla cinerea*, Briss. (*alba*, L.). — Hoche-queue gris. — Grijze Kwikstaart.

**Bottelaere-lez-Gand.** Chantait le 10 mars 1888. (de Wavrin.) — **Bruxelles-E.** Observé encore le 31 décembre 1887, par un temps très froid avec neige; le 21 janvier 1888, j'en vis sur la glace de l'étang d'Ixelles; le 2 février j'en vis sautiller sur la neige, par une température de nuit de  $-16^{\circ}$  centigr. Du 10 au 14 mars ces oiseaux nous revinrent en masse. (G. Vincent.) — **Carlsbourg.** N'ont pas hiverné chez nous pendant l'hiver de 1886—1887; ils nous sont revenus avec le soleil de mars, se sont mis en mouvement pour la nidification vers la mi-avril; des petits essayaient leurs ailes le 15 du mois de mai. (Macédone, Athimus.) — **Dieghem.** Cette espèce est sédentaire et très commune en été. Des quantités viennent se réfugier dans les roseaux de l'étang près de la gare, pour y passer la nuit en compagnie des hoche-queues jaunes, des étourneaux, etc. (Duvivier.) — **Papignies.** Très commun. (Fontaine.) — **Taviers.** Hiverné dans la commune ou s'en absente bien peu, car on l'y observe aux plus mauvais jours de l'hiver. (Wautier.) — Retour 1<sup>er</sup> mars 1887 et 2 mars 1888. (de Selys-Longchamps.)

77. *Motacilla cinerea*, var. *lugubris*, Tem. (*jarrellii*, Gould.)

**Taviers.** Je ne l'ai observée qu'une seule fois dans la commune. (Wautier.)

78. *Motacilla boarula*, Lin. — Hoche-queue boarule. — Groote gele Kwikstaart.

**Carlsbourg.** Moins rare en 1888 que les années précédentes. (Macédone, Athimus.) — **Dieghem.** Sédentaire mais peu abondant. (Duvivier.) — **Hasselt.** Vu deux individus en plumage de noce le 9 avril 1887, et j'ai tiré un mâle dans le même plumage le 5 avril 1888. (Claes.) — **Papignies.** Assez

rare et ne se montre qu'en automne; en 1889 cependant, j'en ai vu un le 2 janvier et le 15 février. (Fontaine.)

79. *Motacilla flava*, Lin. — Bergeronnette printanière. — Gele Kwikstaart.

**Carlsbourg.** De passage du 12 avril au 1<sup>er</sup> mai 1887. (Macédone, Athimus.) — **Hasselt.** Retour 3 avril 1887 et 14 avril 1888. — **Laeken.** Grand passage le 11 avril 1887. (Roels.) — **Ostende** (phare). Observé du 17 avril au 30 juin 1887 et du 2 avril à la fin de juin 1888. L'espèce est commune et niche aux environs. (Pollet.) — **Papignies.** Très commune en été. (Fontaine.) — **Taviers.** Niche ici en assez grand nombre. (Wautier.) — **Waremme.** Retour 5 avril 1888 (de Selys-Longchamps.)

80. *Anthus spinoletta*, Lin. — Pipit aquatique. — Waterpieper.

**Carlsbourg.** A été vu le 22 décembre 1887 dans une prairie. (Macédone, Athimus.) — **Hasselt.** Départ 13 avril 1887. (Claes.)

81. *Anthus spinoletta*, var. *obscurus*, Lath.

Un individu, en plumage de jeune ou d'hiver, a été pris au filet à Waremme le 8 octobre 1885. Je crois que l'*A. obscurus* n'est qu'une race de l'*A. spinoletta* ou *aquaticus*. (de Selys-Longchamps.)

82. *Anthus pratensis*, Briss. — Pipit des prés. — Graspieper.

**Bruxelles-E.** Passage le 10 septembre; passe en grand nombre le 1<sup>er</sup> octobre 1887. Commence à revenir le 12 mars 1888; passages les 15, 23 et 26 avril (G. Vincent.) — **Carlsbourg.** L'avant-garde nous arrive le 25 février 1887, et la masse le 2 mars. Le 19 mai nous trouvâmes un nid dans un champ de genêts; il contenait 4 oeufs; le 27 courant les petits sortirent de l'oeuf et quittèrent le nid 17 jours plus tard. (Macédone, Athimus.) — **Dieghem.** Très commun, au moment des passages surtout. (Duvivier.) — **Hasselt.** Retour le 24 février 1887. (Claes.) — **Laeken.** Grand passage le 16 avril 1887. (Roels.) — **Papignies.** Très commun en été,

de même que l'*A. arboreus*. (Fontaine). — **Taviers**. Passe en grand nombre dans tous nos environs pendant les mois de septembre et octobre. (Wautier.)

83. *Anthus cervinus*, Pall. — Pipit gorge-rouse. — Roskeelige graspieper.

Le 5 octobre 1885, un couple en plumage du jeune âge a été pris au filet à Waremme. Antérieurement un jeune avait été pris, également en octobre, dans l'année 1883 je pense. (de Selys-Longchamps). — Cet oiseau est peut-être moins rare dans notre pays qu'on ne le pense, mais comme son plumage d'hiver ressemble beaucoup à celui de l'*A. pratensis*, il doit passer le plus souvent inaperçu. (A. Dubois.)

84. *Anthus arboreus*, Briss. — Pipit des arbres. — Boompieper.

**Carlsbourg**. Il fit son apparition le 28 février 1887, en une bande de 10 à 12; le 19 mai un nid fut découvert dans un bois sous des myrtilliers; il contenait 4 oeufs, le 3 juin les petits en sortirent et ceux-ci prirent leur vol au bout de 17 jours. (Macédone, Athimus.) — **Hasselt**. Retour le 9 avril 1887 et le 15 avril 1888. (Claes.) — **Waremme**. Retour 10 Avril 1888. (de Selys-Longchamps.)

85. *Troglodytes parvulus*, Koch. — Troglodyte mignon. — Winterkoning.

**Carlsbourg**. Sédentaire. Deux nids furent observés en 1887: l'un était placé sous les herbes auprès d'un étang et contenait 7 petits; l'autre était dissimulé sous la mousse qui recouvrait l'écorce d'un hêtre; il ne contenait que 5 oeufs dans un état d'incubation très avancé. (Macédone, Athimus.) — **Dieghem**. Très commun. J'ai trouvé en 1887 un magnifique nid de forme sphérique, suspendu à l'extrémité d'une grosse branche de marronnier d'Inde et entièrement formé de feuilles de cet arbre. Dans le courant de 1888, je pus observer un fait assez curieux qui ne doit pas avoir été signalé souvent. Je trouvai à l'intercession de deux grosses branches d'acacia, un gros nid de troglodyte surmonté d'un nid d'*Accentor modularis*, les deux nids formant un tout parfaitement homogène, ce qui

semble indiquer que les deux nids ont dû être bâtis en même temps. Ce qui paraît confirmer ce fait, c'est que la ponte des deux oiseaux fut simultanée: je trouvai en même temps, au moment de découvrir les nids, trois oeufs de troglodyte et trois oeufs d'accenteur. Les nids furent malheureusement détruits par un chat, ce qui arrêta mon observation. (Duvivier). — **Papignies**. Commun et sédentaire. (Fontaine.) — **Taviers**. Commun et sédentaire. (Wautier.)

86. *Muscicapa nigra*, Briss. — Gobe-mouche noir. — Zwart-graauwe Vliegenvanger.

**Carlsbourg**. Très rare dans nos régions, vu une fois le 1<sup>er</sup> mai 1887 et le 29 avril 1888. (Macédone, Athimus.) — **Dieghem**. Observé deux sujets le 10 mai 1888. (Duvivier.) — **Hasselt**. Retour 5 mai 1887 et 30 avril 1888. (Claes.) — **Papignies**. Rare. (Fontaine.) — **Taviers**. Observé aux passages d'avril et d'octobre. (Wautier.) — **Waremmes**. Passe le 29 avril 1887 et séjourne quelque temps; retour le 24 avril 1888. (de Selys-Longchamps.)

87. *Muscicapa grisola*, Lin. — Gobe-mouche gris. — Graauwe Vliegenvanger.

**Bruxelles-E**. Revenu le 4 mai 1887. (G. Vincent.) — Observé le 6 mai de la même année à Laeken. (Roels.) — **Carlsbourg**. A été vu pour la première fois le 6 mai 1887; a dû nicher dans notre jardin, car le 1<sup>er</sup> juillet 4 petits furent rencontrés volant à peine. En 1888, un seul fut aperçu le 7 avril. (Macédone, Athimus.) — **Dieghem**. C'est un des oiseaux les plus communs; niche surtout dans les arbres en espaliers. (Duvivier.) — **Hasselt**. Retour 3 mai 1887. (Claes.) — **Papignies** et **Taviers**. Très commun dans nos espaliers. (Fontaine, Wautier.) — **Waremmes**. Retour 3 mai 1887. (de Selys-Longchamps.)

88. *Chelidon urbica*, Lin. — Hirondelle de fenêtre. — Huiszwaluw.

**Bruxelles-E**. Retour le 25 avril 1887 et le 22 avril 1888. (G. Vincent.) — **Carlsbourg**. Le retour d'une dizaine eut

lieu le 3 mai. Le départ s'est effectué sur la fin d'août, à l'exception d'un couple dont les 4 petits ne quittèrent le nid que le 1<sup>er</sup> septembre; quelques jours plus tard tous avaient disparu. Des retardataires se sont encore montrés le 21 septembre. En 1888, le retour de la masse eut lieu le 6 mai et le départ le 29 août. Des retardataires ont passé le 28 septembre et le 2 octobre. Le 17 septembre un nid détaché d'une fenêtre de la maison contenait encore des petits à peine couverts de leur duvet; la mère en avait pris soin jusqu'à ce jour, mais le lendemain de la catastrophe elle disparut. (Macédone, Athimus.) — **Hasselt**. Retour 26 avril 1887, départ 12 octobre; retour 23 avril 1888, départ le 4 octobre. (Claes.) — **Laeken**. Retour 27 avril 1887 et 21 avril 1888. (Roels.) — **Ostende**. Arrivée, 11 avril 1887; départ du 30 août au 29 septembre; arrivée, 15 avril 1888, départ 15 septembre. (Pollet.)

89. *Hirundo domestica*, Briss. — Hironnelle de cheminée. — Boerenzwaluw.

**Blankenberghe** (phare). Retour 15 avril 1888, départ 28 septembre. (Van Landtschoot.) — **Bottelaere-lez-Gand**. Vu la première le 11 avril 1888, puis le 15 et jours suivants. (de Wavrin.) — **Bruxelles-E**. Arrivée 8 avril 1887, départ 22 septembre; le 15 octobre plusieurs individus passent par un temps affreux, pluie et neige. En 1888 elles sont revenues les 14 et 15 avril. (G. Vincent.) — **Carlsbourg**. Dès le 20 avril 1887 on en voyait deux se dirigeant vers le Nord. Nous en revîmes le 29 avril et le 1<sup>er</sup> mai, mais la masse ne nous revint que le lendemain. Le départ général eut lieu le 3 ou le 4 septembre; quelques unes passèrent encore le 21 septembre et 10 octobre. Enfin le 27 octobre, alors que le sol était gelé et couvert de neige, on vit encore deux retardataires, dont le vol ralenti annonçait un certain engourdissement. En 1888, les deux premières nous revinrent le 15 avril. (Macédone, Athimus.) — **Hasselt**. Retour 30 mars 1887, départ 22 octobre; arrivée, 8 avril 1888, la masse le 15; départ 8 octobre. (Claes.) — **Laeken**. Arrivée 8 avril 1887, grand passage le 17; vu la première le 3 avril 1888, deux autres le 14 et plusieurs le 15. (Roels.) — **Ostende** (phare). Arrivée, 15 avril 1887, départ



23 septembre, dernier passage 20 octobre; retour 15 avril 1888, départ 11 octobre. (Pollet.) — **Waremmé**. Retour 11 avril 1887. (de Selys-Longchamps.)

90. *Cotyle riparia*, Lin. — Hirondelle de rivage. — Oeverzwaluw.

**Bruxelles-E.** La première a été vue le 6 avril 1887, la masse le 8 avril; retour général le 15 avril 1888. (G. Vincent.) — **Dieghem**. Niche en nombre considérable dans les carrières de sable de la localité. (Duvivier.) — **Hasselt**. Le 13 octobre 1887, à la tenderie aux alouettes, j'ai pris un individu au filet. C'est pour notre localité un oiseau de passage accidentel. (Claes.) — **Knocke** (phare). Observée de temps en temps volant autour du phare, depuis le 23 avril 1887 jusqu'au 29 septembre; grand passage le 15 avril 1888, vue de temps en temps jusqu'au 21 septembre. (Lützenrath.)

91. *Certhia familiaris*, Lin. — Grimpereau familier. — Boomkruipertje.

**Carlsbourg**. S'est montré le 3 et le 4 mars; le 9 avril un couple prenait ses dispositions pour nicher. (Athimus, Macédone.) — **Dieghem**. Très commun, surtout en hiver. (Duvivier.) — **Papignies** et **Taviers**. Commun. (Fontaine.) — Commun également à Taviers, où l'on a trouvé des nids de cette espèce dans le chaume du pignon d'une vieille maison. (Wautier.)

92. *Sitta caesia*, Mey. & W. — Sittelle torche-pot. — Boomklever.

**Carlsbourg**. Se rencontre à peu près toute l'année. Dès le 4 mars nous vîmes un couple occupé à chercher de la boue, dans le but de rétrécir l'ouverture de la cavité choisie pour y placer le nid. (Macédone, Athimus.) — **Dieghem**. Sédentaire, mais peu commun. (Duvivier.) — **Papignies**. Rare dans la région. (Fontaine.) — **Taviers**. Assez rare. (Wautier.)

93. *Alauda arvensis*, Lin. — Alouette des champs. — Leeuwerik.

**Blankenberghe.** Grand passage le 1<sup>er</sup> novembre 1888 du N.-E. au S.-O. Ces oiseaux se tuent souvent contre le feu du phare. (Van Landtschoot.) — **Bottelaere.** Passage le 5 mars 1888. (de Wavrin.) — **Bruxelles-E.** Départ le 7 octobre 1887, grand passage le 26; retour 3 janvier 1888; le 12 février plusieurs bandes repartent à cause d'une reprise de froid et de neige; 7 avril retour définitif, chante le 10. (G. Vincent.) — **Carlsbourg.** Etait de retour dès le 4 février 1887 et chantait le 15 par un beau soleil de midi. Ces alouettes chantaient le 14 et le 15 mars 1888, mais elles se sont retirées, avec la plupart des oiseaux chanteurs, pendant les grands froids survenus du 16 au 27 de ce mois. (Macédone, Athimus.) — **Hasselt.** Repasse par grandes bandes le 6 février 1887. (Claes.) — **Knocke** (phare). Une douzaine passent de l'O. à l'E. le 2 janvier 1887; ces oiseaux sont devenus abondants le 27 février; grands passages à partir du 4 octobre. Passages vers le 20 mars 1888; dernier passage le 15 novembre. (Lützenrath.) — **Nieuport** (phare). Passages du 7 octobre au 13 novembre 1887 par bandes de 200 à 300 individus; trois se jettent contre le feu du phare mais sans se tuer. (Vermorke.) — **Ostende** (phare). Passages du 1<sup>er</sup> au 5 janvier 1887 et jours suivants; passages par bandes nombreuses du 1<sup>er</sup> au 29 janvier 1888 et du 3 novembre au 31 décembre. (Pollet.)

94. *Alauda arborea*, Lin. — Alouette lulu. — Boomleeuwerik.

**Bruxelles-E.** Passage le 1<sup>er</sup> octobre 1887; le 26 ces oiseaux passent en troupes de 20 à 25 individus; le 20 mars 1888, par une neige abondante, on les voit courir dans les rues pour y chercher de la nourriture. (G. Vincent.) — **Dieghem.** Oiseau d'été, je ne l'ai jamais vu en hiver. (Duvivier.) — **Hasselt.** Repasse le 5 février 1887. (Claes.) — **Papignies.** Assez rare dans notre localité. (Fontaine.)

95. *Galerida cristata*, Lin. — Cochevis huppé. — Kuifleeuwerik.

**Dieghem.** Se voit en grand nombre en hiver dans les champs et sur les chaussées. On le dit sédentaire, mais je ne

l'ai jamais observé en été. (Duvivier.) — **Taviers.** Il était rare chez nous avant 1879. Depuis cette époque nous en voyons beaucoup, ils nichent dans nos champs, souvent à quelque distance des chemins. L'hiver ces oiseaux viennent dans les cours des fermes et fréquentent surtout les chaussées, où ils fouillent avec les bruants et les freux les déjections des chevaux et des bestiaux. (Wautier.)

96. *Melanocorypha tatarica*, Pall. — Calandre nègre. — Zwarte leeuwerik.

J'apprends qu'une dizaine de ces oiseaux ont été pris près d'Anvers par un tendeur, il y a quelques années. M. Ch. della Faille, qui m'a communiqué l'un de ces oiseaux en plumage d'été, n'a pu me dire l'époque exacte de ces captures, n'en ayant pas tenu note. Je rappellerai à ce sujet que feu mon père a déjà signalé une capture de cette espèce, faite vers la mi-mars 1850 près de Bruxelles, et que M. Croegaert père lui a assuré qu'un autre sujet avait été pris près d'Anvers en 1852. (A. Dubois.)

97. *Otocoris alpestris*, Lin. — Alouette alpine. — Bergleeuwerik.

Un mâle de cette espèce fut pris à Dilbeek-lez-Bruxelles le 5 novembre 1887 et fait partie de ma collection. (Duvivier.)

98. *Cypselus apus*, Lin. — Martinet noir. — Steenzwaluw.

**Bottelaere.** Vu le premier martinet le 14 mai 1888. (de Wavrin). — **Bruxelles.** Retour du 29 avril au 3 mai; départ à partir du 2 août, observé le dernier le 29 août 1887. — Retour 29 et 30 avril 1888. (G. Vincent.) — **Carlsbourg.** Un individu nous revint le 1<sup>er</sup> mai, le lendemain nous en vîmes une vingtaine; la masse partit le 1<sup>er</sup> août 1887, les retardataires nous ont quittés le 8. — En 1888, l'avant-garde est arrivée le 2 mai et la masse le 6; ils nous ont quittés le 28 juillet.

Le 3 août une vingtaine repassaient venant de l'intérieur du pays. (Macédone, Athimus.) — **Hasselt**. Retour le 2 mai 1887 et le 1<sup>er</sup> mai 1888. (Claes.) — **Laeken**. Observé à partir du 1<sup>er</sup> mai 1888. (Roels.) — **Ostende** (phare). Les premiers ont été vus le 5 mai 1887 et le dernier le 31 août. En 1888 ils sont revenus le 22 avril et le dernier a été vu le 28 août. (Pollet.) — **Taviers**. Ne niche pas ici, mais à l'époque du retour j'en ai vu fréquemment voler autour du clocher de notre église. (Wautier.)

99. *Cypselus melba*, Lin. — Martinet alpin. — Alpen-Steen-zwaluw.

Vers la fin du mois de septembre 1886, M. Jean Denis vit tournoyer autour de son château à Noville-sur-Mehaigne (Brabant), deux martinets plus grands et plus gris que ceux qu'il était habitué de voir dans son parc. Afin d'en connaître l'espèce, il en tua un et me le fit remettre vers le 2 ou 3 octobre. M. Denis croit se rappeler que ces oiseaux criaient comme le martinet commun, et il m'a dit que le second *Cypselus melba*, n'a disparu que plusieurs jours après la mort de son compagnon. (Wautier.) — M. Wautier a eu l'obligeance de m'envoyer cet oiseau et d'en faire don à notre Musée royal; j'ai pu ainsi m'assurer que c'était bien un *C. melba*. C'est la première fois que la présence de cette espèce a été signalée en Belgique. (A. Dubois.)

100. *Caprimulgus europaeus*, L. — Engoulevent vulgaire. — Dwaasvogel.

**Carlsbourg**. Doit être revenu à la fin d'avril 1887, car on en a vu le 1<sup>er</sup> et le 11 mai. En 1888 un individu de cette espèce s'est montré tous les soirs autour du village. (Macédone, Athimus.) — **Taviers**. On voit tous les étés des engoulevents couchés sur les grosses branches des arbres fruitiers de nos vergers. (Wautier.) — **Papignies**. Rare. (Fontaine.)

101. *Coracias garrula*, Lin. — Rollier commun. — Scharrelaar.

**Anvers.** Un rollier a été tiré à Brasschaet le 3 juin 1889. Ils étaient à deux. D'après M. J. Dewinter, qui a sa campagne à Brasschaet, des rolliers y auraient séjourné tout l'été, se tenant dans les plus grands arbres. (Croegaert.) —

**Taviers.** Ce rare et bel oiseau a été pris deux fois à ma connaissance dans notre région. Vers 1854, un individu, n'ayant pas encore le plumage d'adulte, fut tué sur la campagne de Taviers-Ramillies. C'était en plein été, car cet oiseau voltigeait autour des gerbes de froment qui étaient préparées pour la rentrée. En 1885, un autre rollier fut pris vivant au moulin de Branchon; on le mit dans une cage pour me l'apporter, mais le fond de sa prison étant en toile, son fort bec lui eut bientôt fourni le moyen de s'évader. (Wautier.)

102. *Upupa epops*, Lin. — Huppe vulgaire. — Hop.

**Bruxelles.** Vu le 3 août 1888 un individu sur le bâtiment du Musée. (Roels.) — **Carlsbourg.** Ne séjourne pas ici; un individu fut rencontré au passage le 4 avril 1888. (Macédone, Athimus.) — **Hasselt.** Retour le 18 avril 1887 et le 16 avril 1888. (Claes.) — **Papignies.** Rare dans la région. (Fontaine.) — **Taviers.** Se voit quelquefois, mais je n'avais jamais entendu parler de sa nidification au pays. Cet été (1888), mon frère trouva un nid dans un petit bois près de ses prairies. Une jeune huppe morte et tombée à terre lui fit découvrir la nichée, blottie entre le mur et le toit d'une maisonnette de garde inoccupée. Les deux jeunes, parfaitement emplumés, qui restaient au nid, me furent donnés et je les élevai sans difficulté. (Wautier.)

103. *Alcedo ispida*, Lin. — Martin-pêcheur. — Ijsvogel.

**Dieghem.** Sédentaire mais peu abondant. Se tient au bord des nombreux étangs de cette localité; en hiver, lorsque les étangs sont pris par les glaces, il se tient sur les bords de la Woluwe où il ne peut cependant guère trouver que quelques épinoches. (Duvivier.) — **Papignies.** Assez commun. (Fontaine.) — **Taviers.** Très commun; il niche dans des trous creusés dans les berges de la Méhaigne. (Wautier.)

104. *Cuculus canorus*, L. — Coucou ordinaire. — Koekoek.

**Blankenberghe** (phare). Observé le 9 et le 23 mai 1888. (Van Landtschoot.) — **Bottelaere-lez-Gand**. S'est fait entendre le 20 avril 1888, et le 3 mai un coucou est tombé dans un vieux lacet à grive de l'an passé. (de Wavrin.) — **Bruxelles**. Retour le 15 avril 1888. (G. Vincent.) — Observé à la même date à Dieghem. (Duvivier.) — **Carlsbourg**. Nous est revenu le 21 avril 1887 et le 18 avril 1888. Il s'en trouve plusieurs dans les bois des environs que nous parvenons à attirer jusque dans nos jardins, en imitant leur cri. (Macedone, Athimus.) — **Hasselt**. Retour le 23 avril 1887, départ le 14 septembre; en 1888 il est revenu le 22 avril et partit le 23 août. (Claes.) — **Ostende** (phare). Quelques individus ont été observés à partir du 8 mai 1887. (Pollet.) — **Papignies**. Assez rare. — On sait que c'est aux environs de Papignies, à Bois-de-Lessines, que fut pris le 22 octobre 1874 un mâle du *Coccyzus americanus*, L. (Fontaine.\*) — **Taviers**. On en entend tous les ans à partir du 22 ou 23 avril. Un jeune, trouvé dans le nid d'un accenteur mouchet, m'a été apporté pendant l'été de 1887. (Wautier.) — **Waremme**. Retour 29 avril 1887, 4 mai 1888. (de Selys-Longchamps.)

105. *Picus major*. — Pic épeiche. — Bonte specht.

**Carlsbourg**. Peu abondant; rencontré le 10 et le 15 mai 1887. (Macedone, Athimus.) — **Papignies**. Assez commun. (Fontaine.) — **Taviers**. Se voit assez rarement, mais doit nicher dans le pays, car en 1886 on m'en apporta un jeune pris dans un saule où il s'était réfugié. (Wautier.)

106. *Picus medius*, Lin. — Pic à tête rouge. — Middelste bonte specht.

Un individu fut tué à Deurne (Anvers) en 1888. (A. Dubois.)

---

\*) Voy. pour cette capture: A. Dubois, Bull. Acad. roy. de Belg. t. XXXIX, p. 40 (1875) et Faune ill. des Vertébrés de la Belg. t. I, p. 715, pl. 162.

107. *Picus minor*, Lin. — Pic épeichette. — Kleine bonte specht.

**Anvers.** Suivant un renseignement fourni par M. della Faille, ce pic aurait niché à Deurne en 1886 et 1887; un individu fut tué à Brasschaet en 1888. (A. Dubois.) Niche tous les ans à Deurne. (Croegaert.)

108. *Gecinus viridis*, Lin. — Pic vert. — Groene specht.

**Dieghem.** Sédentaire mais peu abondant. (Duvivier.) — **Papignies.** Assez commun dans la région. (Fontaine.) — **Taviers.** Commun et niche dans les troncs de nos vieux arbres. (Wautier.)

109. *Gecinus canus*, Gm. — Pic à tête cendrée. — Kleine groene specht.

Une femelle, faisant partie de ma collection, a été prise au lacet avec des grives à Grupont le 29 octobre 1888. (Duvivier.)

110. *Jynx torquilla*, Lin. — Torcol verticille. — Draaihals.

**Brasschaet** (Anvers). A niché dans cette localité en 1884, suivant M. Ch. della Faille. — **Taviers.** Rare et peu commun dans la commune. (Wautier.)

111. *Columba palumbus*, Briss. — Pigeon ramier. — Woudduif.

**Taviers.** Niche et hiverne au pays; quelquefois, pendant l'hiver, ces pigeons viennent attaquer les choux dans les potagers. (Wautier.)

112. *Peristera turtur*, Briss. — Tourterelle ordinaire. — Tortelduif.

**Bottelaere-lez-Gand.** Entendu le 8 mai 1887. (de Wavrin.) — **Bruxelles.** Retour le 3 mai 1887 (G. Vincent); le 19 mai trouvé un nid avec deux oeufs à Laeken. (Roels.) — **Carlsbourg.** Vu cinq tourterelles au passage du printemps de 1888; un couple a séjourné dans la localité. (Macédone, Athimus.) — **Dieghem.** Niche dans la localité mais n'est pas abondante. (Duvivier.) — **Hasselt.** Arrivée 1<sup>er</sup> mai, départ 17 septembre 1888. (Claes.) — **Taviers.** Assez com-

mune et nichant dans les bosquets et les haies de la localité. (Wautier.) — **Waremme**. Retour: 3 mai 1887 et 1<sup>er</sup> mai 1888. (de Selys-Longchamps.)

113. *Syrnhaptes paradoxus*, Pall. — Syrrhapte paradoxal. — Siberische zandhoen.

C'est le 11 mai 1888 que les premiers syrrhaptés firent leur apparition en Belgique. A cette date une volée d'une trentaine de ces oiseaux vint s'abattre sur le territoire de Braine-l'Alleud (à environ 5 lieues de Bruxelles), et deux femelles furent tuées par les fils du notaire Gouttier. Le préparateur chargé de les empailler, vint me les montrer un jour ou deux après pour en connaître le nom. J'ignore à quel point la bande observée à Braine-L'Alleud a été décimée, mais j'ai appris que six individus avaient encore été tués quelques jours plus tard, et, particularité à noter, tous étaient des femelles. Dans les premiers jours de juin de la même année, une troupe s'est abattue aux environs du camp de Brasschaet et un de ces oiseaux s'est cassé l'aile contre un fil du télégraphe. Vers le 15 mai, une troupe d'une quarantaine d'individus vint élire domicile dans les dunes d'Adinkerke (Flandre occid.). Le 19 février 1889, un mâle et deux femelles furent tués à Bouchout (Anvers). Bref, pendant ces deux années on en a pris un peu partout : dans le Limbourg belge, dans la Brabant, la province d'Anvers et surtout dans les dunes de la Flandre où ils ont peut-être niché. M. Michels m'assure que ces oiseaux ont niché à Lichtaert (Anvers). Comme ces oiseaux sont protégés en Belgique par la loi sur la chasse, il n'est pas impossible qu'ils s'acclimatent chez nous. Les syrrhaptés ont dû être fort nombreux, car l'hiver de 1888—89 on en voyait chez tous les marchands de volaille, et à la criée de Bruxelles on les vendait parfois à fr. 1,20 et 80 centimes la pièce. Je n'affirme cependant pas que tous ces oiseaux ont été pris dans le pays, car il nous arrive beaucoup de gibier de l'étranger\*). (A. Dubois.) —

\*) A titre de renseignement je puis ajouter que des syrrhaptés ont niché près d'Amsterdam (Hollande). J'ai vu deux oeufs qu'un marchand-naturaliste avait reçus de cette ville. (A. D.)



**Limbourg belge.** On a tiré quatre syrrhaptés à Lommel, dans un endroit boisé et tourbeux; trois ont été empaillés à Bruxelles, un à Anvers. Un autre sujet a été tué à Spaelbeek (environ 7 kilomètres ouest de Hasselt) et se trouve dans la collection de M. Cleeren. (Claes.) — J'ai vu des sujets tués à Esschen Campenhout et Braine-l'Alleud. (Duvivier).

114. *Phasianus colchicus*, Lin. — Faisan ordinaire. — Gewone faisant.

Ce bel oiseau niche dans les prairies et les bosquets de Tavers, venant des parcs voisins où il est abondant. Les faisans à collier et de Mongolie (croisés) ont également été introduits dans les parcs des environs. (Wautier.)

115. *Starna cinerea*, Briss. — Perdrix grise. — Veldhoen, Patrijs.

**Carlsbourg.** Le 3 juin 1887, vu un nid contenant 17 oeufs; il fut enlevé le lendemain par un dénicheur. (Macédone, Athimus.) — **Knocke** (phare). Observée de temps en temps aux environs du phare. (Lützenrath.) — **Tavers.** Assez abondante dans nos champs. Les vieux chasseurs de la localité disent qu'il y avait une autre variété de perdrix, plus petite, qui passait par bandes de 50 à 60 individus pendant le mois de septembre et d'octobre; depuis un certain nombre d'années on n'en voit plus. (Wautier.) — C'est de la var. *Damascena*, Briss. qu'il est ici question et que les chasseurs allemands désignent sous le nom de *Zughühner*. Ces oiseaux, qui paraissent habiter les contrées septentrionales, ne se montrent en Belgique qu'en hiver, mais pas régulièrement, et toujours par troupes nombreuses. (A. Dubois.)

116. *Coturnix communis*, Bonn. — Caille commune. — Kwartel.

**Bruxelles.** Arrivée 5 mai 1887. (G. Vincent.) — **Ostende** (phare). La première a été vue le 23 avril 1887. (Pollet.) — **Tavers.** Généralement commune en été. (Wautier.)

117. *Strix flammea*, Lin. — Effraie commune. — Kerkuil.

**Dieghem.** Peu commune. (Duvivier.) — **Papignies.** Commune et sédentaire. (Fontaine.) — **Tavers.** Commune

et niche dans notre clocher et dans les granges de nos fermes. (Wautier.)

118. *Athene noctua*, Scop. — Chevêche. — Steenuil.

**Dieghem.** Assez rare dans la localité. (Duvivier.) — **Ostende** (phare). Un individu a été vu dans les premiers jours de janvier 1888; cette espèce n'habite pas les environs. (Pollet.) — **Papignies** et **Taviers**. Commune et sédentaire. (Fontaine, Wautier.)

119. *Syrnium aluco*, Lin. — Hulotte. — Boschuil.

**Anvers.** Cette espèce, rare pour nos environs, a été capturée près d'Anvers le 28 novembre 1889. (Croegaert.) — **Carlsbourg.** Un couple s'est tenu toute l'année 1887 dans un bois de sapin près de Carlsbourg et y a niché. (Macédone, Athimus.)

120. *Bubo ignavus*, Forst. — Grand-duc. — Groote hoornuil.

Un individu a été tué dans notre jardin à Carlsbourg le 23 février 1888. (Macédone, Athimus.)

121. *Asio otus*, Lin. — Hibou moyen-duc. — Ransuil.

**Anvers.** Observé le 28 octobre 1889, et les 2 et 29 novembre. (Croegaert.) — **Ostende** (phare). Un individu a été vu volant près du phare le 1<sup>er</sup> et le 2 janvier 1888, et a été revu le 25 du même mois. (Pollet.) — **Papignies.** Assez rare dans la localité. (Fontaine.) — **Taviers.** N'est pas rare dans notre commune et y niche probablement. (Wautier.)

122. *Asio accipitrinus*, Pall. — Hibou brachyote. — Velduil.

**Papignies** et **Taviers.** Assez commun au passage. (Fontaine, Wautier.)

123. *Pandion haliaëtus*, Lin. — Balbuzard fluviatile. — Vischarend.

**Hasselt.** Un individu a été vu le 4 mars 1887. (Claes.) — **Papignies.** De passage très accidentel. (Fontaine.)

124. *Circus cyaneus*, Lin. — Busard St. Martin. — Blaauwe Kuikendief.

**Carlsbourg.** Un individu s'est montré le 5 mai 1887. M. de Vaux, juge de paix à Bouillon, nous en a adressé un tué à la chasse vers la fin de septembre. (Macédone, Athimus.) Un mâle a été tué à Jonhoven en automne 1887. (Claes.) — **Taviers.** Anciennement cet oiseau était commun, et l'on trouvait assez souvent dans les champs de blé des nids de busard St. Martin; mais depuis une quinzaine d'années on n'en voit plus. (Wautier.)

125. *Circus macrurus*, Gm. (*pallidus*, Syk.) — Busard pâle. Vale Kuikendief.

Une femelle a été tirée le 1<sup>er</sup> mai 1888 à Bouvechain près de Wavre. (Roels.) J'ai vu ce rare oiseau qui appartient bien à l'espèce indiquée. (A. Dubois.)

126. *Buteo vulgaris*, Leach. — Buse vulgaire. — Gewone buizerd.

**Carlsbourg.** Plusieurs nids ont été découverts, dont un le 16 mai 1887 contenant deux oeufs couvés en 22 jours. (Macédone, Athimus.) — **Dieghem.** A été très abondante pendant l'hiver de 1887, moins en 1888; elle est sédentaire. (Duvivier.) — **Laeken.** Observé un accouplement le 17 avril 1887. (Roels.) — **Taviers.** Commune au mois d'octobre, une partie hiverne. (Wautier.)

127. *Archibuteo lagopus*, Brün. — Archibuse pattue. — Ruigpootbuizerd.

**Dieghem.** Un mâle a été tué aux environs de cette commune le 10 octobre 1888. (Duvivier.) Le 19 mai 1888, un oiseau de cette espèce a été pris vivant à Waesmunster (Waes); je l'ai gardé en vie pendant tout l'été. (de Hempinne.)

128. *Aquila chrysaetos*, Linn. — Aigle doré. — Steen-Arend.

**Jette-lez-Bruxelles.** En novembre 1888 un aigle doré femelle a été tué dans la propriété de M. Edm. Morren. (de Hempinne.)

129. *Aquila fasciata*, Vieill. — Aigle Bonelli. — Bonelli-Arend.

Un jeune mâle de l'aigle Bonelli a été tué à Bornhem (prov. d'Anvers) le 23 mars 1889. M. Roels, qui fut chargé de la préparation de l'oiseau, m'informa de cette capture extraordinaire, et par son entremise je parvins à l'acquérir pour le Musée de l'Etat. C'est la seconde fois que l'aigle Bonelli a été tué en Belgique; la première capture a été faite à Fechereux-Esneux en septembre 1879. (A. Dubois.)

130. *Accipiter nisus*, Lin. — Epervier commun. — Sperwer.

**Ostende.** Observé de temps en temps près du phare. (Pollet.) En général commun dans tout le pays. (A. D.)

131. *Astur palumbarius*, Lin. — Autour épervier. — Havik.

Deux nids, contenant chacun 3 jeunes, ont été trouvés le 20 juin 1888 à Rhode-St-Genèse près de Bruxelles. (Roels.) — **Taviers.** Oiseau ne se montrant qu'accidentellement dans la commune. (Wautier.)

132. *Cerchneis tinnunculus*, Lin. — Cresserelle. — Krijter.

**Blankenberghe** (phare). Observé les 25 et 26 mars et le 29 avril 1888. (Van Landtschoot.) — **Dieghem.** Peu abondante. (Duvivier.) — **Papignies, Taviers.** Assez commune. (Fontaine, Wautier.)

133. *Falco aesalon*, Briss. — Faucon émerillon. — Smelleken.

**Dieghem.** Rare et ne se voit qu'en hiver. (Duvivier.) — **Papignies.** Très rare. (Fontaine.) — **Taviers.** On le prend quelquefois au filet battant quand il poursuit les alouettes et les béguinettes jusqu'au milieu des tenderies; j'en ai aussi pris aux lacets de grives. (Wautier.)

134. *Falco subbuteo*, Lin. — Faucon hobereau. — Baillet.

**Carlsbourg.** Le 22 septembre 1887, reçu un couple, tué par M. de Vaux dans les gorges de la Semois. (Macédone, Athimus.) — **Papignies.** Assez rare. (Fontaine.) — **Taviers.** Se prend quelquefois dans les mêmes conditions que l'émerillon. (Wautier.) — **Uccle-lez-Bruxelles.** Un mâle a été tué dans cette commune le 8 juillet 1888. (Roels.)

135. *Falco communis*, Gm. — Faucon pèlerin. — Slechtvalk.

**Hasselt.** De passage en automne. Un individu fut tué le 26 octobre 1888. (Claes.) — **Papignies.** Rare dans notre région. (Fontaine.) — **Taviers.** Vient quelquefois enlever les pigeons jusque dans les cours des fermes; on ne le voit heureusement que bien rarement. (Wautier.)

135<sup>bis</sup>. *Fernis apivorus*, Lin. — Bondrée apivore. —  
Wespendief.

**Anvers.** Un passage a été constaté dans nos environs au mois de septembre 1889. Deux individus furent tués les 14 et 21 du même mois. (Croegaert.)

136. *Milvus regalis*, Briss. — Milan royal. — Wouw.

**Carlsbourg.** Un seul fut remarqué en 1887, guettant des poules d'eau au-dessus d'un étang. (Macédone, Athimus.) — **Papignies.** De passage très accidentel. (Fontaine.) — **Taviers.** Observé au passage, mais je n'en ai jamais obtenu tué dans le canton. (Wautier.)

137. *Ardea cinerea*, Briss. — Héron cendré. — Blauwe reier.

**Blankenberghe** (phare). Vu de temps en temps à partir du 17 août 1887; quelques-uns passent au commencement de mai 1888. (Van Landtschoot). — **Dieghem.** Sédentaire et assez commun. (Duvivier.) — **Knocke** (phare). Observé le 15 et le 25 juin 1888. (Lützenrath.) — **Ostende** (phare). Trois ont été vus du 4 au 10 janvier 1887; le 15 avril passage d'une troupe d'environ 200 individus. (Pollet.) — **Taviers.** Très commun en octobre et novembre. (Wautier.)

137<sup>bis</sup>. *Ardea purpurascens*, Briss. — Héron pourpré. —  
Purper-reiger.

**Anvers.** Un jeune sujet fut tiré dans les polders le 11 août 1889. (Croegaert.)

138. *Ardetta minuta*, Lin. — Blongios. — Kleine puitoor.

**Anvers.** Observé le 12 août 1889. (Croegaert.) — **Dieghem.** Nichait il y a quelques années à Dieghem dans les

roseaux de l'étang situé près de la gare du chemin-de-fer; doit avoir disparu de la localité car je ne l'ai plus vu. (Duvivier.)

139. *Nycticorax griseus*, Briss. — Bihoreau gris. — Nachtreiger.

Le 8 novembre 1888, à 3 h. 45 m. du matin, un individu de cette espèce est venu se tuer contre le grillage à l'ouest de la lanterne du phare d'Ostende. (Pollet.)

140. *Ciconia alba*, Bechst. — Cigogne blanche. — Ooievaar.

**Anvers.** Le 18 avril 1889, un beau sujet fut tiré dans le polder de Zavyndrecht. (Croegaert.) — **Bruxelles-E.** Passage le 17 avril 1887 (G. Vincent, Roels); grands passages à Dieghem en mars 1888. (Duvivier.) — **Carlsbourg.** Deux passages de 3 et de 14 individus le 10 et le 11 mars 1888. (Macédone, Athimus.) — **Taviers.** On en voit presque chaque année dans nos champs, où on les tue comme tout ce qui y arrive d'extraordinaire. (Wautier.) — **Waremme.** Le 9 mars 1888, passage de cigognes. (de Selys-Longchamps.)

141. *Ciconia fusca*, Briss. — Cigogne brune. — Zwarte ooievaar.

J'en vis une à Taviers en 1885 ou 1886 dans notre propriété et elle fut tuée, je crois, dans les prairies de l'abbaye de Boneffe. (Wautier.)

142. *Grus communis*, Bechst. — Grue cendrée. — Kraan.

**Carlsbourg.** Plusieurs bandes ont passé vers la mi-octobre 1887. — **Laeken-les-Bruxelles.** Le 12 mars neuf grues passent. (Roels.) — **Taviers.** Passe en grandes troupes et presque toujours mêlées à des oies sauvages qui passent à la même saison. (Wautier.) — **Waremme.** Passage le 12 avril 1887 et le 9 octobre 1888. (de Selys-Longchamps.)

143. *Otis tarda*, Lin. — Outarde barbue. — Groote trap.

Entre le 25 et le 30 décembre 1887, une femelle de cette outarde a été tuée dans le parc du Baron Dons à Lovendegem-lez-Gand; elle m'a été remise en chair le 2 janvier 1888. (de

Wavrin.) — Le 19 novembre 1887, mon garde a vu une bande de quatorze outardes barbues dans les prairies de Thielrode près Tamise. Le même mois, le garde de M. le juge de paix de Tamise a tué une femelle à Stekene (Waes), et un chasseur en a tué une dans un bois près de Lokeren. (J. de Hemptinne.) — Un mâle fut tué près de Maeseyck en janvier 1888. (Claes.)

144. *Oedicnemus scolopax*, Gm. — Oedicnème criard. — Griel.

Un de ces rares échassiers fut tué entre Tavieres et Ramillies il y a quelques années; nous l'avons conservé. (Wautier.)

144<sup>bis</sup>. *Cursorius gallicus*, Gm. — Courvite gaulois.

Il y a quelques années on a tué en automne (septembre je peuse), un *Cursorius gallicus* à Othée, chez M. Pety de Thozée, gouverneur de la province de Liège, qui en a fait gracieusement don à M. le professeur Ed. van Beneden pour l'Université de Liège. (Edm. de Selys-Lonchamps.)

145. *Charadrius pluvialis*, Lin. — Pluvier doré. — Goud-plevier.

**Hasselt.** Cet oiseau ne s'arrête guère dans ma région; j'ai vu passer une bande le 8 janvier 1887. — **Ostende** (phare). Passages du 2 au 11 mai 1887; vu le dernier le 4 juin; observé en 1888 à partir du 15 avril jusqu'au 23 juin; un individu s'est tué contre le phare le 16 août. (Pollet.) — **Tavieres.** De passage. (Wautier.)

146. *Aegialites hiaticula*. Lin. — Pluvier à collier. — Bontbek plevier.

**Knocke** (phare). Observé des passages les 3 et 4 mai 1887 se dirigeant de l'O. à l'E. et du 9 août au 19 septembre suivant la même direction; vu en 1888 du 28 mai au 24 juin et du 26 octobre au 15 novembre. (Lützenrath.) — **Tavieres.** Un seul individu a été tué, à ma connaissance, dans nos environs. (Wautier.)

147. *Squatarola helvetica*, Lin. — Vanneau Suisse. — Zilverplevier.

**Ostende** (phare). Observé du 1<sup>er</sup> mai 1887 au 4 juin; du 15 avril au 28 mai 1888 et du 15 juillet au 15 novembre. (Pollet).

148. *Vanellus cristatus*, Lin. — Vanneau huppé. — Kievit.

**Anvers**. Une variété couleur chamois a été prise le 25 novembre 1889. (Croegaert.) — **Blankenberghe** (phare). Vu plusieurs le 3 avril 1887 et les 23 et 24 mars 1888; les derniers se dirigeaient par bandes du S. au N. (Van Landtschoot.) — **Carlsbourg**. Observé le 17 et le 18 mars 1887 seulement. Ne se voit jamais en été; mais par contre on le trouve tout l'hiver par bandes peu nombreuses dans tous les endroits marécageux. (Macédone, Athimus.) — **Dieghem**. Observé le 17 mars 1888; peu après des bandes assez nombreuses m'ont été signalées dans les environs. (Duvivier.) — **Knocke** (phare). Passages le 15 mars et du 17 septembre au 26 décembre 1887; du 15 avril au 24 juin 1888. (Lützenrath.) — **Ostende** (phare). Passages du 5 janvier au 3 avril 1887; en hiver, par temps de neige, ils passent quelquefois par bandes de 500 à 600 individus; quelques uns ont été vus du 3 novembre au 30 décembre 1888. (Pollet.) — **Taviers**. Très abondant au passage d'octobre. (Wautier.)

149. *Tringa canutus*, Briss. — Bécasseau maubèche. — Kanoet-strandlooper.

**Ostende** (phare). Passages du 14 avril au 12 mai 1887, les 3 derniers ont été vus le 1<sup>er</sup> juillet; observé du 11 avril 1888 jusqu'en juin, quelques uns encore jusqu'en juillet, puis en novembre. (Pollet.)

150. *Tringa cinclus*, Briss. — Bécasseau variable. — Bonte Strandlooper.

**Hasselt**. J'ai tiré un individu de la petite race (*schinzi*) le 26 mars 1887. (Claes.)



151. *Tringa minuta*, Leisl. — Bécasseau minule. — Kleine Strandlooper.

**Hasselt.** Le 3 avril 1888, on en offrait en vente un grand nombre au marché; ils avaient été tirés à Schuelen près Hasselt. (Claes.) — **Ostende** (phare). Passages du 4 janvier au 28 mars 1887; les 3 derniers ont été vus le 29 mai; quelques sujets ont encore été vus les 19 et 24 juillet, puis en décembre. Observé en 1888 du 10 janvier au 31 mai, puis de temps en temps en juillet et enfin en décembre. (Pollet.)

152. *Tringa temminckii*, Leisl. — Bécasseau de Temminck. — Kleinste Strandlooper.

**Knocke** (phare.)\*) Observé du 1<sup>er</sup> mars au 29 juin 1887, quelques uns ont encore été vus en juillet et août, puis en décembre; observé également du 2 janvier au 26 juin 1888, puis le 1<sup>er</sup> et le 5 juillet, enfin du 23 au 26 novembre. (Lützenrath.)

153. *Machetes pugnax*, Briss. — Combattant querelleur. — Kemphaan.

J'ai tué un individu près de Hasselt le 17 septembre 1887. (Claes.)

154. *Totanus fuscus*, Briss. — Chevalier brun. — Zwarte ruiter.

Vu trois sujets le 19 mai 1887 près de Carlsbourg. (Athimus, Macédone.)

155. *Totanus ochropus*, Lin. — Chevalier cul-blanc. — Witgatje.

**Knocke** (phare). Vu quelquefois en juin 1887. (Lützenrath.) — **Ostende** (phare). Observé en grand nombre du 2 janvier au 23 mai 1887, et quelques uns en juillet et en décembre. Vu en 1888 du 1<sup>er</sup> janvier au 31 mai, de temps en temps en juillet, puis en décembre. (Pollet.)

\*) La grande ressemblance qui existe entre les *T. minuta* et *temminckii* me fait supposer que les deux espèces ont été confondues par les observateurs des phares. (A. D.)

156. *Actitis hypoleucos*, Lin. — Guignette commune. — Oeverlooper.

**Bruxelles-Est.** Le 22 juillet 1888 premier passage. (G. Vincent.) — Le 24 et le 28 août, grands passages la nuit du côté de Laeken. (Roels.)

157. *Actitis macularia*, Lin. — Guignette grivelée.

Un sujet de cette espèce américaine a été tué à Brecht près d'Anvers il y a quelques années. Cet oiseau, qui est presque adulte, se trouve dans la collection de M. della Faille à Anvers, qui ne se rappelle malheureusement plus l'époque de la capture. Je rappellerai pour mémoire, que feu mon père a signalé la capture de trois jeunes oiseaux de cette espèce, tués aux environs de Bruxelles en mars 1847. (A. Dubois.)

158. *Gallinago gallinula*, Lin. — Bécassine Jacquet. — Doover.

**Carlsbourg.** Vu, en octobre 1887, une vingtaine au passage. Cette espèce reste dans nos marais presque tout l'hiver. mais elle disparaît pendant les fortes gelées. Elle ne paraît pas nicher ici. (Macédone, Athimus.) — **Hasselt.** Retour 17 septembre 1887 et le 10 septembre 1888. (Claes.) — **Ostende** (phare). Quelques unes ont été vues du 2 au 7 janvier 1887. (Pollet.) — **Taviers.** On en tue rarement dans notre région. J'en ai eu une vivante, pendant quelques semaines; elle s'était brisé l'aile contre les fils télégraphiques. (Wautier.)

159. *Gallinago caelestis*, Frenz. — Bécassine ordinaire. — Watersnip.

**Anvers.** Une variété isabelle fut tirée le 11 août 1889. (Croegaert.) — **Ostende** (phare). Commune du 4 au 7 janvier 1887. (Pollet.)

160. *Scolopax rusticola*, Lin. — Bécasse. — Houtsnip.

**Bottelaere-lez-Gand.** Le 20 octobre 1887 je vois la première bécasse. (de Wavrin.) — **Blankenberghe** (phare). Grand passage le 14 novembre 1887. (Van Landtschoot.) — **Hasselt.** Retour le 6 octobre 1887. — **Taviers.** Se montre toutes les années, mais en petit nombre. (Wautier.)

## Compte rendu des observations ornithologiques faites en Belgique. 337

161. *Numenius arquatus*, Lin. — Courlis cendré. — Groote Wulp.

**Bruxelles-Est.** Passe en grand nombre vers 1 h. du matin du 22 au 24 et du 26 au 27 mars 1887. (G. Vincent.) — **Knocke** (phare.) Passages du 18 août au 26 décembre 1887; deux ont été vus le 8 mai 1888; passages du 17 juillet au 2 novembre. (Lützenrath.) — **Ostende** (phare). Observé du 1<sup>er</sup> janvier au 5 juin 1887 et du 7 août au 26 décembre. (Pollet.)

162. *Numenius phaeopus*, Lin. — Courlis corlieu. — Regenwulp. Observé au phare d'Ostende du 17 avril au 27 mai 1888; puis en juillet et en novembre. (Pollet.)

162<sup>bis</sup>. *Recurvirostra avocetta*, Lin. — Avocette. — Kluit.

**Anvers.** Deux exemplaires furent pris dans nos environs les 5 avril et 20 juin 1889. (Croegaert.)

163. *Rallus aquaticus*, Briss. — Râle d'eau. — Waterral.

**Dieghem.** Se tient dans les roseaux bordant les étangs, mais peu abondant. (Duvivier.)

164. *Crex pratensis*, Bechst. — Râle de genêt. — Kwartelkoning.

**Dieghem.** Se rencontre mais peu souvent. (Duvivier.) — **Taviers.** Cet oiseau était assez répandu dans la région, mais maintenant il est devenu fort rare. (Wautier.)

165. *Porzana maruetta*, Leach. — Marouette tachetée. — Porceleinhoentje.

Le 16 août 1888, un individu s'est tué contre le phare de Knocke à 11 h. 30 m. du soir, par vent N.-E. assez fort. (Lützenrath.)

165<sup>bis</sup>. *Porzana parva*, Scop. — Marouette poussin. — Kleinste Waterhoen.

**Anvers.** Un jeune sujet fut pris le 5 août 1889. (Croegaert. — **Ostende** (phare). Le 12 avril 1887, à 9 h.  $\frac{3}{4}$

du soir, un individu est venu se tuer contre le filet en cuivre de la lanterne du phare. (Pollet.)

166. *Gallinula chloropus*, Lin. — Poule d'eau. — Waterhoentje.

**Carlsbourg.** Deux couples ont été vus sur un étang le 1<sup>er</sup> avril 1887. (Macédone, Athimus.) — **Dieghem.** Très commune. J'ai remarqué que lorsque les étangs sont entourés de grands arbres, particulièrement de mélèzes, les poules d'eau se cachent fréquemment entre les branches de ces arbres et paraissent même affectionner la cime, surtout en hiver. (Duvivier.) — **Taviers.** Assez abondante sur la Méhaigne et dans les fossés de nos prés. (Wautier.)

167. *Fulica atra*, Lin. — Foulque. — Meerkoet.

**Anvers.** Observée le 11 mars et le 8 Octobre 1889. (Croegaert.) — **Hasselt.** Observée aux environs de Hasselt à partir du 26 mars 1887. (Claes.)

168. *Anser cinereus*, M. & W. — Oie cendrée. — Wilde gans.

**Carlsbourg.** Le 21 février 1888, vu neuf oies de cette espèce se dirigeant vers le Sud. (Macédone, Athimus.) — **Knocke** (phare). Passages les 1<sup>er</sup> 13 et 22 janvier 1887, vue le 29 mars pour la dernière fois; passages du 18 août au 26 décembre. Passages principaux les 12, 19 et 23 janvier jusqu'au 29 avril 1888, et du 5 novembre au 23 décembre. (Lützenrath.) — **Ostende** (phare). Passages du 13 février au 24 mars 1887 et du 11 novembre au 26 décembre; en 1888 les passages ont duré du 11 janvier au 22 avril et du 2 novembre au 31 décembre. (Pollet.) — **Taviers.** Passent au-dessus de nos champs, mais descendent rarement à terre. (Wautier.)

169. *Cygnus musicus*, Bechst. — Cygne sauvage. — Wilde Zwaan.

**Carlsbourg.** Un sujet s'est montré le 26 décembre 1888; cette espèce n'avait pas encore été signalée dans notre région. (Macédone, Athimus.) — En décembre 1887 j'ai vu quatre cygnes sauvages, deux vieux et deux jeunes, dans les prairies de Tamise. (de Hemptinne.)

170. *Tadorna cornuta*, Gm. — Canard tadorne. — Bergeend.

Le 4 janvier 1887 une centaine de ces canards nageaient dans la mer près du phare de Knocke; vu ensuite le 15 janvier et le 15 mai, puis les 5 et 27 juillet, le 18 août et le 29 septembre, volant de l'Est à l'Ouest. En 1888 il a été vu du 12 novembre au 2 décembre. (Lützenrath.)

171. *Anas fera*, Briss. (*boschas*, Lin.) — Canard sauvage. — Wilde eend.

**Blankenberghe** (phare). Vu de temps en temps en janvier 1887 et en août; une dizaine le 23 juillet 1888. (Van Landtschoot.) — **Dieghem**. S'observe de temps en temps sur les étangs, surtout à l'époque des passages. (Duvivier.) — Le 31 mars passage vers le Nord. (Roels.) — **Knocke** (phare). Vu une troupe de 150 le 3 janvier, puis de temps en temps en mai, juin, juillet, septembre jusqu'au 31 décembre 1887; puis en janvier, février, avril, septembre jusqu'au 21 décembre 1888. (Lützenrath.) — **Ostende** (phare). Passages du 5 janvier au 15 avril 1887 et du 7 octobre au 26 décembre; puis du 1<sup>er</sup> janvier 1888 jusqu'au 6 mai et du 10 octobre au 18 décembre. (Pollet.) — **Taviers**. Ce canard passait chez nous sans s'arrêter. Depuis quelques années il niche en quantité sur nos vieux saules des rives de la Méhaigne. M. Zaman en a introduit dans le parc de son château de Wasseiges quelques couples éjointées, dont les jeunes a trois quarts sauvages se sont répandus dans le pays. (Wautier.)

172. *Chaulelasmus streperus*, Lin. — Canard ridenne. — Krakeend.

J'ai tiré un mâle le 24 mars 1887 près de Hasselt. C'est la première fois que cette espèce a été prise dans nos environs. (Claes.)

173. *Mareca fistularis*, Briss. — Canard siffleur. — Smient.

**Hasselt**. Retour 26 février 1887. (Claes.) — **Taviers**. De passage. (Wautier.)

174. *Querquedula circia*, Lin. — Sarcelle d'été — Zomertaling.  
Anvers. A été observée le 2 avril 1889. (Croegaert.)  
— Hasselt. Retour 26 mars 1887. (Claes.\*) — Tavier.  
De passage. (Wautier.)

175. *Querquedula crecca*, Lin. — Sarcelle d'hiver. — Wintertaling.  
Un individu s'est tué contre le grillage du phare d'Ostende,  
pendant la nuit du 12 novembre 1888, par un temps calme.  
(Pollet.) — Tavier. De passage. (Wautier.)

176. *Querquedula formosa*, Georgi. — Sarcelle formose.

Un mâle, presque adulte a été tué sur l'étang de La Hulpe (en Brabant) le 21 novembre 1888, par le garde de chasse de M. le chevalier de Bosschaert, et ce dernier eut l'amabilité de me l'envoyer aussitôt pour le Musée de Bruxelles. Cette capture est réellement extraordinaire, et ma première pensée a été que c'était un évadé du jardin zoologique d'Anvers. Mais, information prise, cet établissement ne possédait à cette époque aucun sujet de cette espèce. Du reste, après examen, il était facile de voir que cet oiseau n'avait pas vécu en captivité. On sait que plusieurs de ces sarcelles ont été prises en France vers la fin de novembre 1836 (voir, Degl. & Gerbe, Ornith. eur. t. II. p. 525). A. Dubois.

177. *Fuligula ferina*, Lin. — Morillon milouin. — Tafeleend.  
Anvers. Un mâle fut tué dans les polders le 22 mars 1889. (Croegaert.)

---

\*) Observation générale. — La passe d'automne de cette année (1887) a été presque insignifiante pour certaines espèces, telles que alouettes, grives, béguinettes. Je pense qu'il faut attribuer ce fait aux circonstances climatiques. De la fin de septembre à la fin d'octobre, véritable époque des passages, nous avons eu des brouillards, des pluies, des bourrasques perpétuels, en un mot, des temps défavorables à la passe des oiseaux. Vers la même époque, dans d'autres pays de l'Europe, en Autriche par exemple, le ciel était serein et le temps à la gelée. Les circonstances de climat étant données, les oiseaux migrateurs, doués d'un instinct si fin et si admirable, ne choisiraient-ils pas, suivant le temps, des routes différentes pour effectuer leur grand voyage bisannuel? (Edg. Claes.)

178. *Mergus albellus*, Lin. — Harle piette. — Nonnetje.

**Anvers.** Observé le 3 mars 1889. (Croegaert.)

179. *Phalacrocorax carbo*, Lin. — Cormoran ordinaire. — Aalscholver.

Deux sujets ont été tués le 27 mars 1889 à Tervueren-lez-Bruxelles; un autre a été tué vers la même époque près d'Ypres. (A. Dubois.)

180? *Larus glaucus*, Brünn. — Mouette bourgmestre. — Burgemeester.

**Knocke** (phare). Observée en plus ou moins grand nombre le 13 et le 15 février 1887, puis du 16 au 27 juin, le 2 et le 6 août et 1<sup>er</sup> décembre. Elle est généralement commune. (Lützenrath.) — Cette espèce a toujours été considérée comme étant de passage accidentel; il se pourrait donc bien qu'il y ait erreur de détermination. (A. Dubois.)

181. *Larus marinus*, Lin. — Mouette à manteau noir. — Mantelmeeuw.

**Blankenberghe** (phare). Observée de temps en temps pendant presque toute l'année. (Van Landtschoot.) — **Knocke** (phare). Observée communément en janvier, en avril, en juin, en septembre jusqu'au 4 novembre 1887; puis le 15 avril 1888, le 3 juillet et du 19 septembre au 24 novembre. (Lützenrath.) — **Ostende** (phare). Observée de temps en temps du 27 septembre au 17 octobre 1887; en 1888, cette mouette a été vue le 11 juillet; le 12 du même mois, 21 sujets se tenaient dans l'écluse Léopold vers 5 h. du soir; vue ensuite en novembre. (Pollet.) — En janvier 1888, une de ces mouettes, après avoir volé pendant tout un jour aux environs de Gand, a été trouvée morte le lendemain matin dans une propriété de Mariakerke-lez-Gand. Cet oiseau s'est égaré à cause d'une tourmente de neige et est probablement mort de faim. (de Hemptinne.)

182. *Larus fuscus*, Lin. — Mouette à pieds jaunes. — Kleine mantelmeeuw.

**Blankenberghe** (phare). Visible de temps en temps; ces mouettes, ainsi que les *Larus argentatus* et *ridibundus*, ont été vues par milliers pendant une quinzaine de jours, lors du passage des sardines. En 1888, visible surtout pendant les tempêtes. (Van Landtschoot.) — Observée en petit nombre en 1887 en juillet et en décembre. (Pollet.)

183. *Larus argentatus*, Brünn. — Mouette argentée. — Zilvermeeuw.

**Blankenberghe**. Observée à diverses époques dans le courant de 1887 et 1888, surtout pendant les tempêtes. (Van Landtschoot.) — **Knocke** (phare). Vue en assez grand nombre en juillet, août et octobre 1887 et 1888. (Lützenrath.) — **Ostende** (phare). Se montre surtout lors des grands vents et des tempêtes. (Pollet.)

184. *Larus canus*, Lin. — Mouette cendrée. — Kleine Zeemeeuw.

**Blankenberghe** (phare.) S'observe de temps en temps. (Van Landtschoot.) — **Haeren** (près Bruxelles). J'ai pu reconnaître quelques sujets de cette espèce accompagnant les nombreuses bandes de *L. ridibundus* pendant l'hiver de 1887/88. (Duvivier.) — **Knocke** (phare). Généralement commune. (Lützenrath.) — **Ostende** (phare). Généralement commune. (Pollet.)

185. *Larus ridibundus*, Lin. — Mouette rieuse. — Kapmeeuw.

**Blankenberghe, Knocke, Nieuport, Ostende** (phares). Très commune sur nos côtes. (Van Landtschoot, Lützenrath, Pollet.) — **Bruxelles-E.** Le 26 février 1888 une bande passe sur Etterbeek. (G. Vincent.) — **Dieghem**. Très nombreuses en hiver dans les champs après les mauvais temps. (Duvivier.) — **Laeken-lez-Bruxelles**. Observée tout l'hiver sur la Senne jusque vers le 11 avril. (Roels.)



186. *Larus minutus*, Pall. — Mouette pygmée. — Dwergmeeuw.

Un individu fut tué sur la côte de Blankenberghe le 2 novembre 1888. Cette espèce ne se montre sur nos côtes que très irrégulièrement. (A. Dubois.)

187. *Stercorarius crepidatus*, Banks. — Stercoraire des rochers. — Kleine jager.

**Anvers.** Un jeune sujet fut tiré sur l'Escaut devant la ville le 23 septembre 1889. (Croegaert.)

188. *Hydrochelidon nigra*, Briss. — Epouvantail. — Zwarte zeezwaluw.

S'est présenté une seule fois à ma connaissance dans l'arrondissement de Tavier. (Wautier.)

189. *Diomedea exulans*, Lin. — Albatros hurleur.

Le 27 avril 1887, à 8 h.  $\frac{1}{2}$  du matin, un albatros endormi sur une brise lame de la côte de Blankenberghe, fut tué à coups de bâton par un ouvrier du port. (Van Landschoot.) — J'ai écrit à M. Van Landschoot pour avoir quelques renseignements supplémentaires sur cette capture, et pour lui demander si le propriétaire ne serait pas disposé à céder cet oiseau au Musée de Bruxelles. J'appris alors que l'ouvrier qui avait tué cet albatros à coups de bâton, l'avait emporté chez lui et . . . mangé en famille, ne conservant que la tête. Mais, pour comble de malheur, quand le chef-garde du phare demanda à avoir cette tête, l'ouvrier constata qu'elle avait été enlevée par un chat ou par des rats. Toutes les personnes qui ont vu l'oiseau en question, sont d'accord pour dire qu'elles n'ont jamais aperçu sur nos côtes un oiseau marin d'aussi grande taille. Le garde amena alors au phare le mangeur d'albatros et lui montra un livre ornithologique à planches, en lui disant d'y chercher l'oiseau qu'il avait tué; l'ouvrier désigna sans hésiter l'albatros mouton du Cap. Un peu plus tard, ayant vu un autre homme, qui avait également vu l'oiseau, il lui demanda aussi de chercher l'animal dans l'ouvrage, et celui-ci désigna également l'albatros.

D'après ces renseignements, il me semble que le doute n'est pas possible, car l'albatros est trop caractéristique pour pouvoir être confondu avec un autre oiseau. — Je rappellerai pour mémoire que feu Drapiez a signalé la capture d'un albatros, tué à coups de rame près d'Anvers en septembre 1833. (A. Dubois.)

190. *Colymbus septentrionalis*, Lin. — Plongeon à gorge rousse. — Roodkelige zeeduiker.

Vu nageant sur la mer le 28 juillet 1887. (Lützenrath.)

191. *Uria troile*, Lin. — Guillemot à capuchon. — Zeekoet.

Plusieurs ont été tués à Ostende le 8 janvier 1889. (A. Dubois.) — Un individu a été tué sur l'Escaut près d'Anvers le 15 février de la même année. (Roels.)

192. *Podiceps auritus*, Lin. — Grèbe oreillard. — Geoorde fuut.

**Anvers.** C'est la première fois que j'ai à faire constater la capture de cet oiseau à l'état adulte dans nos environs. Je n'en ai jamais eu en chair que des jeunes. Des individus adultes ont été capturés les 10 et 20 juin et 19 août 1889. Je dois supposer qu'au printemps il y ait eu un passage de ces oiseaux dont plusieurs couples ont niché. (Croegaert.) — Un grèbe adulte de cette espèce a été tué le 11 avril 1889 sur l'Escaut près d'Anvers. (Roels.)

193. *Podiceps grisegena*, Bodd. — Grèbe jougris. — Roodhalsfuut.

**Anvers.** Cet oiseau a été pris dans nos environs les 21 et 23 juin et 25 octobre 1889. (Croegaert.)

194. *Podiceps fluviatilis* (Briss.) — Grèbe castagneux. — Dodaars.

Un sujet fut tué sur la Senne à Haeren en janvier 1889. (Duvivier.) — Il est assez rare à Tavers. (Wautier.) — En hiver il est très commun sur l'Escaut.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornis - Journal of the International Ornithological Committee.](#)

Jahr/Year: 1890

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Dubois Alfons

Artikel/Article: [Compte rendu des observations ornithologiques faites en Belgique pendant les années 1887 à 1889 287-344](#)