

OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES

PAR

M. CH. VAN KEMPEN

Pendant les journées sombres et froides du mois de juin 1898, j'étais surpris de ne plus apercevoir de Martinets ni d'Hirondelles voltiger au-dessus de la ville de Saint-Omer, et je me demandais si ces pauvres Oiseaux, trompés par la température, ne s'étaient pas crus au mois d'octobre et n'avaient pas pris leur vol vers des régions plus favorisées. M'étant rendu dans la forêt de Clairmarais, située à $\frac{1}{2}$ kilomètres de la ville, où je vais le plus souvent possible afin d'étudier les mœurs des Oiseaux, j'y trouvai les clairières, les chemins sillonnés de toutes parts par de très nombreuses Hirondelles et des quantités de Martinets qui, à l'abri du vent du Nord, attrapaient les nombreux Insectes qu'ils rencontraient au-dessus des herbes.

La Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla* Scop.) est, parmi les Fauvettes, l'espèce qui chante le plus tard. Vers la fin du mois d'août ses modulations si harmonieuses s'entendent encore, mais ce chant devient de moins en moins net et clair : la voix de l'oiseau semble enrouée, dès juillet, et vers la fin du mois d'août, et au commencement de septembre, on ne perçoit plus qu'un gazouillement.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornis - Journal of the International Ornithological Committee.](#)

Jahr/Year: 1897

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Kempen M. Ch. van

Artikel/Article: [OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES 32](#)