Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

NOUVELLES OBSERVATIONS

SUR LA

FAUNE ORNITHOLOGIQUE DE BELGIQUE

PAR

M. LE Dr ALPH. DUBOIS

Conservateur au Musée royal d'histoire naturelle de Belgique.

Lors de l'Exposition internationale de Bruxelles de 1897, l'administration des Eaux et Forêts exposait, dans sa section de Tervueren, des collections d'oiseaux de Belgique appartenant à divers amateurs. J'ai remarqué, parmi ces oiseaux, quelques espèces très rares ou même nouvelles pour le pays, que je crois devoir signaler. Je profiterai de l'occasion pour mentionner encore d'autres captures faites dans ces dernières années, et non moins intéressantes au point de vue de la distribution géographique. Dans mon grand ouvrage sur les oiseaux indigènes (1), j'ai décrit et figuré 338 espèces ayant toutes été capturées en Belgique. En 1896, j'en ai encore signalé deux nouvelles : le Harfang (*Nyctea scandiaca*, Lin.), tué, le 1er mai de cette année, entre Adinkerke et La Panne, et le Pic noir (*Dryocopus martius*, Lin.), capturé dans la forêt d'Herbeumont, le 23 novembre 1882 (2). — En 1897, j'ai fait mention d'une seconde capture du *Turdus swainsoni*, Cab., pris près de Namur, fin octobre 1896 (3).

(1) *Faune illustrée des Vertébrés de la Belgique, Oiseaux*; 4 vol. in-4°. Bruxelles, 1876-1893.

(2) *Bulletin de la Soc. zoologique de France*, t. XXI, p. 153.

(3) *Ibidem*, t. XXII, p. 138.

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

J'ajouterai aujourd'hui, comme espèces nouvelles pour le pays :

1. Le Vautour fauve (*Gyps fulvus* Gm.), dont M. le marquis de Wavrin possède un sujet adulte tiré à Knocke-sur-Mer, le 23 mai 1893, par Marcel Rombeaut, garde-chasse de M. Lippens. Ce Vautour vivait depuis plusieurs semaines dans les dunes, où il a été remarqué par beaucoup de personnes ; il paraissait affaibli par le manque de nourriture, aussi n'a-t-on trouvé dans son estomac que quelques débris de poissons et des cailloux. C'est l'unique capture connue en Belgique, mais je rappellerai que Schlegel a signalé un Vautour fauve tué en Hollande.

2. La Cresserelle kobez (*Timnunculus vespertinus*, Lin.). — M. Raymond Storms me communique un petit Faucon de sa collection, qui n'est autre qu'un jeune mâle du *T. vespertinus*. Cet oiseau a été tiré, le 2 septembre 1898, à Cumptich, près Tirlemont, par M. F. de Neeff.

3. La Chevèchette (*Glaucidium passerinum* Lin.).

4. La Grive erratique (*Turdus migratorius* Lin.), de l'Amérique septentrionale, mais dont on a signalé une ou deux captures en Allemagne. Pour ces deux dernières je dois cependant faire des réserves, car elles étaient bien exposées à Tervueren parmi les oiseaux pris en Belgique, mais, jusqu'ici, je n'ai pu obtenir aucun renseignement précis à leur égard.

Passons maintenant à quelques observations sur des oiseaux de passage accidentel.

1. *Monticola saxatilis* Lin., tué, il y a quelques années, sur la citadelle de Namur (Coll. F. Visart de Bocarmé).

2. *Lanius minor* Gm. — M. le comte F. Visart de Bocarmé m'informe que cette Pie-grièche a niché plusieurs fois dans le parc de son père, à Temploux, près de Namur.

3. *Emberiza cia* Lin. — Le même m'apprend qu'il possède un Bruant de cette espèce tué à Freux (Luxembourg belge).

4. *Melanocorypha sibirica* Gm., *leucoptera* Pall. — M. L. de Pauw m'informe qu'un mâle a été pris à Etter-

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

beek-lez-Bruxelles dans la première quinzaine de novembre 1897.

5. *Coracias garrula* Lin. — Suivant M. Raoul de Thomaz, un Rollier a été tiré en août 1890 à Ottignies. On observe cet oiseau tous les quatre ou cinq ans, mais toujours isolément.

6. *Dryocopus martius* Lin. — M. Al. della Faille de Leverghem me certifie avoir vu, en 1865, à Marche-les-Dames près Namur, un Pic noir provenant de cette région ; cette espèce aurait donc été prise deux fois dans le pays.

7. *Nyctala Tengmalmi* Gm.. — M. le comte F. Visart de Bocarmé possède un individu de cette espèce qui a été tué dans une partie de chasse à Humain (Luxembourg belge), en 1886 ; l'oiseau résidait dans les sapinières qui se trouvent entre les stations de Haversin et de Aye. C'est la seconde capture connue en Belgique de ce rare oiseau.

8. *Aquila chrysaëtus* Lin. — Un Aigle doré adulte fut tué à Maldegem, près Gand, en janvier 1894, et se trouve dans la collection de M. le marquis de Wavrin. Les apparitions de cet Aigle en Belgique sont toujours très accidentelles.

9. *Nisaëtus fasciatus* Vieill. — M. Carbonelle-Thery possède un Aigle Bonelli tué à Rumillies près Tournai vers 1887 ; c'est, à ma connaissance, le troisième sujet capturé en Belgique.

10. *Circaëtus gallicus* Gm. — Un Jean-le-blanc a été tiré près de Wavre, en septembre 1890. Je regrette d'avoir négligé d'inscrire le nom de la personne qui m'a signalé cette capture, mais ce doit être l'un de mes honorables correspondants mentionnés dans cette notice.

11. *Milvus korschun* ou *ater* Gm. — M. Oscar de Dobbelaer a eu l'occasion de tirer deux Milans noirs à Virelles près Chimay : le premier, le 15 avril 1897, le second, le 10 juin 1898 ; ce dernier, M. de Dobbelaer en a fait don au Musée d'histoire naturelle de Bruxelles.

12. *Pernis apivorus* Lin. — M. le Marquis de Wavrin m'a dit que la Bondrée a niché à Bleid près Virton en mai 1897. C'est toujours exceptionnellement que cet oiseau niche dans notre pays.

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

13. *Lagopus scoticus* Lath. — Le Lagopède d'Ecosse a été introduit dans les hautes fagnes de la Belgique, en 1894, par M. Barry-Herfeldt, et il s'y reproduit en grand nombre. Il habite maintenant toute la partie comprise entre les villages de Hockai, Mont, Sourbrodt, Jalhay et Solwaster, ayant comme centre et point culminant la Baraque Michel (674 m. d'altitude)(1).

14. *Cursorius gallicus* Gm. — J'ai dit antérieurement, d'après M. de Selys-Longchamps (2), qu'un Courvite a été tiré à Othée. Suivant une note de M. Ed. Van Beneden (3), cette capture a été faite, le 27 août 1881, sur le territoire de Russon (Limbourg belge) et non à Othée. Un second individu de cette espèce se trouvait à l'Exposition de Tervueren, mais je n'en connais pas encore l'origine.

15. *Totanus glareola* Lin. — M. le Dr Albert Clerfayt m'informe que le Chevalier sylvain doit nicher dans les environs de Binche, car, du 15 au 18 juin 1897, il a tiré quatre jeunes de cette espèce, et il a l'obligeance de m'en envoyer un pour le Musée de l'État. Cette espèce était considérée jusqu'ici comme ne se montrant en Belgique qu'aux passages.

16. *Numenius tenuirostris* Vieill. — Ce Courlis paraît être moins rare qu'on ne l'a cru : M. le comte della Faille de Leverghem en tua un sur l'Escaut, près de Doel, le 11 avril 1878; M. le Comte F. Visart de Bocarmé en possède un tiré à Blankenberghe, en août 1893, par M. Bivort de Spy; enfin, plus récemment, M. de Dobbelaer tira un Courlis à bec grêle sur l'étang de Virelles.

17. *Herodias garzetta* Lin. — M. le marquis de Wavrin possède un jeune sujet tiré à Heist-sur-mer, en mai 1895; M. de Dobbelaer en a également tué un sur l'étang de Virelles. Cette Aigrette ne se montre en Belgique que très accidentellement.

18. *Falcinellus castaneus* Briss. — M. le comte J. de

(1) Il paraît que ce Lagopède s'étend même jusque sur le territoire voisin de la Prusse. Les captures que l'on fera dans la partie occidentale de l'Allemagne n'auront donc rien d'extraordinaire.

(2) *Ornis*, 1880, p. 333, et *Faune ill.*, II, p. 715.

(3) *Bull. de l'Acad. roy. de Belg.*, sér. III, t. XXIX, p. 346.

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Hemptinne m'informe qu'il possède un Ibis falcinelle, mâle adulte, tué le 21 mars 1897, à Westdorpe, sur territoire hollandais, mais à deux cents mètres seulement de la frontière belge; un second individu, probablement la femelle, car ils étaient deux, a pris son vol vers la Belgique.

19. *Hydrochelidon leucoptera* Schinz. — M. le comte F. Visart de Bocarmé possède un oiseau de cette espèce tué sur la Meuse, à Liége, il y a quelques années.

20. *Sterna caspia* Pall. — Le même a tiré, en avril 1892, à Heyst-sur-mer un oiseau de cette rare espèce, qui avait passé plusieurs jours sur la côte de Heyst avant d'avoir été tué.

M. le comte J. de Hemptinne me signale encore deux Bihoreaux (*Nycticorax griseus*) tués en Belgique dans le courant de l'été de 1898, et un Pic à tête cendrée (*Gecinus canus*) tué à Bande en 1896. D'autre part, M. O. de Dobbelaer m'écrit avoir tiré, dans ces dernières années sur l'étang, de Virelles : un Héron pourpré (*Ardea purpurea*), une femelle du Morillon à huppe rousse (*Fuligula rufina*) et une Macreuse à lunettes (*Oidemia perspicillata*); je regrette de ne pas avoir de détails sur cette dernière capture, car c'est la seconde fois seulement que la présence de cette Macreuse a été signalée en Belgique. Au dernier moment, le Dr A. Clerfayt m'apprend qu'il possède un magnifique exemplaire de la Grive dorée (*Turdus varius*) pris en octobre 1897 au bois d'Obourg, près Mons.

Parmi les oiseaux exposés à Tervueren, et au sujet desquels je n'ai pu encore obtenir de renseignements, se trouvaient les suivants : *Graculus eremita* (Lin.), *Tichodroma muraria* (L.), *Monticola cyana* (L.), *Lagopus mutus* (Mont.), *Caccabis rubra* (Briss.), *Scops giu* (Scop.) et *Glareola torquata* (Briss.). — Toutes ces espèces, sauf le *L. mutus*, ont déjà été signalées antérieurement comme ayant été capturées accidentellement en Belgique.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Ornis - Journal of the International Ornithological Committee.

Jahr/Year: 1897

Band/Volume: 9

Autor(en)/Author(s): Dubois Alfons

Artikel/Article: NOUVELLES OBSERVATIONS SUR LA FAUNE ORNITHOLOGIQUE DE BELGIQUE 127-131