ELENCO

DEGLI

UCCELLI RARI O PIÙ DIFFICILI AD AVERSI

CONSERVATI

NELLA SUA COLLEZIONE ORNITOLOGICA ITALIANA

AL 31 DICEMBRE 1898

PEL

PROF. ETTORE ARRIGONI DEGLI ODDI

Membro del R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti.

Cedendo alle istanze di parecchi Amici e Colleghi presento qui la Lista degli Uccelli Italiani più rari o più difficili ad aversi che fanno parte della mia Collezione Ornitologica di Ca' Oddo presso Monselice. Nel 1883, appena trilucente, cominciai a raccogliere Uccelli, rivolgendosi specialmente le mie cure a quelli del Veneto; ma, negli studi regolari e per altre cause indipendenti dalla mia volontà, tale Raccolta proseguì a rilento, ossia meno rapidamente di quanto la fervida mia fantasia avrebbe desiderato. Potei dopo darvi maggiore impulso ed essa ora conta oltre 4500 esemplari (1), quindi per numero

(1) Fra questi conservo circa 600 individui affetti da aberrazioni di colorito, oltre a una dozzina di ibridi naturali e parecchie anomalie teratologiche che non ho creduto di contemplare in questo mio scritto, come non ho citato i Vulturidi, i Sordoni ed altre specie perchè provenienti da località ove facilmente s'incontrano ed alcune altre rarissime quali il *Merops aegyptius*, le *Pterocles* ecc. perchè non furono colte in Italia.

sta al disopra di qualunque Collezione Ornitologica *locale* pubblica o privata, ciò che però non significa che sia la più importante d'Italia. Lo scopo, per quanto lo permettevano le mie forze, fu quello di formare una Raccolta composta di uccelli provenienti dalle differenti parti della nostra Regione per fornire esatti materiali a chi imprendesse a scrivere una dettagliata *Avifauna Italica*, che speriamo un giorno di veder compilata, reggendo poco all'uopo la postuma del Savi ed essendo purtroppo sospesa l'ottima dell' Illustre Giglioli, a tutti nota pelle eccellenti figure. E qui mi piace di nominare e di ringraziare anche pubblicamente i miei due carissimi Amici Prof. Enrico H. Giglioli di Firenze e Prof. Spiridione Brusina di Agram, nonchè Prof. Antonio Carruccio di Roma, Prof. Vincenzo de Romita di Bari, Dr. Mazza di Cagliari, Dr. Cosimo Leonardini di Girgenti, Dr. Enrico Sicher di Catania, Sign^r Giuseppe Moschella, e Paulo Fulco di Reggio Calabria, Odoardo Ferragni di Cremona, Prof. Torossi di Vicenza, ed i miei gentili compagni di caccia Marchese Pietro Buzzacarini, Conte Francesco Giusti, Conte Augusto Gaudio, Dr. Alberto Guillion Mangilli, Sig^r Silvio Lugli, Dr. Angelo Pertile, Cav. Eugenio Busetto di Padova, Conte Francesco ed Alessandro Roncalli di Bergamo ed i seguenti Preparatori-Naturalisti Giovanni Minotto di Venezia, Enrico Bonomi di Milano, Carlo Bainotti di Torino, Raimondo Gragnani di Quiesa (Lucca), Casimiro Coli di Roma, Raffaele Meloni e Pietro Bonomi di Cagliari e finalmente Vittorio dal Nero di Verona, il cui zelo e la cui diligenza nell' accuratissimo lavoro sono superiori a qualunque elogio, da ultimo il mio pensiero ricorre a tre care persone perdute, al cui ricordo si associa il più largo rimpianto i Conti A. P. Ninni e Leonardo Labia di Venezia e l'Ing^o Antonio Prosdocimi di Este.

Le catture che io cito in questo semplice Elenco sono importanti pella rarità della specie nella Regione in generale o particolarmente pella località ove avvennero, così ad. es. il Mignattino ali-bianche che è raro a Venezia, si trova frequentemente a Pisa e così via; se talora ho annotato

UCCELLI RARI O PIU DIFFICILI AD AVERSI. 201

come interessante un uccello da una località ove esso non sarebbe tale, saró grato a chi vorrà farmi nota la cosa, giacchè la distribuzione geografica degli Uccelli Italiani non é del tutto conosciuta, nemmeno nelle nostre provincie settentrionali, ad. es. chi avrebbe ritenuto estivo e nidificante il *Milvus migrans* nel Veronese, quando per molti anni due ornitologi avevano, a quel che sembrava, percorsa ed accuratamente illustrata l'importante Provincia! Ed io ho fede che altri fatti imprevisi ci offrirà la nostra Avifauna, specialmente nella parte meridionale d'Italia, se appassionati Ornitologi si daranno a studiarla con diligenza.

Con queste poche Note, ho voluto soltanto portare anch'io il modesto mio obolo al grande edificio dell' Avifauna Italiana e saró lieto e compensato del diligente e lungo lavoro di tanti anni se avró contribuito, anche in piccola parte, a far meglio conoscere la distribuzione geografica di alcune specie nella nostra Regione.

1. Capovaccaio

[*Neophron percnopterus* (Linnaeus)].

2 esemplari :

♀ giov., giugno 1881, Campiglia dei Berici (Vicentino).

♂ ad., 5 maggio 1896, Reggio di Calabria.

L'esemplare del Vicentino é il primo colto nel Veneto. Mi riferí il Sig. Zambotto, dal quale l'ebbi, che dopo una violenta bufera due individui di tale specie comparvero a Campiglia, uno fu ucciso, l'altro potè fuggire. Esso era stanco ed aveva lo stomaco affatto vuoto.

2. Aquila reale [*Aquila chrysaetos* (Linnaeus)].

2 esemplari :

♂ giov., novembre 1868, Padovano.

♂ giov., dicembre 1880, Padovano.

3. Aquila anatraja (*Aquila clanga*, Pallas).

4 esemplari :

giovane, novembre 1883, Piove di Sacco (Padovano).

♂ ad., 5 gennajo 1890, Colli Euganei (Padovano).

♀ giov., 2 febbrajo 1898, Cagliari (Sardegna).

♀ giov., 22 ottobre 1898, Colognola ai Colli (Veronese).

4. Aquila minore [*Hieractus pennatus* (Gmelin)].

1 esemplare :

♀ ad., 18 novembre 1890, Padovano.

5. Aquila del Bonelli[*Nisaetus fasciatus* (Vicillot)].

4 esemplari :

♂ giov., ottobre 1861, S. Rossore (Toscana).

♀ giov. 15 settembre 1897, monti di Rovegno (Pavia-Lombardia).

♂ ad., e ♂ nidiaceo di Sardegna, ove la specie é abbastanza abbondante. Sul continente Italiano l'Aquila del Bonelli è rarissima ed accidentale, venne presa però parecchie volte in Toscana.

6. Aquila di mare [*Haliaetus albicilla* (Linnaeus)]

3 esemplari :

♂ di due anni, 20 novembre 1886, Veneziano.

♂ *valde* ad., ottobre 1888, Piove di Sacco (Padovano).

♂ di circa tre anni, gennajo 1894, Veneziano.

7. Falco pescatore [*Pandion haliaetus* (Linnaeus)].

2 esemplari :

♂ ad., 17 aprile 1885, Monselice (Padovano).

♂ giov., 8 settembre 1886, Monselice (Padovano).

8. Biancone [*Circaetus gallicus* (Gmelin)].

3 esemplari :

♀ ad., novembre 1864, Veneziano.

giov., ottobre 1881, Padovano.

♂ ad., 7 agosto 1898, Monte Baldo (Veronese).

9. Pojana calzata [*Archibuteo lagopus* (Gmelin)].

2 esemplari :

♂, 15 ottobre 1883, Padovano.

♂, 25 gennaio 1893, contorni di Treviso.

10. Falco pecchiaiuolo[*Pernis apivorus* (Linnaeus)].

15 esemplari :

♂ ad. in livrea *isabellina*, ottobre 1864, Padovano.♂ ad. in livrea *scura*, 15 novembre 1884, Padovano.♂ semi-ad. in livrea *chiara*, ottobre 1890, Padovano.♂ ad. in livrea *isabellina*, aprile 1891 Padovano.♂ giov. in livrea *chiara*, agosto 1891, Padovano.♂ giov. in livrea *scura*, ottobre 1896, Napoletano.♂ giov. in livrea *scura*, 15 aprile 1897, Reggio di Calabria.2 ♂ ad. *tipici* e ♀ ad. *tipica*, 10 e 12 maggio 1897, Reggio di Calabria.♀ ad. in livrea *chiara*, maggio 1897, Reggio di Calabria.♀ giov. in livrea *scura*, maggio 1897, Bari (Puglie).♂ ad. *tipico*, maggio 1897, Perugia (Umbria).♀ ad. *tipico*, giugno 1897, Ivrea (Piemonte).♀ ad. *tipica*, 9 maggio 1898, Nervi (Genovesato).**11. Nibbio reale** [*Milvus iclinus* (Linnaeus)].

2 esemplari :

♀ ad. 25 aprile 1896, Grezzano (Veronese).

♂ ad. 15 aprile 1897, Lodi (Milanese).

12. Nibbio bruno[*Milvus migrans* (Boddaert)].

9 esemplari :

♀ ad., 10 aprile 1897, Grezzano (Veronese).

2 ♂ ad., 6 e 18 maggio 1897, Reggio di Calabria.

2 ♂ ad., 3 giugno 1897, Grezzano (Veronese).

♂ e ♀ giovani di nido, 18 luglio 1897, Grezzano (Veronese).

♂ ad., aprile 1898, Cagliari (Sardegna).

♀ ad., 19 aprile 1898, Castel Giubileo (Roma).

13. Astore [*Astur palumbarius* (Linnaeus)].

3 esemplari :

♂ giov., luglio 1887, Padova.

♂ ad., 2 giugno 1888, Padova.

♀ giov., 22 ottobre 1897, Malcesine (Lago di Garda sul Veronese).

14. Lanario [*Gennaja Feldeggi* (Schlegel)].

1 esemplare :

♀ giov., marzo 1897, Reggio di Calabria.

15. Il Sacro [*Gennaja saker* (J. F. Gmelin)].

1 esemplare :

♂ giov., 16 aprile 1898, Reggio di Calabria.

16. Falcone [*Falco peregrinus* Tunstall].

9 esemplari :

♂ s-ad., 9 dicembre 1886, Milanese.

♂ s-ad., 22 ottobre 1888, Veneziano.

♂ s-ad., 15 maggio 1895, Padova.

♂ giov., 15 novembre 1895, Veronese.

UCCELLI RARI O PIU DIFFICILI AD AVERSI. 205

- ♀ giov., 27 giugno 1896, Fratta Polesine (Rovigo).
 ♂ s-ad., 30 novembre 1896, Veronese.
 ♂ ad., 19 maggio 1897, Vicentino.
 ♀ giov., 5 settembre 1897, Alba (Piemonte).
 ♂ ad., 9 maggio 1898, Reggio di Calabria.

17. Falco Tunisino [*Falco punicus*, Levaillant].

1 esemplare :

- ♂ ad., 20 dicembre 1897, Assemini (Sardegna).

18. Falco cuculo

[*Erythropus vespertinus* (Linnaeus)].

28 esemplari :

Questi ventotto esemplari provengono dal Padovano, Veronese, Lombardia, Piemonte, Toscana e Reggio di Calabria. E' specie di comparsa irregolare e rara nell'Italia settentrionale.

19. Falco grillaio

[*Tinnunculus tinnunculoides* (Natterer)].

8 esemplari :

- ♂ ad., 5 aprile 1889, Vigodarzere (Padovano).
 ♂, 15 settembre 1895, Monselice (Padovano).
 ♂ giov., in 2° abito, 25 agosto 1896, Negrar (Veronese).
 ♂ semi-ad., 8 maggio 1898, Bassano (Vicentino).

E quattro individui di Calabria, ove la specie è frequente alle epoche del passo.

20. Albanella minore

[*Circus cineraceus* (Montagu)].

10 esemplari :

- ♀ ad., 4 aprile 1884, Piove di Sacco (Padovano).
 ♂ ad. *melanico*, 20 agosto 1895, dintorni di Torino.
 ♀ ad., 15 aprile 1896, Pisa (Toscana).

♂ giov., 25 aprile 1897, Oristano (Sardegna).

♀ ad., 10 maggio 1897, Reggio di Calabria.

♀ giov. in 1° abito, 20 settembre 1897, Bovolenta (Padovano).

♂ ad. *melanico*, 30 settembre 1897, Valle Zerpa (Veronese).

♂ ad., 20 aprile 1898, Reggio di Calabria.

♂ ad., 22 aprile 1898, Estuario Veneto.

♀ ad., 22 aprile 1898, Lago di Garda (Veronese).

21. *Albanella reale* [*Circus cyaneus* (Linnaeus)].

3 esemplari :

♂ ad., 5 aprile 1889, Valle Zappa (Veneziano).

♂ giov. in 1° abito, 2 ottobre 1897, Laguna di Venezia.

♂ ad. in abito di ♀ ad., 7 novembre 1897, Valle Zappa (Veneziano).

22. *Albanella pallida* [*Circus Swainsoni*, Smith].

13 esemplari :

♂ ad., ottobre 1880, Valli di Monselice (Padovano).

♂ ad., novembre 1884, Valle Morosina (Padovano).

♂ ad., novembre 1885, Udinese.

♀ giov., 22 giugno 1896, Lodi (Milanese).

♀ ad., 15 aprile 1897, contorni di Trento.

♀ giov., in 1° abito, 24 aprile 1897, Reggio di Calabria.

♀ ad., 20 marzo 1898, Siracusa (Sicilia).

♂ giov., 15 aprile 1898, Massaciuccoli (Toscana).

♂ giov., 15 aprile 1898, Reggio di Calabria.

♂ giov., 19 aprile 1898, Torino (Piemonte).

♂ ad., 20 aprile 1898, Reggio di Calabria.

♀ giov., 22 aprile 1898, Foggia (Puglie).

♀ giov., 18 maggio 1898, Cagliari (Sardegna).

23. Civetta capogrosso[*Nyctala Tengmalmi* (J. F. Gmelin)].

4 esemplari :

♂ giov., 25 agosto 1869, Padovano.

♂ ad., 15 febbraio 1892, Padovano.

♂ ad., 15 febbraio 1897, Padovano.

♀ ad., 2 novembre 1898, Veronese.

Non sarebbe da meravigliarsi se questa specie ritenuta ora di rara comparsa durante l'inverno, si riscontrasse invece sedentaria e nidificante nei luoghi più elevati delle nostre Alpi, cosa già osservata pel Trentino.

24. Gufo reale [*Bubo ignavus* (Linnaeus)].

3 esemplari :

♂ ad., novembre 1865, Padovano.

♂ ad., gennaio 1880, Padovano.

♂ ad., 9 aprile 1897, Monte Baldo (Veronese).

25. Picchio cenerino [*Gecinus canus* (Gmelin)].

2 esemplari.

♂ ad., 18 novembre 1891, Stra (Veneziano).

♀ ad., 22 giugno 1892, Colli Euganei (Padovano).

26. Picchio nero [*Picus martius* Linnaeus].

4 esemplari :

♀ ad., dicembre 1885, Domodossola (Piemonte).

♂ ad., 27 ottobre 1896, Predazzo (Trentino).

♀ ad., 30 gennaio 1897, Predazzo (Trentino).

♀ ad., 20 maggio 1897, Predazzo (Trentino).

27. Picchio rosso mezzano[*Dendrocopus medius* (Linnaeus)].

1 esemplare :

♂ ad., 18 gennaio 1897, Predazzo (Trentino).

28. Picchio di Lilford[*Dendrocopus Lilfordi* (Sharpe et Dresser)].

1 esemplare :

♀ ad., novembre 1868, Ventimiglia (Liguria).

29. Picchio a tridattilo[*Picoides tridactylus* (Linnaeus)].

1 esemplare :

♀ ad. autunno 1873, Padova.

30. Ghiandaja marina [*Coracias garrula* Linnaeus].

11 esemplari :

giov., ottobre 1859, Padovano.

♂ ad., 15 ottobre 1865, Monselice (Padovano).

♀ ad., 25 settembre 1869, Monselice (Padovano).

♂ ad., 30 aprile 1896, Mestre (Veneziano).

♂ ad., 18 maggio 1897, Colli Euganei (Padovano).

♀ giov., 14 agosto 1897, Tre Porti (Venezia).

Gli altri cinque esemplari provengono dall' Italia meridionale, ove questa specie è comune, mentre nella parte settentrionale la sua comparsa è affatto irregolare.

31. Gruccione [*Merops apiaster* Linnaeus].

19 esemplari :

♂ ad., 15 ottobre 1869, Monselice (Padovano).

♀ ad., 25 maggio 1886, Tencarola (Padovano).

♂ ad., 29 maggio 1897, Grezzano (Veronese).

♂ ad., 18 giugno 1897, Zevio (Veronese).

♂ ad., 29 aprile 1898, Varese (Lombardia).

♂ ad., 5 maggio 1898, Mestre (Veneziano).

Gli altri esemplari provengono dalla Toscana, dalle Puglie e da altre regioni dell' Italia meridionale, ove tale specie nidifica ed è abbastanza abbondante.

32. Pigliamosche pettirosso[*Erythrosterna parva* (Bechstein)].

1 esemplare :

giov., 24 agosto 1896, Bassano (Vicentino).

33. Beccofrusone [*Ampelis garrulus*, Linnaeus].

2 esemplari :

♂ ad., dicembre 1873, Veneziano.

♀ ad., ottobre 1882, Monselice (Padovano).

34. Cincia boreale[*Parus borealis*, Scélys-Longchamps].

1 esemplare :

♂ ad., 8 febbraio 1896, dintorni di Nizza.

35. Cincia col ciuffo[*Lophophanes cristatus* (Linnaeus)].

4 esemplari :

♂ ad., settembre 1881, Padovano.

Gli altri tre provengono dalle Alpi Piemontesi, ove si trova frequentemente.

36. Picchio murajolo[*Tichodroma muraria* (Linnaeus)].

18 esemplari :

Questi diciotto esemplari hanno le seguenti provenienze :

Monselice (Padovano).

Monte Baldo (Veronese).

Contorni di Milano e di Torino.

Foggia (Puglie).

Gennargentu (Sardegna).

Monte Pellegrino presso Palermo (Sicilia).

37. Merlo aquajolo pancia-nera[*Cinclus melanogaster* (Linnaeus)].

1 esemplare :

♀ ad., 2 dicembre 1897, Bellunese (Veneto).

È il primo individuo di tale specie preso nel Veneto, del *C. merula* conservo ventiquattro esemplari colti nell'Italia settentrionale e centrale.

38. Nella serie di 14 *Accentor modularis* (Linnaeus) o **Passera scopajola** un soggetto ♂ giov. dell'ottobre 1897 proviene da Nuoro (Sardegna), ove sarebbe uccello di rara comparsa, essendo comune nel resto della Regione Italiana.

39. Cesena fosca [*Turdus fuscatus*, Pallas].

1 esemplare :

♂ ad., 18 febbraio 1893, Bergamo (Lombardia).

40. Merlo col petto bianco[*Merula torquata* (Linnaeus)].

10 esemplari :

♂ ad., 21 maggio 1879, Borgoricco (Padovano).

♂ ad., 8 novembre 1885, Monselice (Padovano).

♂ ad., 10 novembre 1895, Campo Fontana (Veronese).

♀ ad., 22 aprile 1897, Lanzo (Piemonte).

♂ e ♀ ad., 15 maggio 1897, Lanzo (Piemonte).

♀ giov. in 1° abito, 10 agosto 1897, Lanzo (Piemonte).

♂ ad., 22 ottobre 1898, Trento.

♂ ad., 26 novembre 1898, Mugello (Toscana).

♀ ad., 29 dicembre 1898, contorni di Roma.

41. Tra i 15 individui di **Merlo alpestrè** (*Merula alpestris*, Brehm) che conservo, uno di sesso ♀ ad. fu ucciso il 26 ottobre 1897 a Melfi (Puglie), ove la specie è accidentale e molto rara.

42. Monachella nera [*Dromolaea leucura* (Gmelin)].

2 esemplari :

♀ ad., ottobre 1838, Riviera di Genova.

♂ ad., 15 aprile 1896, Nervi (Genova).

43. Pett' azzuro orientale
[*Cyanecula succica* (Linnaeus)].

4 esemplari :

♂ giov., 15 ottobre 1890, Vicentino.

♂ ad., 19 ottobre 1891, Monselice (Padovano).

♂ ad., 7 settembre 1894, Estuario Veneziano.

♂ ad., 2 aprile 1898, Pescantina (Veronese).

44. 14 esemplari di **Bigia grossa** [*Sylvia orphaea*, Temminck] colle seguenti provenienze :

Padovano, Veronese, Bologna, Torino, Siena, Roma e Velletri, Bari nelle Puglie e Catania in Sicilia. È specie non egualmente distribuita in Italia.

45. 10 esemplari di **Bigiarella** [*Sylvia curruca* (Linnaeus)], colle seguenti provenienze :

Padovano, Vicentino, Veronese, Novara, Spezia, Foggia, Palermo e Sardegna. Anche questa è una specie non egualmente distribuita in Italia.

46. Fra gli esemplari di **Sterpazzola di Sardegna** [*Sylvia conspicillata*, La Marmorata], un ♂ ad. fu preso nel Cremonese nell' agosto 1897. È specie comune nelle isole di Corsica, Sardegna, Sicilia, Malta e Pantellaria, e si trova pure, come dice il Giglioli, nelle parti centrali e meridionali della penisola, inoltre fu presa varie volte in Liguria e il Bonaparte la trovò comune e nidificante presso Civita-vecchia.

47. Sterpazzolina(*Sylvia subalpina*, Bonelli apud Temminck).

12 esemplari :

♀ giov., 10 ottobre 1882, Veronese.

♂ ad., 4 ottobre 1883, Monselice (Padovano).

♀ ad., 2 dicembre 1896, Lonigo (Vicentino).

♂ avanti la 1^a muta, 22 agosto 1898, Novara (Piemonte).♀ avanti la 1^a muta, 25 agosto 1898, Bergamo (Lombardia).

Gli altri sette esemplari provengono dalle Marche, Toscana, Calabria, Sicilia e Sardegna, ove la specie è frequente, mentre nella parti settentrionali è molto rara.

48. Occhiocotto [*Sylvia melanocephala* (Gmelin)].

16 esemplari :

♂ ad., agosto 1880, contorni di Padova.

♂ ad., agosto 1884, presso Padova.

♂ e ♀ ad., 19 dicembre 1896, Bardolino (Veronese).

♀ ad., 17 ottobre 1897, Legnago (Veronese).

♂ e ♀ ad., 22 novembre 1897, Bassano Veneto.

♀ ad., 15 novembre 1898, Varese (Lombardia).

Gli altri esemplari provengono dalla Toscana, Puglie e Sardegna, ove la specie è frequente, mentre è rara ed accidentale nelle parti settentrionali d'Italia.

49. Magnanina [*Melizophilus undatus* (Boddaert)].

8 esemplari :

♂ ad., ottobre 1884, Padovano.

♂ giov., 10 novembre 1897, Alessandria (Piemonte).

♂ e ♀ ad., 15 e 16 novembre 1898, Busto Arsizio (Milanese).

Gli altri esemplari provengono dalla Toscana, Puglie e Sardegna, ove tale specie è frequente.

50. Cannajola verdognola[*Acrocephalus palustris* (Bechstein)].

5 esemplari :

♂ ad., 27 settembre 1896, Bardolino (Veronese).

4 ♂ ad., 5 e 15 maggio 1897, sul Po nel Cremonese.

51. Salciajola [*Potamodus luscinioides* (Savi)].

8 esemplari :

♀ ad., 30 aprile 1897, Valle Zerpa (Veronese).

4 ♂ ad., 30 aprile e 6 maggio 1897, Bovolenta (Padovano).

♂ ad., agosto 1897, Bagnolo (Vicentino).

♀ ad., 3 agosto 1897, Bovolenta (Padovano).

♂ ad., 24 luglio 1898, Bovolenta (Padovano).

52. Forapaglie macchiettato[*Locustella naevia* (Boddaert)].

8 esemplari :

♂ ad., 14 settembre 1883, Monselice (Padovano).

♂ ad., 28 agosto 1890, Legnago (Veronese).

2 ♂ ad., ♂ ad., 2 ♀ giov., ♂ dell'anno, 27 e 31 agosto, 6, 20, 23 e 27 settembre 1897, Boschi di Sant'Anna (altimonti Veronesi).

53. Forapaglie castagnolo[*Lusciniola melanopogon* (Temminck)].

22 esemplari :

6 ♂ ad., ♀ ad., 27 gennajo 1888, Valle Inferno (Padovano).

♂ giov., 2 giugno 1888, Monselice (Padovano).

♂ ad., 30 ottobre 1895, Lesina (Puglie).

♂ ad., 15 ottobre 1896, sul Ticino presso Pavia (Lombardia).

♀ ad., 17 ottobre 1896, sul Po presso Torino.

♂ ad., 15 agosto 1897, Rovigo (Veneto).

♀ ad., 10 ottobre 1897, Cagliari (Sardegna).

♂ ad., 13 ottobre 1897, sul Ticino presso Pavia.

♀ ad., 21 febbraio 1898, Conselve (Padovano).

Gli altri esemplari provengono dalla Toscana e Sicilia, ove la specie è frequente.

54. Rusignuolo di fiume [*Cettia Cetti* (La Marmora)].

10 esemplari :

♂ ad., gennaio 1888, Padovano.

♂ ad., 5 settembre 1890, Treviglio (Lombardia).

♀ ad., 8 maggio 1893, Novara (Piemonte).

♂ ad., 15 giugno 1895, Bovolenta (Padovano).

♂ giov., 6 ottobre 1897, Pavia (Lombardia).

Gli altri furono colti in varie località dell' Italia centrale e meridionale, ove la specie è sedentaria nei luoghi paludosi.

55. Rusignuolo levantino

[*Aedon familiaris* (Ménétries)].

2 esemplari :

♂ ad., 18 giugno 1892, Valle Inferno (Padovano).

♂ ad., 25 luglio 1892, contorni di Padova.

56. Ballerina nera [*Motacilla lugubris*, Temminck].

1 esemplare :

♂ ad., 15 marzo 1894, Abano (Padovano).

57. Cutrettola testa gialla

[*Budytes campestris* (Pallas)].

1 esemplare :

♂ ad., 28 aprile 1894, Valle di Riola Aperta (Veneziano).

Ritengo rarissima tale specie in Italia, nè credo riferibili ad essa le Cutrettole *a sopraciglio giallo* che si pigliano di autunno, delle quali ebbi anch'io numerosi esemplari da

UCCELLI RARI O PIU DIFFICILI AD AVERSI. 213

varie località, ed il mio asserto è basato su accurati confronti fatti con veri *B. campestris* di ogni età avuti d'Inghilterra.

58. Cutrettola capinera

[*Budytes Feldeggi* (Michaelles)].

10 esemplari :

♂ ad., 18 maggio 1892, Valle Zappa (Veneziano).

♂ ad., 15 agosto 1892, Monselice (Padovano).

Gli altri esemplari provengono dalle Puglie e dal Napoletano, ove questa specie sarebbe discretamente abbondante.

59. Pispola gola rossa [*Anthus cervinus* (Pallas)].

18 esemplari :

♂ ad., 5 aprile 1885, contorni di Padova.

♂ ad., 22 ottobre 1891, Vicentino.

♂ ad., ottobre 1894, S. Massimo (Verona).

♂ ad., maggio 1895, Bari (Puglie).

♂ ad., 15 maggio 1895, Monselice (Padovano).

2 ♂ ad., e ♀ ad., 25 aprile, 25 settembre e 11 ottobre 1896, Cremona (Lombardia).

♂ ad., 20 ottobre 1896, Pescantina (Veronese).

♂ e ♀ ad., 26 aprile 1897, Bari (Puglie).

♀ dell'anno, settembre 1897, Cremona.

2 ♂ ad., ottobre 1897, Alghero e Isola della Vacca (Sardegna).

♂ ad., 5 maggio 1898, Cremona.

♂ ad., 22 settembre 1898, Giarabassa (Padovano).

♂ ad., 15 ottobre 1898, Catania (Sicilia).

♂ ad., ottobre 1898, Torino.

60. 28 esemplari di Calandro

[*Agrodroma campestris* (Linnaeus)], colle seguenti provenienze :

2 da Trento e Ala (Trentino).

9 dal Padovano.

- 5 dal Veronese.
- 3 dal Cremonese.
- 2 da Novara e Cuneo (Piemonte).
- 1 da Genova.
- 1 da Pisa (Toscana).
- 1 dalla Campagna Romana.
- 2 da Foggia (Puglie).
- 1 da Reggio Calabria.
- 1 da Oristano (Sardegna).

Questa specie non è egualmente abbondante nelle varie regioni d'Italia, mantenendosi più comune nelle parti centrali e meridionali.

61. Calandro maggiore [*Anthus Richardi*, Vieillot].

6 esemplari :

- ♂ dell'anno, settembre 1892, Vicentino.
- ♀ ad., 18 settembre 1896, Novara (Piemonte).
- ♀ ad., 2 ottobre 1896, Cremona (Lombardia).
- ♂ ad., 4 ottobre 1896, contorni di Verona.
- ♂ ad., 15 dicembre 1896, contorni di Padova.
- ♂ ad., 12 ottobre 1898, Caselle di Pressana (Veronese).

62. Calandrino

[*Calandrella brachydactyla* (Leisler)].

16 esemplari :

- ♂ ad., 7 novembre 1883, Monselice (Padovano).
- 2 ♀ giov., 14 agosto 1894, Tre Porti (Venezia).
- ♂ ad., 15 agosto 1895, Verona.
- ♀ ad., 8 ottobre 1896, Monselice (Padovano).
- ♂ giov., 20 ottobre 1896, Lugagnaro (Veronese).

Gli altri provengono dall'Italia meridionale, ove la specie è comune.

63. Pispoletta [*Calandrella pispocetta* (Pallas)].

1 esemplare :

- ♂ ad., 2 maggio 1896, Tre Porti (Venezia).

64. Lodola siberiana [*Pallasia sibirica* (Gmelin)].

1 esemplare :

♂ ad., 30 marzo 1896, Bovolenta (Padovano).

65. Calandra [*Melanocorypha calandra* (Linnaeus)].

29 esemplari :

♂ ad., 2 novembre 1880, Monselice (Padovano).

♀ ad., 27 febbraio 1886, contorni di Padova.

♂ ad., 15 febbraio 1887, contorni di Padova.

♂ ad., 10 gennaio 1894, contorni di Milano.

3 ♂ ad. e ♀ ad., 20 e 21 febbraio 1894 dintorni di Padova.

♂ ad., 16 novembre 1896, Zevio (Veronese).

♀ ad., 31 dicembre 1896, Piove (Padovano).

3 ♂ ad. e 3 ♀ ad., 2 febbraio 1897, Piove.

♀ ad., 29 dicembre 1897, contorni di Torino.

Gli altri soggetti provengono dell'Italia meridionale, ove la specie è comune. I principali mercati dall'Italia settentrionale durante la stagione invernale ricevono Calandre in grande copia dalle regioni centrali e meridionali della penisola, dalla Sicilia e dalla Sardegna.

66. Lodola gola gialla[*Otocorys alpestris* (Linnaeus)].

4 esemplari :

♀ ad., autunno 1883, contorni di Padova.

♂ e ♀ ad., e giov. dell'anno, 9 gennaio 1893, dintorni di Padova.

67. Zigolo di Lapponia[*Plectrophanes lapponicus* (Linnaeus)].

13 esemplari :

♂ ad., 3 maggio 1883, Ancona (Marche)

♂ giov., 21 gennajo 1887, Padovano.

- ♀ ad., 2 ottobre 1887, Monselice (Padovano).
 ♀ giov., 20 novembre 1890, Vicentino.
 ♂ ad., 4 dicembre 1890, Vicentino.
 ♀ ad., 9 dicembre 1891, Padovano.
 ♂ giov., 14 dicembre 1892, Vicentino.
 ♂ ad., 25 gennajo 1893, Legnago (Veronese).
 giovane, 2 febbraio 1893, Padovano.
 giovane, novembre 1894, dintorni di Verona.
 ♂ ad., 7 dicembre 1896, Pescantina (Veronese).
 ♀ giov., 14 novembre 1897, dintorni di Padova.
 ad., 11 dicembre 1898, Lonigo (Vicenza).

68. Zigolo della neve

[*Plectrophenax nivalis* (Linnaeus)].

19 esemplari :

- ♀ ad., agosto 1884, dintorni di Padova.
 ♂ ad., 22 ottobre 1886, Colli Euganei (Padovano).
 ♂ ad., 25 ottobre 1891, mura di Padova.
 2 ad., 20 novembre 1891, Monselice (Padova).
 2 ♂ ad., ♂ giov. e giov., 12, 13, 18 e 22 dicembre 1893, Padovano; Riola Aperta e forte S. Angelo nel Veneziano.
 ♂ e ♀ giov. e giov., 8 e 27 gennajo 1894, Riola Aperta (Veneziano).
 ♂ ad., 15 gennajo 1895, Lecco (Lombardia).
 ♂ giov., 26 dicembre 1895, Stazione Marittima di Venezia.
 ♂ ad., 10 novembre 1896, Bovolenta (Padovano).
 ♂ ad. e ♀ giov., 21 dicembre 1896, Monte Pastello (Veronese).
 ♂ ad. in livrea di nozze, 5 maggio 1897, Moncenisio (Piemonte).
 ♀ giov., 10 maggio 1898, Zoldo (alti monti Veneti).

Il fatto di due esemplari avuti da luoghi di alta montagna nel maggio darebbe a vedere che questa specie nidifica in quelle località, cosa che mi riprometto di diligentemente indagare.

69. Zigolo capinero

[*Euspiza melanocephala* (Scopoli)].

2 esemplari :

♂ ad., 18 agosto 1895, Selvazzano (Padovano).

♂ ad., 12 maggio 1897, Bari (Puglie).

Questa specie si riscontra abbastanza facilmente nelle Puglie.

70. Zigolo dal collare [*Euspiza aureola* (Pallas)].

1 esemplare :

♂ ad., 18 ottobre 1894, Mandria presso Padova.

71. Ortolano grigio

[*Emberiza caesia*, Cretzschmar, in Rüppell].

2 esemplari :

♂ e ♀ ad., 20 aprile 1895, Riola vecchia nel Veneziano.

72. Zigolo golarossa

[*Emberiza leucocephala* (S. G. Gmelin)].

5 esemplari :

♂ ad., agosto 1888, Lonigo (Vicenza).

♀ giov., agosto 1888, Prato (Toscana).

♂ giov., 30 novembre 1888, Lonigo (Vicenza).

♂ ad., 8 maggio 1893, Monselice (Padovano).

♀ ad., 16 agosto 1896, Lonigo (Vicenza).

73. Zigolo boschereccio

[*Emberiza rustica*, Pallas].

1 esemplare :

♂ ad., 18 ottobre 1892, Arquà (Padovano).

74. Zigolo minore [*Emberiza pusilla*, Pallas].

1 esemplare :

♂ ad., 8 marzo 1891, R. Orto Botanico di Padova.

75. Passera europea
[*Passer domesticus* (Linnaeus)].

2 esemplari :

♂ ad., novembre 1881, Monselice (Padova).

♂ ad., 11 febbrajo 1894, contorni di Padova.

76. Passera lagia [*Petronia stulta* (Linnaeus)].

30 esemplari :

Questa specie è particolarmente abbondante nelle parti centrali e meridionali d'Italia, facendosi scarsa al Nord degli Apennini, fra gli esemplari che conservo dieci sono dal Padovano, sei dal Veronese, uno da Lodi (Lombardia) e due da Ancona, nelle sopradette regioni la *P. stulta* è poco frequente.

77. Fringuello alpino
[*Montifringilla nivalis* (Linnaeus)].

5 esemplari :

♂ ad., gennajo 1881, Monselice (Padovano).

2 ♂ ad., inverno 1892, Monte Foppolo (Bergamasco).

♀ ad., 10 gennajo 1893, Padovano.

♀ ad., 21 dicembre 1896, Monte Baldo (Veronese),

Specie sedentaria sulle cime più elevate delle Alpi e degli Apennini, al basso s'incontra molto di rado ed in generale coi freddi più intensi.

78. Venturone [*Chloroptila citrinella* (Linnaeus)].

3 esemplari :

♂ ad., 23 novembre 1896, S. Zeno (alti monti Veronesi).

♂ ad., 18 novembre 1898, contorni di Padova.

♂ ad., 20 novembre 1898, contorni di Milano.

79. Fanello nordico[*Cannabina flavirostris* (Linnaeus)].

2 esemplari :

♂ ad., 15 ottobre 1896, sul mercato di Torino.

♀ giov., 20 novembre 1898, contorni di Pavia.

80. Organetto [*Aegiothus linaria* (Linnaeus)].

12 esemplari :

♂ ad., 22 ottobre 1891, Monselice (Padova).

♀ ad., 29 ottobre 1892, Padovano.

♂ ad., 15 novembre 1893, Pisa (Toscana).

♂ ad., 9 dicembre 1893, Veneziano.

♀ ad., 30 dicembre 1893, contorni di Padova.

2 ♂ ad., 14 febbraio 1894, Padovano.

♂ ad., 20 dicembre 1894, Tregnago (Veronese).

♂ ad., 18 gennajo 1895, Reggio di Calabria.

♂ ad., 5 febbrajo 1897, Iglesias (Sardegna).

♂ ad., 12 ottobre 1897, Alba (Piemonte).

♀ s-ad., 25 dicembre 1897, Lucca (Toscana).

81. Organetto minore[*Aegiothus rufescens* (Vieillot)].

7 esemplari :

♂ ad., ottobre 1884, Monselice (Padovano).

♂ giov., 18 ottobre 1887, Monselice (Padovano).

2 ♂ ad., 29 ottobre 1892, Padovano.

♀ ad., 30 dicembre 1893, Bovolenta (Padovano).

♂ giov., 14 febbrajo 1894, Bovolenta (Padovano).

♂ ad., 7 marzo 1898, Breonio (Veronese).

82. Ciuffolotto [*Pyrrhula europaea* (Vieillot)].

20 esemplari :

Tra questi venti esemplari, quattro provengono dalla

Sardegna e Sicilia, ove la specie è di comparsa affatto irregolare e molto rara, essi hanno le seguenti provenienze :

♂ ad., 18 novembre 1890, Nuoro (Sardegna).

♂ ad., 15 dicembre 1894, Nuoro (Sardegna).

♀ ad., 6 gennajo 1895, mercato di Catania.

♂ ad., 8 novembre 1897, Girgenti.

83. Ciuffolotto maggiore

[*Pyrhula pyrrhula* (Linnaeus)].

1 esemplare :

♂ ad., 4 novembre 1898, Breonio (alti monti del Veronese).

È indubitato che questo esemplare per nulla differisce dai grossi individui di tale specie che io ebbi dalla Norvegia tanto come dimensioni, quanto pel maggiore grado di intensità nella colorazione.

Molte altre volte però ho veduto Ciuffolotti di maggiore statura degli ordinarii, ma essi secondo me non erano riferibili alla presente specie, mentre non ho alcun dubbio riguardo all' identità dell' esemplare in questione.

84. Trombettiere

[*Bucanetes githagineus* (Lichtenstein)].

1 esemplare :

♂ ad., 18 ottobre 1892, Este (Padovano).

85. Ciuffolotto scarlatto

[*Carpodacus erythrinus* (Pallas)].

1 esemplare :

♂ ad., 18 marzo 1892, Arquà Petrarca (Padovano).

Questo individuo porta l'abito degli adulti di un bel rosso scarlatto.

86. Ciuffolotto delle pinete[*Pinicola enucleator* (Linnaeus)].

2 esemplari :

♂ ad., 25 febbrajo 1893, Padovano.

♀ ad., 15 ottobre 1894, Arquà Petrarca (Padovano).

87. Crociere fasciato [*Loxia bifasciata*, C.-L. Brehm].

1 esemplare :

♀ ad., 5 gennajo 1892, Padovano.

88. Storno roseo [*Pastor roseus* (Linnaeus)].

6 esemplari :

♂ ad., giugno 1874, Monselice (Padovano).

♂ giov., settembre 1883, Padovano.

♀ ad., 8 maggio 1886, Padova.

2 ♂ giov. avanti la muta, 18 agosto 1894, Monselice (Padovano).

♀ ad., 7 giugno 1898, S. Vito di Tagliamento (Friuli).

89. Gracchio corallino[*Pyrrhonorax graculus* (Linnaeus)].

1 esemplare :

♂ ad., 5 novembre 1888, Padovano.

90. Gracchio [*Pyrrhonorax alpinus* (Linnaeus)].

13 esemplari :

Tre di questi esemplari provengono dal Padovano, ove è specie rarissima, ed uno di Sardegna dove pure è uccello raro, gli altri furono colti lungo la catena delle Alpi, nelle quali località è sedentario e nidificante.

91. Corvo imperiale [*Corvus corax*, Linnaeus].

5 esemplari :

♀ ad., 23 dicembre 1893, Caprino (Veronese).

♂ ad., 25 agosto 1894, Zevio (Veronese).

♂ e ♀ giov., 28 settembre 1896, Buttapietra (alta pianura Veronese).

♂ ad., 9 aprile 1897, Ferrara di Monte Baldo (Veronese).

92. Cornacchia nera [*Corvus corone*, Linnaeus].

2 esemplari :

♂ ad., 18 marzo 1886, Padovano.

♂ ad., 5 novembre 1893, Padovano.

93. Taccola [*Cotocotus monedula* (Linnaeus)].

9 esemplari :

♂ ad., 8 novembre 1888, Cremona (Lombardia).

♂ ad., 15 gennaio 1891, Vigodarzere (Padovano).

♂ ad., 18 gennaio 1898, Grezzana (Veronese).

Gli altri esemplari provengono da Rovigo, Roma e Lecce, ove la specie è sedentaria e comune.

94. Nocciolaja[*Nucifraga caryocatactes* (Linnaeus)].

6 esemplari :

♂ ad., ottobre 1869, Monselice (Padovano).

♂ ad., gennaio 1895, Lecco (Lombardia).

♂ giov., 15 settembre 1897, Breonio (Veronese).

♂ e ♀ ad., 23 settembre 1897, Ferrara di Monte Baldo (Veronese).

♀ semi-ad., 28 settembre 1897, S. Zeno di Montagna (Veronese).

Due di questi individui appartengono alla var. nordica della Nocciolaja.

UCCELLI RARI O PIU DIFFICILI AD AVERSI. 223

95. Sirratte [*Syrrhaptus paradoxus* (Pallas)].

1 esemplare :

♀ ad., autunno 1871, Padovano.

96. Fagiano [*Phasianus colchicus*, Linnaeus].

4 esemplari :

♂ e ♀ ad., 18 ottobre 1886, Ghisonaccio (Corsica).

2 ♂ ad., 18 marzo 1894, Ghisonaccio.

97. Fagiano di monte [*Tetrao tetrrix*, Linnaeus].

7 esemplari :

♂ e ♀ semi-ad., 12 ottobre 1898, Ferrara di Monte Baldo (Veronese).

Gli altri esemplari provengono dalle Alpi Venete e Lombarde, ove la specie è piuttosto frequente, mentre che nel Veronese è uccello molto raro.

98. Francolino [*Francolinus vulgaris* (Linnaeus)].

1 esemplare :

♂ ad., 1843, Sicilia.

99. Coturnice [*Caccabis saxatilis* (Meyer)].

8 esemplari :

♀ ad., ottobre 1875, dintorni di Padova.

Gli altri esemplari provengono dalle Alpi, dall' Ascolano e dalla Sicilia, ove è uccello discretamente abbondante.

100. Pernice [*Caccabis rufa* (Linnaeus)].

7 esemplari :

♂ ad., settembre 1882, dintorni di Padova.

Gli altri soggetti provengono dalla Toscana, Isola d'Elba e Corsica, ove è specie piuttosto frequente.

101. Ottarda [*Otis tarda* (Linnaeus)].

1 esemplare :

♀ ad., 8 aprile 1890, Giarabassa (Padovano).

102. Gallina pratajola [*Otis tetraz* (Linnaeus)].

14 esemplari :

♂ giov., 18 settembre 1878, Padovano.

♀ ad., 9 ottobre 1884, Bormio (Lombardia).

♀ giov., 2 novembre 1884, Tamaj (Udinese).

2 ♂ ad., 3 gennajo 1888, Vigonza (Padovano).

♂ ad., 29 dicembre 1891, Padovano.

♂ ad. prim., 5 aprile 1893, Giarabassa (Padovano).

♂ giov., 1 dicembre 1896, Ca Oddo (Monselice-Padovano).

♀ ad. prim., 21 febbrajo 1897, Bassano (Veneto).

♂ semi-ad., 31 novembre 1897, Botenigo (Veneziano).

♂ ad., 28 dicembre 1897, Costa di S. Massimo (Veronese).

♂ giov., 30 dicembre 1897, Dolo (Veneziano).

♀ giov., 12 febbrajo 1898, Dolo (Veneziano).

♂ ad. prim., 3 maggio 1898, Mestre (Veneziano).

103. Pernice di mare

[*Glareola pratincola* (Linnaeus)].

10 esemplari :

♂ giov., 1 aprile 1890, Valle Morosina (Padovano).

♂ ad., 15 maggio 1895, Riola Aperta (Veneziano).

♂ ad., 9 maggio 1896, Valle Zappa (Veneziano).

♂ ad., 16 maggio 1896, Valli Mocenighe (Padovano).

♂ ad., 18 maggio 1896, Porto di Lido (Veneziano).

♂ e ♀ ad., 21 maggio 1896, Valli dell' Asco (Padovano).

UCCELLI RARI O PIU DIFFICILI AD AVERSI. 227

♀ ad., 18 maggio 1898, Valle Zerpa (Veronese).

È due di Toscana, ove tale specie è di passo quasi regolare in primavera e non infrequente.

104. Corrione biondo

[*Cursorius gallicus* (Gmelin)].

1 esemplare :

giovane, giugno 1882, Vescovana (Padovano).

105. Squatarola [*Squatarola helvetica* (Linnaeus)].

15 esemplari :

2 ♂ ad., 3 ♀ ad. primav., 9, 22, 27 e 29 maggio 1896, Valle Zappa e Riola Aperta (Veneziano).

♀ ad. primav., 3 settembre 1896, Tre Porti (Venezia).

♂ ad. primav., 15 aprile 1898, Reggio di Calabria.

♂ ad. primav., 2 maggio 1898, Legnago (Veronese).

♂ ad. primav., 8 maggio 1898, Vercelli (Piemonte).

♀ ad. primav., 10 maggio 1898, Lodi (Milanese).

Gli altri esemplari sono presi nel Veneto durante l'inverno, quando la specie nei luoghi adatti è abbastanza comune, mentre è uccello rarissimo in abito di nozze, od in Toscana (Pisa, Massaciuccoli), ove si prende non raramente nella livrea di primavera.

106. Piviere [*Charadrius pluvialis*, Linnaeus].

14 esemplari :

Alcuni di questi esemplari provenienti dal Padovano e dalla Toscana rivestono l'abito di primavera, nella quale livrea non è facile d'averne.

107. Piviere orientale

[*Charadrius fulvus*, Gmelin].

2 esemplari :

♂ ad., febbrajo 1884, Malta.

♀ ad., 30 ottobre 1897, Reggio di Calabria.

108. Piviere tortolino[*Eudromias morinellus* (Linnaeus).]

10 esemplari :

♀ ad., 20 novembre 1887, Estuario Veneto.

semi-ad., 15 marzo 1888, Valle Zappa (Veneziano).

♀ giov., 26 settembre 1896, S. Bonifacio (Pianura Veronese).

♂ ad., 3 novembre 1896, Cremona (Lombardia).

♀ giov., 5 novembre 1896, Costa di S. Massimo (alta pianura Veronese).

♀ ad., 15 novembre 1896, Buttapietra (alta pianura Veronese).

♀ ad., 18 novembre 1896, Girgenti (Sicilia).

2 ♀ ad. e ♀ dell'anno, 2 settembre 1897, Chiesanuova (alti monti del Veronese).

109. Voltapietre [*Strepsilas interpres* (Linnaeus)].

28 esemplari :

giov., 5 aprile 1883, Ghiaie del Piave (Treviso).

♂ e ♀ ad. primav., 2 aprile 1892, valli di Monselice (Padovano).

♂ ad. primav., 25 maggio 1893, Massaciuccoli (Toscana).

♂ e ♀ giov. dell'anno, 6 e 23 agosto 1893, Veneziano.

♂ e ♀ ad., 5 ottobre 1893, Valle Zappa (Veneziano).

♀ giov., 24 aprile 1894, Ponta longa (Estuario Veneziano).

♀ ad., 10 settembre 1894, Monselice (Padovano).

♂ giov. dopo la 1^a muta, 14 ottobre 1894, Sette Morti (Estuario Veneziano).

♂ ad. primav., 31 agosto 1895, Ponta longa (Estuario Veneziano).

♀ ad., 18 maggio 1896, Sette Morti (Estuario Veneziano).

4 ♂ giov. e 4 ♀ giov. dell'anno, 4 e 5 settembre 1896, Ponta longa e Sette Morti.

UCCELLI RARI O PIU DIFFICILI AD AVERSI. 229

♂ ad. primav., 14 maggio 1897, Acquanegra (Cremone-
nese).

♂ ad. primav., 14 maggio 1897, Massaciuccoli (Toscana).

♂ e ♀ giov. avanti la 1^a muta, 22 agosto 1897 lungo il
Ticino presso Pavia.

♂ giov., 15 ottobre 1897, Reggio di Calabria.

♀ ad. primav., 6 maggio 1898, sul Po presso Torino.

♀ ad. primav., 11 maggio 1898, Cagliari (Sardegna).

110. Beccaccia di mare

[*Haematopus ostralegus*, Linnaeus].

6 esemplari :

♂ ad., aprile 1883, paludi di Roma.

3 ♂ ad., 14 aprile 1895, Riola vecchia (Veneziano).

♂ ad., 18 aprile 1898, Val Zerpa (Veronese).

♂ ad., 29 settembre 1898, contorni di Torino.

111. Avocetta [*Recurvirostra avocetta*, Linnaeus].

3 esemplari :

♂ ad., 28 febbrajo 1884, Valle Figheri (Veneziano).

♂ ad., 18 maggio 1896, Valle Millecampi (Padovano)

♂ s-ad., 5 dicembre 1897, Oristano (Sardegna).

112. Cavalier d'Italia

[*Himantopus caudidus* (Linnaeus)].

12 esemplari :

♂ ad. e giov., agosto 1880, Pozzonuovo (Padovano)

♂ ad., ottobre 1882, Valle Zappa (Veneziano).

♂ ad., 8 aprile 1886, Codevigo (Padovano).

♂ ad., 27 aprile 1896, Bovolenta (Padovano).

2 ♂ ad., 10 e 14 maggio 1896, Bocche del Po (Rodi-
gino).

♂ s-ad., 28 marzo 1897, Girgenti (Sicilia).

♂ ♀ ad., 30 marzo 1897, Massaciuccoli (Toscana).

♂ e ♀ ad., 15 maggio 1897, Foggia (Puglie).

113. Calidra [*Calidris arenaria* (Linnaeus)].

6 esemplari :

- ♂ giov., 15 ottobre 1882, Estuario Veneto.
- ♂ ad., ottobre 1886, Estuario Veneto.
- ♂ giov., ottobre 1886, Friuli (Veneto).
- ♀ ad., 6 settembre 1897, Genova (Liguria).
- ♂ giov., 7 settembre 1897, Maccarese (Roma).
- ♂ ad., 17 settembre 1897, Cremona (Lombardia).

114. Gamberocchio frullino[*Limicola platyrhyncha* (Temminck)].

18 esemplari :

- ♂ giov., 15 agosto 1883, Estuario Veneto.
- ♂ e ♀ ad., 1 e 4 agosto 1893, Riola vecchia (Estuario Veneziano).
- ♂ e ♀ giov., 20 agosto 1894, Riola aperta (Estuario Veneziano).
- ♂ ad., 19 settembre 1895, Riola vecchia (Estuario Veneziano).
- ♂ giov., 12 agosto 1895, Catania (Sicilia).
- 5 ♂ giov. e 3 ♀ giov., 24 e 29 agosto 1896, Ponta longa (Estuario Veneziano).
- ♂ giov., 6 agosto 1897, Reggio di Calabria.
- ♀ giov., 18 agosto 1898, Novara (Piemonte).
- ♀ giov., 19 settembre 1898, Sassari (Sardegna).

115. Piovanello violetto[*Arquatella maritima* (Gmelin)].

2 esemplari :

- ♂ giov., 18 novembre 1896, Vercelli (Piemonte).
- ♂ ad., 5 maggio 1898, Riola aperta (Veneziano).

116. Gamberchio nano[*Actodromas Temmincki* (Leisler)].

9 esemplari :

♀ ad., 6 maggio 1892, Vicentino.

♂ giov., 18 maggio 1892, Valle Zappa (Veneziano).

♂ ad., 28 giugno 1892, Monselice (Padovano).

♂ ad., 27 aprile 1897, Bari (Puglie).

♂ e ♀ ad., 10 maggio 1897, Cremona (Lombardia).

♀ ad., 26 aprile 1898, Valle Scarpa (Estuario Padovano).

♀ ad., 6 maggio 1898, Massaciuccoli (Toscana).

♂ ad., 9 maggio 1898, Maccarese (Roma).

117. Piovanello maggiore(*Tringa canutus*, Linnaeus).

6 esemplari :

♀ ad., gennajo 1887, Valle Zappa (Veneziano).

♂ ad., 30 maggio 1894, Cremona (Lombardia).

♂ ad., 10 maggio 1895, Riola vecchia (Estuario Veneziano).

♀ ad., 20 maggio 1896, Valle Zappa (Veneziano).

♂ ad., 29 agosto 1897, Ancona (Marche).

♀ giov., 20 settembre 1897, Sette Morti (Estuario Veneziano).

118. Gambetta [*Machetes pugnax* (Linnaeus)].

174 esemplari :

♂ ad. in abito di nozze, 15 maggio 1883, Estuario Veneto.

♂ ad. in abito di nozze, 8 maggio 1889, Valle Morosina (Estuario Padovano).

♂ ad. in abito di nozze, 18 maggio 1890, Valle Cornio (Estuario Veneziano).

♂ ad. in abito di nozze, 10 giugno 1890, Valli Mocenighe (Este-Padovano).

♂ ad. in abito di nozze, 23 giugno 1891, Valle Marana (Anguillara-Padovano).

♂ ad. in abito di nozze, maggio 1892, Novara (Piemonte).

♂ ad. in abito di nozze, 18 maggio 1892, Valle Miana (Dolo-Venezia).

♂ ad. in abito di nozze, 18 maggio 1892, fiume Adige presso Trento.

♂ ad. in abito di nozze, 5 giugno 1892, Comacchio (Ferrara).

♂ ad. in abito di nozze, 15 giugno 1892, Ghiaje del Piave (Treviso).

♂ ad. in abito di nozze, 18 giugno 1892, Acquanegra Cremonese.

♂ ad. in abito di nozze, 5 maggio 1893, Voltri (Riviera di Genova).

♂ ad. in abito di nozze, maggio 1893, Sette Morti (Estuario Veneziano).

♂ ad. in abito di nozze, fine maggio 1893, Voltri.

♂ ad. in abito di nozze, 30 maggio 1893, Acquanegra Cremonese.

♂ ad. in abito di nozze, 18 giugno 1895, Reggio di Calabria.

♂ ad. in abito di nozze, 24 maggio 1897, lungo il Ticino a Pavia.

♂ ad. in abito di nozze, 5 giugno 1898, Piano di Sesto (Toscana).

♂ ad. in abito di nozze, 16 giugno 1898, Oristano (Sardegna).

119. Piro-piro gambe lunghe

[*Totanus stagnatilis*, Bechstein].

13 esemplari :

♂ ad., 20 aprile 1893, Valle Zappa (Estuario Veneziano).

♀ ad., 5 aprile 1894, Valle Zappa.

♀ ad., 10 aprile 1896, Valle Riola aperta (Estuario Veneziano).

UCCELLI RARI O PIU DIFFICILI AD AVERSI. 233

♂ ad., 15 maggio 1896, Valle Riola aperta.

♂ ad., 13 maggio 1898, Vicentino.

Gli altri provengono dal Lago di Massaciuccoli (Toscana), ove la specie si mostra abbastanza regolarmente durante il passo di primavera.

120. Pittima minore

[*Limosa lapponica*, Linnaeus].

11 esemplari :

♂ giov., 15 ottobre 1887, Estuario Veneto.

2 ♂ ad. e 2 ♀ ad. ♂ e ♀ giov., 21 settembre, 4, 11 e 29 ottobre 1895, Riola vecchia (Estuario Veneziano).

♂ giov., 5 settembre 1896, Valle Figheri (Veneziano).
ad. e ♂ giov., 18 e 22 settembre 1896, Saca dei Laghi (Estuario Veneziano).

♂ giov., 12 settembre 1897, Massaciuccoli (Toscana).

121. Chiurlotello [*Numenius tenuirostris*, Vieillot].

13 esemplari :

♂ ad., 15 gennaio 1891, contorni di Padova.

♂ ad., 18 agosto 1892, Valle Zappa (Veneziano).

♂ ad., 2 aprile 1894, Riola aperta (Estuario Veneziano).

♂ ad., 15 aprile 1895, Sette Morti (Estuario Veneziano).

♂ ad., 15 marzo 1897, Genova.

♂ ad., maggio 1897, Lodi (Milanese).

♂ ad., dicembre 1897, Girgenti (Sicilia).

♂ ad., 5 dicembre 1897, Reggio di Calabria.

♂ ad., 23 marzo 1898, Maccarese (Roma).

♂ ad., 28 marzo 1898, Sorso (Sardegna).

2 ♂ ad., 5 aprile 1898, Massaciuccoli (Toscana).

♂ ad., 18 aprile 1898, Foggia (Puglie).

Questa specie si trova molto più frequentemente nell'Italia centrale e meridionale che non nella settentrionale, ove è affatto accidentale e molto rara.

122. Chiurlo piccolo[*Numenius phaeopus*, Linnaeus].

12 esemplari :

♂ ad. e 2 ♀ ad., 3 aprile 1897, Cremonese (Lombardia).

Il Ferragni, da cui ebbi questi esemplari, dice che nel Cremonese il Chiurlo piccolo è specie accidentale e molto rara. Gli altri individui provengono dal Veneziano, Padovano, Piemonte, Roma, Calabria, Sardegna e Sicilia.

123. Pollo sultano [*Porphyrio caeruleus* (Linnaeus)].

8 esemplari :

♂ e ♀ ad., 18 gennaio e 5 febbraio 1897, paludi di Capitanata (Puglie).

♀ ad., 15 marzo 1897, Massaciuccoli (Toscana).

Il Prof. Squinabol, che fu parecchi anni in Puglia, mi riferì che il Pollo sultano si trova con facilità in quelle paludi specialmente d'attorno al Lago di Lesina, vi arriverebbe nel marzo-aprile ripartendo dopo aver nidificato e ne rimarrebbero soltanto poche coppie isolate durante l'inverno.

Gli altri esemplari della mia Collezione provengono dalla Sicilia e Sardegna, ove la specie è frequente.

124. Gru [*Grus communis* (Linnaeus)].

3 esemplari :

♂ ad., novembre 1882, Veneziano.

♂ ad., 21 marzo 1886, Padovano.

♂ ad., 7 gennaio 1897, Valle Morosina (Estuario Padovano).

125. Airone bianco [*Herodias alba* (Linnaeus)].

1 esemplare :

♀ ad., 28 gennaio 1888, Valle Morosina (Estuario Padovano).

126. Garzetta [*Herodias garzetta* (Linnaeus)].

3 esemplari :

♂ ad., maggio 1879, contorni di Padova.

♂ ad., 21 agosto 1894, Riola vecchia (Veneziano).

♂ ad., 1 maggio 1898, Valli Veronesi.

127. Cicogna bianca [*Ciconia alba* (Linnaeus)].

3 esemplari :

♂ ad., giugno 1877, Monselice (Padovano).

♂ ad., maggio 1883, Val Corba (Padovano).

♂ ad., 9 aprile 1893, Camposampiero (Padovano).

128. Cicogna nera [*Ciconia nigra* (Linnaeus)].

2 esemplari :

♂ ad., aprile 1863, alle Cascine a Firenze.

♂ giov., 20 settembre 1884, Monselice (Padovano).

129. Mignattajo [*Plegadis falcinellus* (Linnaeus)].

10 esemplari :

♀ ad., settembre 1879, Valle Pierimpìè (Estuario Veneziano).

♂ ad., 2 novembre 1881, Estuario Veneto.

♂ ad., 10 aprile 1887, Padovano.

♂ e ♀ ad., 10 maggio 1889, Onara (Padovano).

♂ ad., 22 maggio 1897, contorni di Torino.

Gli altri provengono dalle Puglie, ove è specie frequente durante il passo primaverile.

130. Spatola [*Platalea leucorodia*, Linnaeus].

1 esemplare :

15 aprile 1898, Ducaletto (Laguna di Venezia).

131. Fenicottero[*Phoenicopterus roseus* (Linnaeus)].

3 esemplari :

♂ ad., 18 aprile 1890, Valle Zappa (Veneziano).

♂ ad., 1 marzo 1896, Tre Porti (mare di Venezia).

♂ ad., 22 ottobre 1896, Caorle (Veneziano).

132. Oca selvatica [*Anser cinereus* (Linnaeus)].

1 esemplare :

♂ giov., marzo 1895, Ronco d'Adige (Veronese).

133. Oca a faccia bianca[*Branta leucopsis* (Bechstein)].

1 esemplare :

♂ ad., 23 gennajo 1891, Pratiarcati di Bovolenta (Padovano).

134. Oca colombaccio[*Branta bernicla* (Linnaeus)].

2 esemplari :

♂ ad., 8 marzo 1891, Valli di Piove di Sacco (Padovano).

♂ giov., 28 ottobre 1895, Sette Morti (Estuario Veneziano).

135. Cigno reale [*Cygnus olor* (Gmelin)].

1 esemplare :

♀ giov., 18 marzo 1897, fiume Adige (Veronese).

136. Cigno selvatico[*Cygnus musicus* (Linnaeus)].

2 esemplari :

♂ ad., gennajo 1867, Valle Millecampi (Estuario Padovano).

♂ ad., 18 gennajo 1891, Riola Aperta (Veneziano).

137. Cigno minore [*Cygnus Bewicki* (Yarrell)].

1 esemplare :

♂ semi-ad., 15 gennajo 1891, sul Brenta presso Corte (Padovano).

138. Volpoca [*Tadorna cornuta* (Linnaeus)].

6 esemplari :

♂ e ♀ ad., gennajo 1879, Valle Morosina (Estuario Padovano).

♂ ad., dicembre 1883, S. Angelo (Veneziano).

♂ ad., 2 settembre 1893, Riola Aperta (Veneziano).

♀ ad., 2 gennajo 1898, Burano (Veneziano).

L'altro esemplare è di Sardegna, ove la specie è abbastanza frequente.

139. Canapiglia

[*Chaulelasmus streperus* (Linnaeus)].

25 esemplari :

Questi esemplari provengono dal Veneziano, Lombardia, Piemonte, Toscana, Romagna, Puglie, Calabria, Sardegna e Sicilia e furono colti nei mesi di agosto, settembre, ottobre, dicembre, gennajo e marzo. È specie poco comune, che si ritrova più facilmente nell' Estuario Veneto ed in Toscana.

140. Anatra marmorizzata

[*Marmaronetta angustirostis* (Ménétries)].

1 esemplare :

♂ ad., luglio 1892, Lago di Massaciuccoli (Toscana).

141. Fistione turco [*Callichen rufinus* (Pallas)].

14 esemplari :

♀ ad., gennajo 1883, Valle Figheri (Veneziano).

♂ ad., dicembre 1888, mare di Savona (Liguria).

♂ ad., 8 marzo 1892, Valle Zappa (Veneziano).

♂ 2 ♀ ad., 26 dicembre 1897, sul Po a Cremona (Lombardia).

♂ ad., 31 dicembre 1897, sul Po presso Torino.

2 ♂ ad., 31 dicembre 1897, Treviglio (Bergamasco).

♂ e ♀ ad., 3 marzo 1898, Valli di Portogruaro (Veneziano).

♀ ad., 3 aprile 1898, sul Po presso Torino.

Altri due provengono dalle paludi di Roma dove non deve essere molto raro durante l'inverno, e l'altro dalla Sicilia, qui il *C. rufinus* è uccello abbastanza comune.

142. Moretta grigia [*Fuligula marila* (Linnaeus)].

28 esemplari :

♂ ad., 5 febbrajo 1881, Valle Morosina (Estuario Padovano).

♀ ad., 4 gennajo 1887, Bovolenta (Padovano).

♀ giov., 10 gennajo 1890, Barletta (Puglie).

♀ giov., 5 novembre 1893, Bari (Puglie).

♂ giov., 6 dicembre 1893, Isola d'Elba (Toscana).

♀ giov., 4 gennajo 1894, sul Po presso Torino.

♂ ad., 8 gennajo 1894, Valle Morosina.

♀ giov., 18 febbrajo 1895, Oristano (Sardegna).

♂ ad., 2 ♀ ad., ♀ semi-ad. e ♀ giov., 10 e 13 gennajo 1896, Avesa presso Fusina e Valle Primeposte (Estuario Veneziano).

♂ ad., marzo 1896, mare di Nervi (Liguria).

3 ♂ giov., 23 novembre 1896, Valle Zappa (Veneziano).

♂ semi-ad., 30 novembre 1896, sul Po presso Cremona (Lombardia).

2 ♂ giov. e 2 ♀ giov., 4 dicembre 1896, Val de Bon (Veneziano).

♀ ad., 9 febbrajo 1897, Valle Millecampi (Estuario Padovano).

♀ giov., 6 novembre 1897, Catania (Sicilia).

♂ giov., 18 novembre 1897, Reggio di Calabria.

UCCELLI RARI O PIU' DIFFICILI AD AVERSI. 239

- ♂ semi-ad., 3 gennajo 1898, Massaciucoli (Toscana).
 ♀ giov., 4 gennajo 1894, sul Po a Torino.
 ♂ ad., 10 gennajo 1898, Valle Millecampi.

143. Quattr'occhi [*Clangula glaucion* (Linnaeus)].

22 esemplari :

Quindici ♂ ad., che conservo, provengono dal Veneziano, Padovano, Torino, Pavia, Roma, Napoletano, Puglie, Reggio di Calabria, Sicilia e Sardegna.

Gli individui giovani sono molto più comuni.

144. Moretta codona

[*Harelda glacialis* (Linnaeus)].

17 esemplari :

- ♂ ad., 8 gennajo 1876, mare di Nizza.
 ♂ giov., ottobre 1879, Valle Pierimpìè (Estuario Veneziano).
 ♂ ad. e ♂ giov., 14 novembre 1887, Valle Zappa (Veneziano).
 ♀ giov., 25 novembre 1888, Canal di Piove (Laguna di Venezia).
 ♀ semi-ad., 10 dicembre 1890, Padovano.
 giov., 28 ottobre 1894, Riola Aperta (Veneziano).
 ♂ semi-ad., 3 gennajo 1895, Padovano.
 2 ♂ giov. e ♀ giov., 2 e 4 dicembre 1895, Saca dei Laghi e Sette Morti (Estuario Veneziano).
 ♀ giov., 9 dicembre 1896, Forte S. Angelo (Laguna di Venezia).
 ♂ ad., 15 novembre 1897, Grado (Gorizia).
 ♂ giov. 17 novembre 1897, mare di Genova.
 ♂ ad., 20 novembre 1897, Comacchio (Ferrara).
 ♂ giov., 1 gennajo 1898, Alberoni (Laguna di Venezia).
 ♂ giov. 8 ottobre 1898, Como (Lombardia).

145. Edredone [*Somateria mollissima* (Linnaeus)].

3 esemplari :

♂ ad., inverno 1894, Lago di Verzentino presso Amendola (Linea Foggia-Manfredonia, Puglie).

♂ e ♀ ad., 28 dicembre 1897, Tre Porti (mare di Venezia).

L'esemplare del Lago di Verzentino, che acquistai dal Prof. Squinabol, è la cattura più meridionale che io conosca.

146. Orco marino [*Oedemia fusca* (Linnaeus)].

18 esemplari :

♀ ad., 25 ottobre 1884, Valle Sora (Veneziano).

♂ giov., 25 ottobre 1893, Sette Morti (Estuario Veneziano).

♀ ad., 9 novembre 1894, S. Elisabetta a mare (Venezia).

♀ ad. e ♀ giov., 12 e 15 dicembre 1895, Forte S. Angelo (Laguna di Venezia).

♂ giov., 13 gennajo 1896, Val de Bon (Veneziano).

♂ giov., 20 novembre 1896, Lago di Massaciuccoli (Toscana).

♂ giov., 25 novembre 1896, Cremona (Lombardia).

♂ ad., 5 dicembre 1896, Lago di Lesina (Puglie).

♂ ad., 7 gennajo 1897, Lago di Massaciuccoli.

♂ e ♀ ad., 29 ottobre 1897, Alberoni (Laguna di Venezia).

♂ giov., 8 novembre 1897, sul Po a Torino.

♂ semi-ad., 18 novembre 1897, Reggio di Calabria.

♂ e ♀ semi-ad. e | giov., 28 gennajo 1898, S. Elisabetta a mare (Veneziano).

♀ ad., 10 novembre 1898, Lago di Garda.

147. Orchetto marino [*Oedemia nigra* (Linnaeus)].

6 esemplari :

♀ ad. e ♂ giov., 11 e 13 novembre 1895, Riola Aperta e Sette Morti (Estuario Veneziano).

UCCELLI RARI O PIU DIFFICILI AD AVERSI. 241

♂ e ♀ ad., 9 aprile 1897, Alla foce dell' Adda nel Po (Cremonese).

♂ ad., 5 marzo 1898, Stagno di Oristano (Sardegna).

♂ ad., 12 aprile 1898, Lago di Varese (Lombardia).

148. Gobbo rugginoso

[*Erismatura leucocephala* (Scopoli)].

5 esemplari :

♂ giov., 25 febbrajo 1884, Padovano.

♂ e ♀ ad., 12 gennajo 1896, Canal di Piove (Laguna di Venezia).

Gli altri due sono di Sardegna, ove la specie è abbastanza comune.

149. Smergo maggiore

[*Mergus merganser*, Linnaeus].

3 esemplari :

♂ ad., ottobre 1885, Val Corba (Padovano).

♂ ad., 14 febbrajo 1891, Meledo sul Brendola (Vicentino).

♀ ad., dicembre 1895, Val Cantarana (Veneziano).

150. Marangone

[*Phalacrocorax carbo* (Linnaeus)].

5 esemplari :

♂ ad., 18 ottobre 1896, Val Zerpa (Veronese).

♂ ad., 30 ottobre 1897, Peta de Bó (laguna di Venezia).

♂ ad., 4 aprile 1898, sul Po a Torino.

♀ giov., 8 agosto 1898, Botenigo (laguna di Venezia).

♂ ad., 16 ottobre 1898, Sette Morti (Estuario Veneziano).

151. Marangone col ciuffo

[*Phalacrocorax graculus* (Linnaeus)].

11 esemplari :

♀ giov., 29 dicembre 1897, Tre Porti (mare di Venezia)

♂ ad., 18 febbraio 1898, Sette Morti (Estuario Veneziano).

Gli altri esemplari provengono dalla Costa Adriatica Dalmata, ove è uccello frequente, mentre i due colti nel Veneziano sono i primi finora presi nel Veneto.

152. Pellicano [*Pelecanus onocrotalus*, Linnaeus].

1 esemplare :

♂ s.-ad., 25 gennajo 1888, Bovolenta (Padovano).

153. Sula [*Sula bassana* (Linnaeus)].

1 esemplare :

♀ giov., 15 ottobre 1898, mare di Reggio Calabria.

Se non erro, questo sarebbe il terzo individuo colto in Italia.

154. Beccapesci maggiore

[*Thalasseus caspius* (Pallas)].

2 esemplari :

♂ ad., inverno 1835, Estuario Veneto.

♂ ad., 2 maggio 1895, Veneziano.

155. Beccapesci

[*Actocheilidon sandwicensis* (Latham)].

15 esemplari :

3 ♂ ad., ♂ semi-ad., ♂ giov., e 4 ♀ giov., 3, 5, 6 e 8 agosto 1894, Tre Porti (mare di Venezia) e Ponta longa (laguna di Venezia).

♀ semi-ad. e ♀ giov., 1 settembre 1894, Tre Porti.

♂ ad., 5 maggio 1895, Tre Porti.

2 ♂ ad., 17 e 18 agosto 1895, Tre Porti.

♂ ad., 20 novembre 1895, Tre Porti.

156. Rondinedi mare coda lunga[*Sterna macrura*, Naumann].

1 esemplare :

♂ ad., 5 maggio 1897, Bocche del Po del Bastimento (Rodigino).

157. Rondine di mare zampe nere[*Gelochelidon nilotica* (Gmelin)].

7 esemplari :

♂ ad., 17 maggio 1888, Risaie Zimella presso Lonigo (Vicentino).

♂ ad., 10 maggio 1893, Lago di Massaciucoli (Toscana).

♂ ad., 8 maggio 1895, Riola Aperta (Estuario Veneziano).

♂ ad., 31 maggio 1896, Riola Aperta.

2 ♂ ad. primav., e ♂ ad. *inverno*, luglio 1897, Lago di Massaciucoli.

È singolare come anco durante l'estate si trovano esemplari colla testa bianca, cioè nell'abito invernale, uno di consimile è nella Raccolta Centrale Italiana a Firenze colla data 1 maggio 1879 da Cagliari.

158. Rondine di mare piombata[*Hydrochelidon hybrida* (Pallas)].

8 esemplari :

♂ ad., 25 maggio 1892, Val Zappa (Veneziano).

♂ ad., 15 giugno 1894, Cremona (Lombardia).

♂ ad., 13 maggio 1896, Lago di Massaciucoli (Toscana)

3 ♂ ad., 15 maggio 1896, Valle di Riola Aperta e Lago di Raina.

♂ ad., 22 maggio 1896, Cavanella d'Adige (Rodigino).

♂ ad., 10 maggio 1898, Zevio (Veronese).

159. Mignattino ali bianche[*Hydrochelidon leucoptera* (Schinz)].

21 esemplari :

♂ ad., 12 aprile 1888, Monselice (Padovano).

3 ♂ ad., 7 maggio 1889, Valli di Piove di Sacco (Padovano).

♂ e ♀ ad., 28 aprile 1892, Val Zappa (Veneziano).

♂ e ♀ ad., 8 maggio 1892, Val Zappa (Veneziano).

♀ giov. dopo la muta di primav., 17 giugno 1897 Cremonese (Lombardia).

♂ ad., 2 maggio 1898, Riva (Trentino).

♀ semi-ad., 12 maggio 1898, Estuario Veneto.

♀ semi-ad., 15 maggio 1898, sul Po a Torino.

♂ ad., 18 maggio 1898, Como (Lombardia).

♂ ad., 20 maggio 1898, Veronese.

Gli altri esemplari provengono dalla Liguria, Toscana, Marche, Calabria, Sicilia e Sardegna.

160. Gabbianello [*Hydrocolaeus minutus* (Pallas)].

24 esemplari :

giov., 7 novembre 1887, Veneziano.

♂ giov., 24 agosto 1893, Sette Morti (Estuario Veneziano).

♂ ad., 25 aprile 1895, Riola Aperta (Veneziano).

♂ ad., 18 maggio 1896, S. Angelo (laguna di Venezia).

♂ giov. dopo la 1^a muta, 3 settembre 1896, Tre Porti (mare di Venezia).

♂ ad., 4 gennaio 1897, Valle Millecampi (Estuario Padovano).

♂ ad., 4 aprile 1897, Lago di Massaciuccoli (Toscana).

♂ di due anni, 10 ottobre 1897, Val Figheri (Veneziano).

♂ ad., 7 gennaio 1898, mare di Genova.

♀ semi-ad., 12 gennaio 1898, Lago di Massaciuccoli.

♀ di due anni, 15 gennaio 1898, mare di Ancona.

♀ ad., 18 aprile 1898, Lecco (Lombardia).

UCCELLI RARI O PIU DIFFICILI AD AVERSI. 243

- ♀ ad., 18 aprile 1898, Val Zappa (Veneziano).
 ♂ ad., 27 aprile 1898, Marano (Udinese).
 ♂ ad., 2 maggio 1898, Lago di Massaciuccoli.
 ♂ ad., 2 maggio 1898, Val Zerpa (Veronese).
 ♂ e ♀ ad., 5 maggio 1898, Botenigo (laguna di Venezia).
 ♀ di due anni, 5 maggio 1898, Savona (Liguria).
 ♀ ad., 5 maggio 1898, Lago di Garda (costa Bresciana).
 ♂ e ♀ ad., 8 maggio 1898, Reggio di Calabria.
 ♂ di due anni; 16 maggio 1898, Roma.
 ♂ di due anni, fine maggio 1898, Lago di Varese (Lombardia).

161. Gabbiano roseo[*Gelastes Genei* (Lichtenstein)].

5 esemplari :

♂ ad. e ♂ giov., 18 dicembre 1896, Lago di Lesina (Puglie).

♂ ad., 15 maggio 1897, Saca degli Scardovari (limite di Provincia tra Rovigo e Ferrara).

Gli altri due sono esemplari di Sardegna, ove tale specie è bensì localizzata, ma abbastanza frequente.

162. Gabbiano corso [*Larus Audouini*, Payraudeau].

1 esemplare :

♂ ad., 26 agosto 1883, Portoferraio (Isola d'Elba).

163. Gabbiano glauco [*Larus glaucus*, Fabricius].

1 esemplare:

♂ giov., 18 ottobre 1898, golfo di Cagliari (Sardegna).

164. Zafferano [*Larus fuscus*, Linnaeus].

1 esemplare:

♂ *valde* ad., 15 gennajo 1890, Golfo di Genova.

165. Gabbiano tridattilo[*Rissa tridactyla* (Linnaeus)].

1 esemplare :

♂ giov. avanti la 1^a muta, 21 novembre 1890, Locara (Vicentino).**166. Stercorario mezzano**[*Stercorarius pomatorhinus* (Temminck)].

3 esemplari :

giov., 9 settembre 1895, Lago dei Paltani (Estuario Veneziano).

♀ ad., 11 ottobre 1897, Lago di Lesina (Puglie).

♂ giov., 14 novembre 1897, Spezia (Liguria).

167. Labbo [*Stercorarius crepidatus* (Banks)].

2 esemplari :

♂ ad., 5 agosto 1897, sul Po a Torino.

♂ ad., 2 luglio 1898, mare di Venezia.

168. Labbo codalunga[*Stercorarius parasiticus* (Linnaeus)].

10 esemplari :

giov. *var. scura*, ottobre 1882, sul Brenta (Padovano).giov. avanti la 1^a muta, dicembre 1891, Valle Zappa (Veneziano).♂ e ♀ giov., 2 ♂ giov. e 2 ♀ giov. *var. scura*, 4, 6 e 16 settembre 1898, Lago di Garda.

♂ e ♀ giov., 19 ottobre 1898, Portoferraio (Isola d'Elba).

169. Berta maggiore [*Puffinus Kuhli* (Boie)].

5 esemplari :

♂ ad., 18 novembre 1891, Valle Morosina (Estuario Padovano).

UCCELLI RARI O PIU DIFFICILI AD AVERSI. 247

3 ♂ ad. e ♀ ad., maggio 1897, Alto mare davanti a Caorle (Venezia).

170. Berta minore [*Puffinus yelkouan* (Acerbi)].

6 esemplari :

♂ ad., 18 aprile 1895, Valle di Riola vecchia (Veneziano).

♀ ad., 28 dicembre 1897, Porto di Chioggia (Veneziano).

Gli altri individui provengono dalla Costa Dalmata, ove è specie frequente.

171. Uccello delle tempeste

[*Procellaria pelagica*, Linnaeus].

♂ ad., aprile 1878, Isola Vacca (Sardegna).

172. Polcinella di mare

[*Fratereula arctica* (Linnaeus)].

8 esemplari :

♂ giov., gennajo 1883, Colli di Galzignano (Padovano).

♂ ad., ottobre 1883, Valle Pierimpiè (Estuario Padovano).

♂ e ♀ ad., 15 novembre 1896, golfo di Genova.

♂ ad., 6 dicembre 1896, mare di Ancona.

♂ giov., dicembre 1896, S. Angelo (laguna di Venezia).

♂ ad., 5 gennajo 1897, Malamocco (laguna di Venezia).

♂ giov., 6 gennajo 1897, mare di Civitavecchia (Romano).

173. Gazza marina [*Alca torda*, Linnaeus].

4 esemplari :

♀ giov., 15 febbrajo 1891, Val Zappa (Veneziano).

ad. inv., marzo 1894, Valli di Piove di Sacco (Padovano).

♂ ad., 18 maggio 1895, Porto di Malamocco (mare di Venezia).

♂ ad., 27 luglio 1895, Tre Porti (mare di Venezia).

174. Uria [*Lomvia troile* (Linnaeus)].

3 esemplari :

♂ ad., 18 aprile 1891, Malghera (Veneziano).

♂ e ♀ ad., 15 dicembre 1897, Portofino (Liguria).

175. Strolaga maggiore[*Colymbus glacialis*, Linnaeus].

1 esemplare :

♀ giov., 30 dicembre 1898, Lago di Garda.

176. Strolaga mezzana[*Colymbus arcticus* (Linnaeus)].

18 esemplari :

Questi esemplari dei quali nessuno è ♂ ad. in completo abito di nozze provengono dalla Dalmazia (3), dal Veneziano (9), dal Lago di Garda (1), dalla Lombardia (1), dalle Marche (1), dalla Toscana (1), dalla Calabria (1) e dalla Sardegna (1).

177. Strolaga minore[*Colymbus septentrionalis* (Linnaeus)].

11 esemplari :

Questi esemplari, dei quali nessuno è ♂ ad. in abito perfetto di nozze provengono dal Veneziano, Lago di Garda, Piemonte, Marche, Toscana, Puglie, Sicilia e Sardegna.

178. Svasso dal collo rosso[*Podiceps griseigena* (Boddaert)].

24 esemplari :

♂ giov., 28 novembre 1887, Val Zappa (Veneziano).

♂ e ♀ ad., 23 ottobre 1893, Valle Zappa.

♂ ad. primav., marzo 1894, Campalto presso Mestre (Veneziano).

UCCELLI RARI O PIU DIFFICILI AD AVERSI. 249

♂ giov. dopo la prima muta, agosto 1894, S. Erasmo (mare di Venezia).

giov. dopo la prima muta, 18 ottobre 1894, Sette Morti (Estuario Veneziano).

♂ e ♀ giov. dopo la prima muta, 2 agosto 1895, Sette Morti.

3 ♂ di cui due dopo la muta di primavera ed il terzo dopo la prima muta, 4 e 25 settembre 1895, Riola Aperta (Veneziano).

♂ ad. e ♀ giov. dopo la muta di primavera, 6 dicembre 1896, Sette Morti.

♂ dopo la muta di primavera, 20 agosto 1897, mare di Taranto.

♂ dopo la muta di primavera, 2 settembre 1897, Reggio di Calabria.

♂ avanti la prima muta. 27 settembre 1897, Milano.

♀ ad., 4 ottobre 1897, Porto d'Anzio (Roma).

♀ giov., 14 ottobre 1897, Lago di Lentini (Sicilia).

♂ giov., 28 ottobre 1897, Veneziano.

♂ giov., 6 novembre 1897, mare di Bari.

♀ ad., 9 novembre 1897, Botenigo (laguna di Venezia).

♂ giov., 29 novembre 1897, Tre Porti (mare di Venezia).

♂ giov., 6 novembre 1898, sul Po a Torino.

♀ ad., 19 novembre 1898, Stagno di Oristano (Sardegna).

179. Svasso cornuto

[*Podiceps auritus* (Linnaeus)].

2 esemplari :

♀ giov., 9 dicembre 1897, Riola Aperta (Veneziano).

♂ ad., 8 febbrajo 1898, Lago di Massaciuccoli (Toscana).

Padova (Italia), li 31 dicembre 1898.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornis - Journal of the International Ornithological Committee.](#)

Jahr/Year: 1897

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Oddi Ettore Arrigoni Degli

Artikel/Article: [ELENCO DEGLI UCCELLI RARI PIU DIFFICILLI AD AVERSI 199-249](#)