

NOTES

SUR

QUELQUES OISEAUX HYBRIDES OU A PLUMAGE ANORMAL

ET OBSERVATIONS BIOLOGIQUES

PAR

M. CH. VAN KEMPEN

Ma collection d'histoire naturelle vient de s'enrichir d'une pièce excessivement rare : un mâle hybride Canard dont le père est un Canard sauvage et la mère un Harle Bièvre :

Anas boschas (L.) ♂ × *Mergus merganser* (L.) ♀

Ce Palmipède a été tué le 19 août 1898, en Poméranie, sur le lac Schaal.

Voici la description de son plumage : dessus de la tête noir bronzé ; tour des yeux et cou blancs, parsemés de petites plumes noires et rousses ; haut du dos d'un cendré blanchâtre, pointillé de noir ; le noir est plus marqué vers le bas du dos ; sus-caudales noires à reflets verts, terminées de blanc ; sur les côtés, plumes roussâtres avec grandes taches brun noir ; ailes blanches terminées de gris ; dessous du cou blanc, abdomen blanc, strié de petites plumes roussâtres, formant collier assez large autour du cou. Bec de l'*Anas*, de couleur brune ; pattes d'un rouge orange ; iris brun.

Dans le courant de l'année 1898, j'ai pu également me procurer les hybrides suivants :

Pinson ordinaire avec Pinson d'Ardennes.*Fringilla caelebs* (L.) ♂ × *Fringilla montifringilla* (L.) ♀.

Tête gris brun mélangé d'olivâtre et parsemé de petites plumes noires, dessus du dos de la même couleur, couvertures supérieures des ailes jaunes, avec une large bande transversale blanche sur les couvertures moyennes, une seconde bande transversale, mi-partie blanche, mi-partie jaune au milieu de l'aile, qui est noire, bordée de jaune verdâtre; aux troisième et quatrième rémiges, la bordure est d'un jaune plus blanchâtre. Les rectrices sont noires; les quatre premières les plus extérieures de chaque côté sont blanches avec le tiers inférieur noir: couverture de la queue jaune avec quelques petites plumes noires. Dessous du corps: gorge, devant du cou, poitrine et abdomen d'un roux orangé; joues et côté du cou gris bleuâtre; croupion blanc; bec bleuâtre; pattes olivâtres; iris brun.

Ce Passereau est un mâle capturé en 1896, en Allemagne.

Linotte ordinaire avec Verdier*Cannabina linota* (L.) ♂ × *Ligurinus chloris* (L.) ♀.

Femelle adulte, provenant de Rottingdean, comté de Sussex, en Angleterre.

Parties supérieures brunes lavées de roussâtre, poitrine jaunâtre, parsemée de brun roux, ailes brunes avec les barbes externes roussâtres; couvertures de la queue vert jaunâtre; queue brune bordée fortement de vert olive. Bec du *Ligurinus chloris*; pattes couleur de chair; iris brun foncé.

Linotte ordinaire avec Linotte à bec jaune*Cannabina linota* (Gr.) ♂ × *Cannabina flavirostris* (L.) ♀.

Mâle adulte tué le 12 novembre 1896, en Angleterre, à Saltdean, dans le comté de Sussex.

Parties supérieures d'un brun varié de roussâtre; dessous du corps, gorge, devant et côtés du cou d'un roux jaunâtre,

NOTES SUR QUELQUES OISEAUX HYBRIDES. 253

varié de quelques petites plumes brunes au cou seulement ; régions parotiques jaunâtres ; dessus du corps brun varié de roussâtre ; rémiges brunes, blanches sur les barbes externes ; queue brune ; rectrices latérales bordées de blanc en dehors et en partie de cette couleur sur les barbes internes ; bec jaune ; pieds d'un brun rougeâtre ; iris brun.

Tétras urogalle

Tetrao urogallus (L.).

Vieille femelle, stérile, ayant en partie la robe du mâle, tuée en mars 1898, dans le Jutland.

Tête, cou d'un cendré bleuâtre parsemé de petites plumes noires, dos de la même couleur ; ailes rousses avec les petites et moyennes couvertures terminées de blanc ; queue noirâtre, les deux plumes du milieu rayées en zigzag de roux et terminées de blanc. Dessous blanc, mélangé de roux sous la tête ; cendré bleuâtre parsemé de petites plumes noires au cou ; sur la poitrine, formant collier, une large bande de noir bleuâtre, tacheté de plumes rousses ; abdomen blanc avec quelques plumes noires ; croupion blanc ; plumes des pattes cendrées ; bec blanchâtre.

Pinson ordinaire

Fringilla caelebs (L.).

J'ai pu obtenir, le 5 novembre 1898, une très jolie variété de Pinson ordinaire, capturée au village de Blendecques, près de Saint-Omer. Voici la description de son plumage :

Mâle adulte : front gris cendré, légèrement teinté de jaunâtre ; occiput et nuque d'un gris clair tirant sur le blanc, s'étendant sur le haut et les côtés du cou en formant un demi-collier ; dos d'un jaune d'or très vif ; dessous du corps d'un rose très tendre ; couvertures supérieures des ailes noires ; inférieures blanches ; grandes plumes blanches, bordées de noir ; les autres plumes, noires ; queue blanche.

Merle noir*Merula nigra* (Leach).

Au mois de décembre 1898 une variété tout à fait albine du Merle noir a été prise dans un jardin de la ville de Boulogne-sur-Mer.

A la même époque une capture intéressante a été faite dans le Pas-de-Calais : un Milan royal (*Milvus regalis* Briss.) a été tué dans la forêt d'Éperlecques, à 10 kilomètres de Saint-Omer. Cette espèce de Rapace n'est tirée qu'accidentellement dans notre région.

Un fait qui m'a frappé l'été dernier viendra s'ajouter à tous ceux qui ont été cités pour démontrer que l'amour maternel est un des instincts les plus marqués chez l'Oiseau. Il rend hardies et audacieuses les espèces les plus sauvages et les plus timides d'ordinaire.

Lorsqu'on s'avance auprès du nid d'un Passereau, le mâle s'envole sur un arbuste voisin, avertissant, par ses cris d'alarme, sa femelle de l'approche d'un danger ; si vous venez à découvrir le nid, les parents, battant des ailes, ne connaissent plus la crainte et volent çà et là autour de vous.

On a souvent rapporté la manière d'agir de la mère Perdrix, feignant d'être blessée, afin d'attirer l'attention et de sauver sa couvée de tout péril. Bien des fois j'ai été témoin de ce fait si remarquable. Au mois de juin 1898, je rencontrai, au détour d'un sentier, une Perdrix femelle, avec ses petits âgés de deux ou trois jours. Quand elle m'aperçut, elle fit semblant de s'envoler avec difficulté et ne s'éloigna de ma présence que lorsqu'elle eut réuni tous les perdreaux et qu'aucun piaillement ne se fit plus entendre.

A la même époque, je suivais l'une des voies de la forêt de Clairmarais, près de Saint-Omer, quand sortit d'un

NOTES SUR QUELQUES OISEAUX HYBRIDES. 255

des fossés qui la longeaient, une Faisane, les ailes étendues. Elle se précipita sur moi et je vis de tous côtés les faisandeaux s'enfuir dans les broussailles. La mère demeura non loin de moi, et, par ses appels successifs, rassembla sa couvée cachée sous les feuilles, puis disparut dans l'épaisseur du fourré. Il fallut que l'amour maternel fût bien vif pour décider une Faisane, d'ordinaire si craintive, à venir braver un ennemi qu'elle évite et fuit ordinairement!

Je possède à la campagne plusieurs Sorbiers des Oiseaux (*Sorbus aucuparia*). En septembre ils attirent Fauvettes babillardes, Fauvettes des jardins, Hypolaïs polyglottes, Mésanges charbonnières et Mésanges bleues. Souvent je m'assieds au milieu de ces arbustes et j'examine les disputes de ces charmants Oiseaux pendant leur repas. Or, à force de me voir dans leur voisinage, ces Passereaux s'étaient tellement familiarisés qu'ils venaient manger les sorbes presque contre moi; je n'aurais eu qu'à étendre la main pour m'en emparer.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornis - Journal of the International Ornithological Committee.](#)

Jahr/Year: 1897

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Kempen M. Ch. van

Artikel/Article: [NOTES SUR QUELQUES OISEAUX HYBRIDES
OU A PLUMAGE ABNORMAL ET OBSERVATIONS
BIOLOGIQUES 251-255](#)