

Grenadierweber (<i>Oryx-Weber</i>) (<i>Euplectes oryx</i>)	16—20
Goldweber (<i>Hyphantornis textor</i>)	P. 18
Fuchsweber (<i>Hyphantornis castaneofuscus</i>)	P. 20
Maskenweber (<i>Hyphantornis abyssinicus</i>)	P. 36

III. Verschiedene Insectenfresser.

Spottdrossel (<i>Mimus polyglottus</i>)	30—50
Sonnenvogel (<i>Liothrix luteus</i>)	15—30
Hüttensänger (<i>Sialia sialis</i>)	P. 15—20
Heherdrossel (<i>Garrulax sinensis</i>)	30
Weissohrbühl (<i>Pycnonotus leucotis</i>)	20—24
Schopfbühl (<i>Pycnonotus jocosus</i>)	25
Goldsteiss-Bühl (<i>Pycnonotus nigricans</i>)	15—20
Rothsteiss-Bühl (<i>Pycnonotus haemorrhous</i>)	20—25
Brillenhordenvogel (<i>Agelaius xanthocephalus</i>)	24
Sumpfhordenvogel (<i>Epaulettenstaar</i>) (<i>Agelaius phoeniceus</i>)	9—12
Seidenstaar (<i>Molothrus sericeus</i>)	9
Papierling (<i>Dolichonyx oryzivora</i>)	10
Gelbkopf-Staar (<i>Leistes icterocephalus</i>)	20
Grau-Staar (<i>Leistes badius</i>)	30
Graukopfmaina (<i>Acridotheres malabaricus</i>)	40
Haubenmaina (<i>Acrid. cristatellus</i>)	20
Goldstirnblattvogel (<i>Phyllornis aurifrons</i>)	60—100
Pö (<i>Prothemadera Novae Seelandiae</i>)	100

IV. Rabenvögel.

Blauheher (<i>Cyanurus cristatus</i>)	25
Blauester (<i>Cyanopica cyana</i>)	100
Gehäubter Blaurabe (<i>Cyanocorax pileatus</i>)	80
Schwarzblauer Heher (<i>Cyanocorax cyanomelas</i>)	80
Flötenvogel (<i>Gymnorhina leuconota</i>)	40

V. Pfefferfresser.

Schwarzlatz-Arassari (<i>Pteroglossus Gouldi</i>)	75
Riesen-Tukan (<i>Ramphastus Toko</i>)	80
Orange-Tukan (<i>Ramphastus Temminckii</i>)	80—90
Fischertukan (<i>Ramphastus piscivorus</i>)	200
Riesenfischer (<i>Parhalcyon gigas</i>)	40

VI. Raubvögel.

Gaukler (<i>Helotarsus ecaudatus</i>)	200
Truthahn-Geier (<i>Cathartes aura</i>)	80
Gräbereule (<i>Strix cucularia</i>)	60
Schnee-Eule (<i>Nyctea nivea</i>)	120

VII. Tauben.

Kronentaube (<i>Goura coronata</i>)	P. 200—240
Wonga-Wonga-Taube (<i>Columba picata</i>)	60—80
Nicobartaube (<i>Caloenas nicobarica</i>)	P. 160
Zebra-Täubchen (<i>Chamaepelia passerina</i>)	P. 16—20
Cap-Täubchen (<i>Oena capensis</i>)	P. 15

VIII. Hühnervögel.

Aehrenträger-Pfau (<i>Pavo spicifer</i>)	P. 400
Schwarzrücken-Fasan (<i>Euplocamus melanotus</i>)	P. 160
Japanischer Fasan (<i>Phasianus versicolor</i>)	P. 160
Ohren-Fasan (<i>Crossoptilon auritum</i>)	P. 160
Vieillot's Fasan (<i>Euplocamus Vieilloti</i>)	P. 300
Swinhoe-Fasan (<i>Euplocamus Swinhoei</i>)	P. 160
Lady Amherst-Fasan (<i>Thaumalea Amherstiae</i>)	P. 240

Königsfasan (<i>Phasianus Reevesi</i>)	200
Gebänderter Fasan (<i>Euplocamus lineatus</i>)	P. 240—320
Geierperlhuhn (<i>Numida vulturina</i>)	P. 800
Rüppell's Francolin (<i>Francolinus Rüppelli</i>)	P. 80
Sandhuhn (<i>Pterocles fasciatus</i>)	P. 120

IX. Sumpfrögel.

Marabu (<i>Leptoptilus crumenifer</i>)	60
African. Nimmersatt (<i>Tantalus ibis</i>)	120
Kahlkopf-Ibis	160
Flamingo (<i>Phoenicopterus roseus</i>)	P. 300
Australischer Helm-Casuar (<i>Casuarus galeatus</i>)	800
Emu (<i>Dromaeus Novae Hollandiae</i>)	200

X. Schwimmvögel.

Mandarinen-Ente (<i>Aix galericulata</i>)	P. 100
Wittwen-Ente (<i>Dendrocygna viduata</i>)	P. 80
Sarcidiornis-Ente (<i>Sarcidiornis melanonota</i>)	P. 200
Sporen-Gans (<i>Plectropterus gambensis</i>)	P. 160
Magellan-Gans (<i>Bernicla magellanica</i>)	300
Canada-Gans (<i>Bernicla canadensis</i>)	40
Schwarzer Schwan (<i>Cygnus atratus</i>)	P. 120
Pelican (<i>Pelecanus onocrotalus</i>)	200

Eine neue Gattung und neue Arten aus Südamerika.

Von Hans Graf v. Berlepsch.

Callithraupis. Genus novum Tanagridarum affine generibus *Pyrranga*, *Lamprotes* etc., alis caudaeque brevibus, cauda fere quadrata vel rotundata (nec gradata); rostro elongato crasso, maxilla in basi fere tumida, dein valde compressa (fere ut in genere *Lanio*) apicem versus fortiter curvata et uncinata, dente finali distincto, tomis integris; colore insolito, coerulesco et flavo, sexibus inter se dissimilibus. — Typus: *Pyrranga cyanicter* Vieill.

Basileuterus Cabanisi, Berlepsch sp. nov.

B. vermivorus (ex Brasilia et Argentina) similis, differt colore supra griseo (nec olivaceo-viridi) olivaceo vix tincto, remigum rectricumque marginibus griseis (nec olivaceis), colore subtus pallidior, tectricibus subcaudalibus albis (nec flavis), tectricibus subalaribus quoque albis (nec flavo tinctis), pedibus flavis (nec carneis vel brunneis), alis caudaeque brevioribus. Long. tot. 118, al. 54. 50, cauda 51, rostrum 9. 5, tars. 18. 5 Mm. — Hab: Venezuela (S. Esteban, Puerto Cabello). Ex orig. in Mus. Berlepsch.

Pachyrhamphus intermedius Berlepsch sp. nov.

P. cinamomeo Lawr. ex America centrali similis, differt plaga superciliari griseo-olivacea, colore supra pallidior, rostro minore debiliore. Long. tot. 144, ala 77. 5, cauda 59. 5, rostrum 12. 75, tars. 17. 5 Mm. — Hab: Venezuela (S. Esteban, Puerto Cabello). Ex orig. in Mus. Berlepsch.

Panychlora (sive *Chlorostilbon*) *inexpectata* Berlepsch sp. nov. *P. Haerberlini* Cab. et Heine subsimilis, mandibulae basi (eodem modo) carnea, differt rectricibus omnibus obscure (sed splendide) viridibus (nec chalybeis), cauda minus quam in *P. Haerberlini* furcata, rostro longiore, fronte prasino viridi. Long. tot. 74. 5, cauda 27, ala 47. 5, rostr. 17. 75 Mm. — Hab: Bogota, Nova Granada. Ex. orig. in mus. Berlepsch.

Rundschau.

Die Spechte und ihr Werth in forstlicher Beziehung, von E. F. v. Homeyer. (Frankfurt a. M., Mahlau und Waldschmidt). — Die ziemlich umfangreiche Brochüre richtet sich im Besonderen gegen die Arbeit des Herrn Prof. Altum: „Unsere Spechte und ihre forstliche Bedeutung“. Während dieser Forscher auf Grund zahlreicher während vieler Jahre gesammelten Beweismittel den Spechten eine grössere Schädlichkeit als Nützlichkeit glaubt zusprechen zu müssen, tritt Herr v. Homeyer mit Gegenbeweisen für letztere ein. *Journal für Ornithologie*. No. IV. 1878: Bericht über die III. Jahresversammlung der Allg. Deutsch. Ornith. Gesellschaft. S. 357 — II. Jahresbericht des Ausschusses für Beobachtungsstationen der Vögel Deutschlands. S. 370. — Abgebildet: *Corythaix Fischeri* Rehw. und *Franconinus Hildebrandti* Cab. No. 1 1879: Kronprinz Rudolf von Oesterreich, E. F. v. Homeyer und Brehm, Zwölf Frühlingstage an der mittleren Donau. S. 1—83.

Sharpe, Catalogue of the Passeriformes or Perching Birds in the Collection of the British Museum. Cichlomorphae Pt. I. Containing the Families Campophagidae and Muscipidae. (London 1879). — Bildet den vierten Band des ganzen Werkes und ist in gleicher Weise wie die früheren mit vielen Abbildungen ausgestattet.

A. R.

Schlegel, Vogels van Nederland. 2 uitg. Amsterdam 1878 (mit 53 color. Taf.).

J. Beerbohm, Wanderings in Patagonia, or Life amongst the Ostrich-Hunters. London 1879. 8 Fig.

Adams and Giacomelli, The Bird-world descr. w. pen and pencil. New-York 1878. 8. w. illustr. Rm 23.

Hume and Davison, Revised List of the Birds of Tenasserim. Calcutta 1878, roy. 8. 524 p. Rm 25.

Müller J. On certain variations in the vocal organs of the Passeres. Transl. by J. Bell, with appendix by A. Garrod Oxford 1879. 4. with Illustr. Rm 8.

Cory, a naturalist in the Magalen Islands. With a list of the Birds and other ornithological Notes. Boston 1878 Rm 4.

E. H. Giglioli, Iconografia dell' Avifauna italiana c. Tavole di Alberto Manzella. Firenze 1878 c. segg. — Uscirà in 80 fasc. c. 5. tavole color.

A. Gobin, Les Pigeons de volière, de colombiers, messagers. Paris 1878. 12. c. 46 grav.

Jerdon, Birds of India. Ed. by H. Godwin Austen; with suppl. notes. 3 vols. 1878. 8. w. plates Rm 75.

D. S. Jordan, Manuel of the Vertebrates of the North United States. 2 ed. Chicago 1878. 12. 407. pg.

C. J. Maynard, The Birds of Florida pt. 1—6 New-York 1878 w. plates.

H. Meyer, Beiträge zur Kenntniss des Stoffwechsels im Organismus der Hühner. Königsberg 1878. 8.

H. S.

Nachrichten und Neuigkeiten.

Jahresversammlung der Allgemeinen deutschen Ornith. Gesellschaft.

Zur vorläufigen Benachrichtigung diene, dass die diesjährige Jahresversammlung den Beschlüssen der vorjährigen entsprechend vom 24—26. Mai in Stettin tagen wird. Das von den gewählten localen Geschäftsführern, den Herren Dr. Dohrn und Dr. Bauer in Stettin, entworfene Programm wird der nächsten Nummer des „Centralblatt“ beigelegt werden.

Briefkasten der Redaction.

Manuscripte zum Druck gingen ein von Herrn E. F. v. Homeyer in Stolp und Herrn E. Linden in Radolfzell.

Eingegangene Drucksachen.

E. F. v. Homeyer, Die Spechte und ihr Werth in forstlicher Beziehung. (Mahlau & Waldschmidt, Frankfurt a. M. 1879.)

Schleswig Holsteinische Blätter f. Geflügelzucht. No. 8. Die Vogelwelt. No. 3.

„Der Waidmann“ von R. v. Schmiedeberg No. 12—14. Zoologischer Anzeiger No. 23—25.

Tausch- und Kauf-Verkehr.

Charles Jamrach,

180. St. George's Street, London East.

1 Sumatranisches Rhinoceros 4000 Mark — 1 Riesen-Känguru (Männchen) 320 — 4 Kleine Ponies 32 Zoll hoch à 300 — Rosa Cacadus à 16 — Grosse Gelbhäubige Kakadus à 20 — Amazonen à 20 — Eine sehr grosse Partie Wellensittiche und Zebra Finken soeben eingetroffen. Banks-Cacadu 300 M. [39]

Wilh. Schlüter in Halle a.S.

Naturalien- & Lehrmittelhandlung.
Cataloge gratis und franco. [25]

Vogelbilder aus fernen Zonen.

Atlas der bei uns eingeführten ausländischen Vögel mit erläuterndem Text.

Von Dr. Anton Reichenow.

Abbildungen von G. Mützel.

Im Erscheinen bei Th. Fischer in Cassel.

Lieferung 5 Mark.

Zur Zeit sind zwei Lieferungen erschienen, die nächsten werden in schnellerer Folge ausgegeben werden. [40]

Der Nummer liegt ein Aufruf des Deutschen Vereins für Vogelzucht und Acclimatisation bei, welchen wir der freundlichen Beachtung der Leser empfehlen. Die Redaction.

Redaction und Expedition: Berlin SW., Alte Jakobstr. 103 A. Verleger: L. A. Kittler in Leipzig.

Druck: G. Pätz'sche Buchdruckerei (Otto Hauthal) in Naumburg.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologisches Centralblatt - Beiblatt zum Journal für Ornithologie](#)

Jahr/Year: 1879

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Berlepsch Hans

Artikel/Article: [Eine neue Gattung und neue Arten aus Südamerika 63-64](#)