

Oestrelata feae (Salv.) Brutvogel Madeira's.

Von P. Ernesto Schmitz.

Soeben erhalte ich den handgreiflichen Beweis, daß *Oestrelata feae* (Salv.) auf Madeira selber Brutvogel ist, nämlich ein stattliches vollentwickeltes Dunenjunge und ein verlassenes resp. ufruchtbares Ei aus Risco do Poio de Louro, woher ich seinerzeit bereits mehrere alte Vögel erhalten hatte. Da ich von *Oestrelata feae*-Eiern nichts weiß, als was ich selber über das einzige in Madeira gesammelte Ei (Orn. Jahrb. X, p. 44) berichtete, so lasse ich hier die Beschreibung dieses zweiten Exemplares folgen:

Größe $52,5 \times 40,5$ mm, dp. 25,5 mm, Gew. 2,95 gr., Farbe gelblichweiß ohne alle Zeichnung, etwas glänzend, Schale sehr feinkörnig. Ob die etwas gelbliche Farbe und der Glanz dem Umstande zuzuschreiben ist, daß das Ei etwa $1\frac{1}{2}$ Monat alt ist, kann ich nicht entscheiden und muß frische Exemplare abwarten. Im Vergleich mit *Puff. anglorum*-Eiern ist es in der Form gedrängter, wie ich schon bei dem ersten Ei beobachtete. Dieses zweite ist bedeutend kleiner als das erste, das 59×42 mm maß. Da die Brutzeit in die 2. Hälfte Juli fällt, so ist dieses Jahr kaum noch ein weiteres Ei zu erwarten. Die Brutstätte ist über 1000 m über dem Meeresspiegel, ein kleiner, erdiger Platz mit Graswuchs auf einem Felsvorsprunge, der sich nur mit Stricken erreichen läßt. Mehrere Nester sind beisammen, jedes in einer Aushöhlung, die sich im Innern erweitert und bis 70 cm tief ist. Nestmaterial sind dürres Gras und Federn des alten Vogels. -- Bezüglich des Dunenjungens bemerke ich, daß es mit Ausnahme des Gesichtes ganz mit Dunen bis zu 5 cm Länge bedeckt ist, die auf der Oberseite blaugrau, auf der Unterseite des pullus etwas heller sind. Länge 30, Flügel 19 cm. Hauptschwingen desselben schwarzgrau, die letzten, inneren Schwingen blaugrau; Schwanz abgerundet, mittlere Schwanzfedern schwarzgrau, äußere Schwanzfeder mit weißer Innenfahne und weißgrauen Spitzen; untere Deckfedern weiß; Schnabel glänzend schwarz, Länge 28 mm, Höhe an der Wurzel 12 mm; Mittelzehe 42 mm, Schwimmhaut nach dem Tarsus hin fleischfarben, nach vorne hin schwarz, die äußeren Hälften zu $\frac{3}{4}$, die inneren zu $\frac{2}{3}$. Iris dunkelbraun.

Funchal, 17. September 1905.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologisches Jahrbuch](#)

Jahr/Year: 1906

Band/Volume: [17](#)

Autor(en)/Author(s): Schmitz Ernst

Artikel/Article: [Oestrelata feae \(Salv.\) Brutvogel Madeira`s. 25](#)