

Zum Schlusse möchte ich noch des zahlreichen Auftretens der Krickente (*Anas crecca* L.), sogar in großen Trupps und des Zwergsteiβfußes (*Colymbus nigricans* Scop.) im Anfange November v. J. erwähnen. Auf das massenhafte Erscheinen fremder Fichtenkreuzschnäbel (*Loxia curvirostra* L.) brauche ich nicht mehr zurückzukommen, weil bereits Anzinger hierüber an den Herausgeber berichtet hat. Ich möchte nur noch erwähnen, daß noch im Dezember größere Trupps in der Talsohle beobachtet wurden.

H a l l i. Tirol, 27. I. 1910.

Ankunfts- und Abzugsdaten aus Mariahof 1909.

Von Oberlehrer Jos. Noggler.

Der Vogelzug war in diesem Jahre sehr schlecht. Am Furtteiche dürfte die fortwährende Unruhe, die infolge der Vermessungen für ein zweites Bahngeleise herrschte, schuldtragend gewesen sein. Voraussichtlich wird sich auch das Jahr 1910 nicht viel günstiger erweisen, wenn das zweite Geleise gelegt wird, da der Schienenstrang unmittelbar am Teiche vorbeiführt. Am 19. IV. wurde der Furtteich eisfrei.

Erithacus rubecula. 24. III.

Ruticilla titis. 23. III.

Ruticilla phoenicura. 11. IV., 18. IV ♂ und ♀.

Pratincola rubetra. 19. IV

Saxicola oenanthe. 14. IV. — 17. IX.

Accentor modularis. 1. V.

Turdus musicus. 28. III.

Turdus viscivorus. 16. II.

Turdus iliacus. 2. IV. zuletzt.

Turdus pilaris. 16. II.

Turdus torquatus. 2. IV.

Calamodus schoenebaenus. 1. V.

Phylloscopus rufus. 16. IV.

Anthus spinoletta. 1. IV.

Anthus pratensis. 14. IV.

Motacilla alba. 20. III.

Motacilla flava. 3. IV

Alauda arvensis. 10. III. — 20. X. in großen Flügen.

Fringilla montifringilla. 22. II. und 30. III.

Acanthis cannabina. 3. IV

Acanthis carduelis ♂, ♀. 2. IV.

Coccothraustes coccothraustes. 7. I. im Schulgarten.

Loxia curvirostra. Stellte sich auf einem Espenbaum im Schulgarten ein, wo die in Menge vorhandenen Blattläuse verzehrt wurden. Auch in Stadlobers Obstgarten fanden sich täglich 20 bis 24 Stück. Die ersten großen Flüge erschienen in der Gegend am 16. III. und waren bis 24. I. 1910 zu sehen.

Chloris chloris. 22. II., 30. III.

Emberiza schoeniclus. 20. III.

Sturnus vulgaris. 7. III., am 24. III. bei dem alljährlich benützten Nistkasten.

Lanius excubitor. 15. I.

Lanius minor. 8. V.

Lanius collurio. ♂, ♀. 6. V.

Muscicapa atricapilla. 23. IV.

Hirundo rustica. 28. III. — 8. IX. größtenteils fort. Hier fand sich ein Nest, aus welchem der Kopf einer jungen toten Schwalbe herausah. Wahrscheinlich war der junge Vogel verendet und das alte Paar erhöhte für die zweite Brut die Nestmulde. Selbe war so flach, daß die Brut beinahe herausfiel.

Hirundo urbica. 25. IV.

Apus apus. 28. IV.

Jynx torquilla. 14. IV.

Upupa epops. 21. IV.

Cuculus canorus. 23. IV.

Carine passerina. 22. III.

Asio otus. Durch die unten liegenden Gewölle aufmerksam gemacht, beobachtete ich in einer dichten Fichte 10 Stück.

Falco subbuteo. 9. IV.

- Falco tinnunculus*. Überwinterter. 4. IV. angekommen.
Buteo buteo. Überwinterter. 4. IV. angekommen.
Archibuteo lagopus. Während des ganzen Januars bis 26. II.
Turtur turtur. 7. V.
Columba palumbus. 31. III.
Coturnix coturnix. Heuer gab es sehr wenige Wachteln.
Ardea cinerea. 13. IV.
Ciconia nigra. 23. IV. ein Stück geschossen, selten.
Ciconia alba. 27. IV., 6. V., 9. V. 5 Stück.
Fulica atra. 21. II. am Bache erlegt. — 27. IX. 2 Stück.
Gallinula chloropus. 27. IX., 19. XI. ♀.
Ortigometra porzana. 21. IX.
Rallus aquaticus. 29. III.
Vanellus vanellus. 22. III. — 19. XI. 2 Stück.
Oedicephus oedicephus. 18. IV., 26. IV.
Scolopax rusticola. 31. X., 19. XI. 2 Stück.
Gallinago gallinula. 14. IV.
Totanus ochropus. 10. und 14. IV.
Totanus glottis. 21. IV., 2. V. 10 Stück.
Totanus totanus. 24. VI.
Totanus hypoleucus. 24. IV., 30. IV. 6 Stück.
Totanus pugnax. 9. V. ♀.
Charadrius minor. 6. V.
Anas boschas. 3. IV. ♂, 14. IV., 19. IV. ♀, 20. IV. ♂, ♀,
 ebenso den 3. und 11. V. — 27. IX. 6 Stück.
Anas querquedula. 9., 15. IV., 21. IV. 6 Stück, 26. IV. 2 Stück,
 27. IV. 1 Stück, 30. IV. 2 Stück, 2. V. — 29. VIII. 8 Stück.
Anas crecca. 14. IV. — 27. IX., 16. XI. je 2 Stück, 17. XI.
 17 Stück.
Anas penelope. 27. IX. 2 Stück, 19. XI. 7 Stück.
Spatula clypeata. 13. IV. 5 Stück (2 ♂, 3 ♀).
Larus ridibundus. 16. und 26. IV. je 2 Stück. — 24. VI., 12.
 VII., 29. VIII. 2 Stück, 31. IX., 16. XI., 19. XI.
Hydrochelidon nigra. 29. VIII. 5 Stück.
Podiceps cristatus. 2. V. ♂.
Colymbus fluviatilis. 10. IV. — 5. X. 6 Stück.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologisches Jahrbuch](#)

Jahr/Year: 1910

Band/Volume: [21](#)

Autor(en)/Author(s): Noggler Josef

Artikel/Article: [Ankunfts- und Abzugsdaten aus Mariahof 1909. 57-59](#)