

Ornithologisches Jahrbuch.

ORGAN

für das

palaearktische Faunengebiet.

Jahrgang II.

December 1891.

Heft 6.

Ornithologische Beobachtungen auf meinen Sammelreisen*).

Von G. Schrader.

II.

Cypern.

3. October 1876 — 3. April 1878.

1. *Gyps fulvus* (Gm.) Gänsegeier. Ist als Standvogel über die ganze Insel verbreitet. Nicht weit von Larnaka zählte ich einmal auf einem Aase 30 Stück.

2. *Falco tinnunculus* L. Thurmfalke. Findet sich überall und ist in jedem Dorfe zu sehen.

3. *Falco cenchris* Naum. Röthelfalke. Erscheint anfangs März und bleibt bis September. Er ist einer der gemeinsten Falken auf der Insel, besonders häufig in der Umgebung von Ktima.

4. *Falco vespertinus* L. Rothfussfalke. Zeigt sich am Durchzuge im Mai und September, jedoch nur einzeln.

5. *Falco aesalon* Tunst. Zwergfalke. Erscheint im Winter, ist aber sehr selten.

6. *Falco subbuteo* L. Lerchenfalke. Kommt nur als Durchzugsvogel im Februar und September vor.

7. *Falco peregrinus* Tunst. Wanderfalke. Trifft im Herbst ein und verweilt bis zum Frühjahr, ist aber selten.

8. *Accipiter nisus* (L.). Sperber. Vom Herbst bis Frühjahr gemein auf der Insel.

*) Vergl. p. 179—197.

9. *Aquila chrysaëtus* (L.). Steinadler. Ich bemerkte ihn einigemale in der Umgebung von Ktima.

10. *Circus aeruginosus* (L.). Rohrweihe. Erscheint im November, aber sehr sparsam.

11. *Circus macrurus* (Gm.). Steppenweihe. Kommt am Durchzuge im Frühjahr und Herbst und ist fast über allen Wiesen und Feldern zu erblicken.

12. *Circus pygargus* (L.). Wiesenweihe. Erscheint im September und ist häufiger als die Rohrweihe.

13. *Strix flammea* L. Schleiereule. Einmal bekam ich in der Umgebung von Larnaka ein Exemplar.

14. *Pisorhina scops* (L.). Zwergohreule. Trifft im Frühjahr ein und verweilt bis September; ist häufig.

15. *Asio accipiterinus* (Pall.). Sumpfohreule. Im Januar erhielt ich ein Exemplar in einer Sumpfggend bei Larnaka.

16. *Noctua noctua glaux* (Sav.). Wüstenkauz. Ueber die ganze Insel verbreiteter Standvogel.

17. *Caprimulgus europaeus* L. Nachtschwalbe. Bemerkte sie erst anfangs Mai und dann Ende August; ist überall häufig.

18. *Micropus melba* (L.). Alpensegler. Erschien anfangs Februar und dann wieder im August.

19. *Micropus apus* (L.). Mauersegler. Wie die vorhergehende Art.

20. *Hirundo rustica* L. Hausschwalbe. Erschien am 14. März und verweilte bis September. Brutvogel in allen Häusern.

21. *Hirundo rufula* Temm. Höhlenschwalbe. Kam zugleich mit der Hausschwalbe und blieb fast bis September. Ist in allen Höhlen, Ruinen, sowie unter Brücken brütend zu finden.

22. *Clivicola rupestris* (Scop.). Felsenschwalbe. Ich bemerkte sie erst den 3. April in gebirgiger Gegend.

23. *Clivicola riparia* (L.). Uferschwalbe. Erschien Mitte April und dann wieder Ende August.

24. *Cuculus canorus* L. Kukuk. Traf den 6. April ein und dann wieder im August; war gemein.

25. *Coccyzus glandarius* (L.). Heherkukuk. Erschien den 18. April und dann wieder im September, war aber selten.

26. *Merops apiaster* L. Bienenfresser. Kam am 10. April und blieb bis Ende August. Ist überall gemein, wird auf Leim-

rüthen gefangen und zu hunderten auf den Markt nach Larnaka gebracht.

27. *Alcedo ispida* L. Eisvogel. Kommt im October um zu überwintern und zeigt sich nur sehr einzeln.

28. *Coracias garrula* L. Blauracke. Erschien den 18. März und verweilte bis Ende August; überall gemein.

29. *Oriolus galbula* L. Pirol. Kam am 18. April und verweilte auf Paphos fast den Sommer über.

30. *Pastor roseus* (L.). Rosenstar. Den 6. Juli bemerkte ich einen kleinen Flug von Jungen in Ktima, wovon ich 2 Exemplare schoss.

31. *Sturnus vulgaris* L. Star. Erscheint Ende October und verweilt bis Ende Februar.

32. *Colaeus monedula* (L.). Dohle. In einer Schlucht bei Ktima und in der Stadt Leucosia traf ich eine ganze Colonie an; findet sich überall in Ruinen.

33. *Corvus corax* L. Kolkrahe. Kommt auf der Insel vor, doch bemerkt man nur hie und da ein Paar. In der Ebene gegen das Meer bei Ktima fand ich ein Paar auf einem wilden Birnbaume brütend.

34. *Corvus cornix* L. Nebelkrähe. Auf der ganzen Insel gemein, besonders auf Paphos.

35. *Pica rustica* (Scop.). Elster. Ist über die ganze Insel verbreitet, aber nicht gemein.

36. *Tichodroma muraria* (L.). Mauerläufer. Ein einzigesmal bemerkte ich ein Paar auf dem Felsen, wo das Kloster Theo Kremasto auf dem Stawrowuni steht, etwa fünf Stunden von Larnaka entfernt. Ich erlegte ein Stück.

37. *Upupa epops* L. Wiedehopf. Erschien den 2. März und dann wieder im August.

38. *Lanius excubitor* L. Raubwürger. Einige Exemplare beobachtete ich Ende August in der Umgebung von Ktima, wie es scheint jedoch als Durchzügler.

39. *Lanius senator* L. Rothköpfiger Würger. Kommt anfangs April und verweilt als überall gemeiner Vogel bis Ende September.

40. *Lanius nubicus* Licht. Maskenwürger. Sah nur ein einziges Exemplar am 1. April auf dem halben Wege von Ktima nach Lemiso.

41. *Muscicapa grisola* L. Grauer Fliegenschnäpper. Erscheint am Durchzuge im Frühjahr und Herbst.

42. *Muscicapa collaris* Bechst. Halsbandfliegenfänger. Zeigte sich in einigen Exemplaren den 14. April.

43. *Accentor modularis* (L.). Heckenbraunelle. Kam im Winter vereinzelt vor.

44. *Parus major* L. Kohlmeise. Standvogel, aber nicht häufig.

45. *Parus coeruleus* L. Blaumeise. Wie die vorige Art.

46. *Phylloscopus trochilus* (L.). Fitislaubvogel. Erscheint Ende August und ist bis Frühjahr überall gemein.

47. *Hypolais elaiica* Linderm. Oelbaumspötter. Trifft anfangs April in den Gärten ein.

48. *Hypolais olivetorum* Strickl. Olivenspötter. Wie der vorige, doch bedeutend seltener.

49. *Cisticola cisticola* (Temm.). Cistenrohrsänger. Selten.

50. *Sylvia rüppelli* Temm. Maskengrasmücke. Erschien anfangs Mai, ist aber selten.

51. *Sylvia melanocephala* (Gm.). Schwarzköpfige Grasmücke. Erscheint im Frühjahr und ist überall gemein.

52. *Sylvia sylvia* (L.). Dorngrasmücke. Wie die vorhergehende Art.

53. *Pycnonotus xanthopygus* (Hempr. und Ehr.) Gelbsteiss Bübul. Bekam nur ein einziges Exemplar in Larnaka, welches ich jedoch für ein von einem aus Syrien kommenden Postdampfer entflogenes Stück halte.

54. *Turdus merula* L. Amsel. Erscheint anfangs November und bleibt bis Ende Februar; ist minder häufig.

55. *Turdus musicus* L. Singdrossel. Ankunft und Abzug wie bei der vorhergehenden, nur dass sie am häufigsten auftritt.

56. *Turdus iliacus* L. Weindrossel. Ebenso und überall anzutreffen.

57. *Monticola cyanus* (L.). Blaudrossel. Erscheint zu beiden Zugzeiten, ist aber sehr selten.

58. *Ruticilla titys* (L.). Hausrothschwänzchen. Kommt anfangs October.

59. *Ruticilla phoenicura* (L.). Gartenrothschwänzchen. Erschien anfangs April.

60. *Luscinia luscinia* (L.). Nachtigall. Erscheint, wie wohl selten im Frühling; ich hörte keine schlagen.

61. *Erythacus rubeculus* (L.). Rothkehlchen. Trifft im November ein, ist aber wenig zu sehen.

62. *Saxicola oenanthe* (L.). Steinschmätzer. Erschien am 8. März und verweilt bis Ende September.

63. *Saxicola stapania* (L.). Schwarzohriger Steinschmätzer. Kam am 28. Februar und blieb bis fast Ende September.

64. *Saxicola rufa* (Chr. L. Br.). Schwarzkehliger Steinschmätzer. Wie der vorige.

65. *Saxicola erythraea* Ehr. Im Juli erhielt ich ein einziges Exemplar in Ktima.

66. *Saxicola leucomela* (Pall.). Ist einer der gemeinsten Steinschmätzer auf der Insel. Er erschien den 8. März und blieb fast bis Ende September.

67. *Pratincola rubetra* (L.). Braunkehliger Wiesenschmätzer. Kommt im Herbst und verweilt bis März, ist aber nicht gemein.

68. *Pratincola rubicola* (L.). Schwarzkehliger Wiesenschwätzer. Wie die vorhergehende Art.

69. *Motacilla alba* L. Weisse Bachstelze. Erscheint bei Wintereintritt und bleibt bis zum Frühjahr; ist überall anzutreffen.

70. *Motacilla melanocephala* Pall. Gebirgsbachstelze. Erschien am 17. März, zeigt sich aber nur in geringer Zahl.

71. *Budytes flavus* (L.). Gelbe Schafstelze. Wie bei *M. alba*.

72. *Budytes melanocephalus* (Licht.). Schwarzköpfige Schafstelze. Kam den 17. Mai, ist aber selten.

73. *Anthus pratensis* (L.). Wiesenpieper. Kommt mit Eintritt des Winters und verweilt bis Februar; ist überall anzutreffen.

74. *Anthus campestris* (L.). Brachpieper. Wie die vorhergehende Art, aber häufiger.

75. *Galerita cristata* (L.). Haubenlerche. Ist überall gemein.

76. *Alauda arvensis* L. Feldlerche. Traf anfangs October ein und war den Winter hindurch in allen Ebenen in grösseren Flügen anzutreffen.

77. *Emberiza miliaria* L. Grauammer. Erschien am Zuge im October, doch kommt die Art durch's ganze Jahr sehr gemein vor.

78. *Emberiza melanocephala* Scop. Kappenammer. Kam den 12. April und verweilte bis Ende September; ist nicht sehr häufig.

79. *Emberiza cia* L. Zippammer. Traf den 12. März ein, verblieb bis Ende September; ist selten.

80. *Emberiza caesia* Cretzschm. Rostbärtiger Ammer. Kommt und geht wie die vorhergehende Art; ist nicht gemein.

81. *Emberiza hortulana* L. Ortolan. Erschien den 26 April, bleibt über Sommer, ist aber nicht gemein.

82. *Emberiza schoeniclus* (L.). Rohrammer. Nur über Winter.

83. *Emberiza schoeniclus aquatica* Sav. Dickschnäbliger Rohrammer. Erhielt ein einziges Exemplar den 13. November im Rohre bei Larnaka.

84. *Passer domesticus* (L.). Haussperling. Fehlt nirgends.

85. *Passer hispaniolensis* (Temm.). Weidensperling. Erscheint am Durchzuge im Frühling und Herbst in einigen Exemplaren.

86. *Fringilla coelebs* L. Buchfink. Verweilt von Anfang November bis März.

87. *Chloris chloris* (L.). Grünling. Kommt im Frühling und bleibt bis September.

88. *Acanthis cannabina* (L.). Bluthänfling. Erscheint im Herbst.

89. *Carduelis elegans* Steph. Stieglitz. Vom Herbst bis Frühling.

90. *Chrysomitris spinus* (L.). Erlenzeisig. Erscheint im Herbst.

91. *Columba livia* L. Felsentaube. Kommt zu tausenden als Standvogel auf einer kleinen unbewohnten, gegenüber von Ktima gelegenen Insel vor.

92. *Turtur turtur* (L.) Turteltaube. Erscheint im Frühjahr und Ende August.

93. *Pterocles sp.?* Soll nach Aussagen auf der Insel vorkommen; ich sah niemals einen solchen Vogel.

94. *Caccabis saxatilis chukar* (Gray). Tschukar. Ist als gemeiner Standvogel über die ganze Insel verbreitet.

95. *Coturnix coturnix* (L.). Wachtel. Erscheint im Frühjahr und Herbst.

96. *Francolinus francolinus* (L.). Frankolin. Standvogel. Ich traf ihn nur in der Umgebung von Ktima, wo er aber nicht

sehr häufig ist. Seinen Ruf vernahm ich nur vom 20. Februar bis gegen Ende des Sommers.

97. *Glareola pratincola* (L.). Brachschwalbe. Erscheint zu beiden Zugzeiten in kleinen Flügen.

98. *Otis tetraz* L. Zwergtrappe. Erlegte ein Stück im November. Ist sehr selten.

99. *Oedicnemus oedicnemus* (L.). Dickfuss. Ist das ganze Jahr sehr vereinzelt anzutreffen.

100. *Charadrius cantianus* Lath. Seeregenpfeifer. Erscheint Mitte September und bleibt bis Ende Februar; ist nicht häufig.

101. *Charadrius hiaticula* L. Sandregenpfeifer. Wie die vorige Art.

102. *Vanellus vanellus* (L.). Kiebitz. Erschien am 13. November und verweilte in kleinen Flügen bis Ende Februar.

103. *Hoplopterus spinosus* (L.). Sporenkiebitz. Bekam ein einziges Stück in Larnaka im November.

104. *Grus grus* (L.). Kranich. Hörte nur seine Stimme am Durchzuge im Frühjahr.

105. *Ciconia ciconia* (L.). Weisser Storch. Ich sah nur seine Horste in Leucosia.

106. *Phoenicopterus roseus* Pall. Flamingo. Eine ausserordentlich seltene Erscheinung, nur hie und da am Durchzuge passierend.

107. *Plegadis falcinellus* (L.). Sichler. Erschien den 10. April und dann wieder im August, wo ich einigemal einige Flüge sah.

108. *Platalea leucorodia* L. Löffler. Nur hie und da ist ein Exemplar am Durchzuge anzutreffen.

109. *Ardea cinerea* L. Fischreiher. Erschien den 11. März am Durchzuge; nicht selten.

110. *Ardea purpurea* L. Purpurreiher. 17. März durchziehend.

111. *Ardea alba* L. Silberreiher. Zeigt sich am Durchzuge, aber sehr selten.

112. *Ardea garzetta* L. Seidenreiher. Traf am 23. März ein, ist sehr selten.

113. *Ardea ralloides* Scop. Schopfreiher. Ich sah einige den 11. September.

114. *Ardea ibis* (L.). Kuhreiher. Erschien den 27. April am Durchzuge für kurze Zeit, dann wieder im August; kommt einzeln vor.

115. *Ardea minuta* L. Zwergreiher. Zog am 23. April und dann Ende August in geringer Zahl durch.

116. *Nycticorax griseus* (L.). Zwergreiher. Kam am 10. März, zeigte sich aber sehr selten am Durchzuge.

117. *Kallus aquaticus* L. Wasserralle. Erscheint im Winter, ist aber selten.

118. *Crex pratensis* Bechst. Wachtelkönig. Kommt zugleich mit der Wachtel im Frühjahr und Herbst.

119. *Gallinula porzana* (L.). Getüpfeltes Sumpfhuhn. Findet sich gegen Ende October ein und ist hie und da an feuchten Stellen zu treffen.

120. *Fulica atra* L. Blässhahn. Von Ende October bis Ende Februar in allen Sümpfen und auf allen Seen vorhanden.

121. *Numenius arcuatus* (L.). Grosser Brachvogel. Erschien den 3. September und verweilte bis Ende Februar.

122. *Limosa aegocephala* (L.). Uferschnepfe. Kommt mit Winteranfang und verweilt bis Ende Februar; ist vereinzelt anzutreffen.

123. *Scolopax rusticula* L. Waldschnepfe. Erschien den 10. November und ist nur auf den hochgelegenen Theilen der Insel, abhängig von der Winterstrenge, mehr oder weniger häufig zu finden.

124. *Gallinago gallinago* (L.). Bekassine. Erschien im November, zeigte sich aber sparsam.

125. *Totanus calidris* (L.). Gambett-Wasserläufer. Kam mit Beginn des Winters und war in allen sumpfigen Gegenden anzutreffen.

126. *Totanus glareola* (L.). Brachwasserläufer. Traf am 21. Jänner ein und war in allen Wassergräben zu sehen.

127. *Tringa alpina* L. Alpenstrandläufer. Kommt mit Winterbeginn und verweilt bis Ende Februar.

128. *Tringa minuta* Leisl. Zwergstrandläufer. Ebenso.

129. *Cygnus cygnus* (L.). Singschwan. Ein einzigesmal traf ich 2 Stück in einem See bei Larraka an.

130. *Anser anser* (L.). Graugans. Trifft im Winter ein und, ist hie und da bei Seen in kleiner Zahl anzutreffen.

131. *Tadorna tadorna* (L.). Brandgans. Erscheint im Winter, in kleinen Flügen.

132. *Tadorna casarca* (L.). Rostgans. Wie die vorige Art, nur zahlreicher.
133. *Anas clypeata* L. Löffelente. } Kommt im November
 134. *Anas boschas* L. Stockente. } und ist nicht gemein.
 135. *Anas acuta* L. Spiessente. }
 136. *Anas crecca* L. Krickente. } Erscheint Ende
 137. *Anas penelope* L. Pfeifente. } October, ist
 138. *Fuligula juligula* (L.). Reiherente. } nicht gemein.
 139. *Podiceps juvialis* (Tunst.) Zwergsteissfuss. Kommt im Winter, ist aber selten.
140. *Pelecanus onocrotalus* L. Gemeiner Pelikan. Nur einmal im November ein Stück in einem kleinen See bemerkt.
141. *Pialacrocorax carbo* (L.). Kormoran. Einigemal im Winter beobachtet.
142. *Larus ridibundus* L. Lachmöve. Erscheint im October und ist in allen kleinen Seen anzutreffen.
143. *Larus melanocephalus* Natt. Schwarzköpfige Möve. Sah einmal ein Stück.
144. *Larus minutus* Pall. Zwergmöve. Im Winter bemerkte ich einmal einige Exemplare in einem See bei Larnaka.
145. *Sterna nilotica* Hasselq. Lachseeschwalbe. Erscheint am Herbstzuge.
146. *Hydrochelidon nigra* (L.). Schwarze Seeschwalbe. Wie bei der vorigen Art.

Die Felstaube (*Columba livia*) auf den Hebriden.

Aus dem Englischen von Carl Bolle.

Es ist im jüngst verflossenen Jahre in Schottland ein Buch veröffentlicht worden, das zu den ansprechendsten Erscheinungen gehört, die weit ab von dem Pfade landläufiger, oft pedantischer Gelehrsamkeit zu finden sind: posthume Aufzeichnungen eines liebenswürdigen und leidenschaftlichen Naturfreundes, der freiwillig viele Jahre seines Lebens auf einer Inselscholle der Hebriden, dem durch uralten Kirchenbau geheiligten Jona, verleben wollte. Freunde haben längere Zeit nach seinem 1870 erfolgten Ableben die Publication vorgefundener Tagebücher

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologisches Jahrbuch](#)

Jahr/Year: 1891

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Schrader Gustav

Artikel/Article: [Ornithologische Beobachtungen auf meinen Sammelreisen.
215-223](#)