Bemerkenswertes aus dem vergangenen Jahre (1890). (Salzburg.)

Von **Vict. Ritter von Tschusi zu Schmidhoffen.**

Falco aesalon Tunst. Ein Exemplar sah ich gelegentlich einer Jagd bei Vigaun am 27. December.

Lanius excubitor maior Pall. Den 10. December erlegte ich hier ein schönes ♂ ad.

Muscicapa parva. Bechst. Den 13 Mai schoss ich ein weissbäuchiges ♂ am Brand. Vom 17.--19. hielten sich an zwei verschiedenen Stellen des Taxerkogels zwei ♂ auf, verschwanden aber dann wieder. Am Herbstzuge zeigte sich der Zwergfliegenfänger am 26. Juli 1 St., 6. August ♂ ad. und 2 jun., 7. 1 jun., 8. und 9. je 2 Stück.

Parus palustris alpestris Baill. Die Alpenmeise ist vorwiegend Zug-, nur in geringer Zahl Strichvogel. Erscheint gegen Sommersende auf Waldschlägen in Gesellschaft von *P. fruticeti*, wo sie die Unkrautsamen verzehrt, und wenn sie damit fertig, weiterzieht. Im Herbst fand ich sie auch mehrfach in den Salzachauen, also ganz in der Niederung

Ruticilla phoenicura (L.). Den 5. und 6. Juli erlegte ich je ein hahnenfedriges ♂ in meinem Garten, welche beide daselbst gebrütet hatten.

Luscinia luscinia (L.). Noch niemals beobachtete ich hier die Nachtigall so häufig als in diesem Herbst in den ersten Septembertagen, wo es mit nur kurzen Unterbrechungen fast fort und fort regnete.

Galerita cristata (L.). Die Haubenlerche, welche dem Hal-leiner Thale fehlt, sah ich hier den 6. October auf einem Scheunendache sitzen, wobei sie öfters ihre Stimme hören liess.

Totanus glareola (L.). Mein Sohn Rudolf schoss hier am Bache den 28. Juli ein Paar. Ich traf die Art bisher ziemlich selten und nicht jedes Jahr in unserem Thale an, gewöhnlich aber dann, wenn anhaltende Regengüsse die tiefer gelegenen Wiesen inundiert hatten.

Totanus littoreus (glottis) (L.) Als im September die Wiesen längs des Baches überschwemmt waren, erschien zum erstenmal ein Exemplar am 13. September.

Tringa subarcuata (Güld.). Ebenfalls am 23. September beobachtete ich ein Stück an einer Wasserlache. Die Art ist für hier gleichfalls neu.

Oidemia fusca (L.). Ein jüngeres ♂, das in meine Sammlung gelangte, wurde in Riff bei Kaltenhausen Ende November erlegt und mir von Hrn. Verwalter Schlederer zugeschickt.

Larus tridactylus L. Hrn. k. k. Forstverwalter Ridler in Abtenau danke ich ein ♂ ad., das den 12. September auf dem Eise des Seewaldsees (1078 M. ü. M.) erfroren aufgefunden wurde.

Villa Tännenhof bei Hallein, Januar 1891.

Kleine Notizen.

Notizen aus Mähren (1890).

Von V. Čapek.

Gyps fulvus (Gm.). Hr. Bakes, Grossgrundbesitzer in Gross Urhau, südwestlich von Brünn, sah im September sieben Stück dieser Geier in westlicher Richtung ziehen. Die Art wurde dort auch früher schon beobachtet.

Falco aesalon Tunst. Zeigt sich selten am Durchzuge. Den 24. Februar 1890 wurde ein ♂ jun. in einem Hofe in Eibenschitz gefangen. Der Vogel zeigte an einem Fusse einen einige Tage alten Bruch, hielt mit dem gesunden einen Sperling in den Fängen und liess sich so greifen.

Monticola saxatilis (L.). Mitte April erschienen zwei Paare an den alten Brutplätzen im Iglawathale unterhalb Eibenschitz

Emberiza hortulana L. Tritt jetzt um Oslawan in mehreren Paaren als Brutvogel auf und breitet sich immer weiter aus. Am 24. April bemerkte ich das erste Stück, Mitte Juni schon erwachsene Junge Ende Juli zeigte sich bei zwei erlegten ♂ das Kleingefieder bereits erneuert, aber noch nicht vollständig ausgebildet.

Plectrophanes nivalis (L.). Sehr selten. Anfangs Februar sah Hr. Ziegler, Präparator in Eibenschitz, ein Exemplar an der dortigen Strasse.

Oslawan, Februar 1891.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologisches Jahrbuch](#)

Jahr/Year: 1891

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Tschusi zu Schmidhoffen Victor Ritter von

Artikel/Article: [Bemerkenswertes aus demvergangenen Jahre \(1890\) \(Salzburg\) 252-253](#)