



© Ornithologische Gesellschaft Baden-Württemberg e.V. - www.ogbw.de

Ornithol. Jh. Bad.-Württ. 25: 47-48 (2009)

Kurze Mitteilung

Spätbrut der Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*) bei Laupheim-Obersulmatingen, Landkreis Biberach/Riß

Late breeding of Fieldfare (Turdus pilaris) near Laupheim-Obersulmatingen, federal district of Biberach/Riß

Klaus Bommer

Im Sommer 2009 beobachtete ich fast täglich an einem der beiden Laupheimer Kieselseen („Riß-kieswerk-Südsee“). Die Seen mit den Koordinaten TK 7725, SW, 48.13 N/09.50 E, 503 m NN sind jeweils 30-35 Hektar groß und liegen inmitten des agrarisch intensiv genutzten Rißtals. Der „Südsee“ wird auf drei Seiten von 7-8 m breiten und dichten Ufergehölzen eingerahmt.

Ab dem 15. August wurde ich dort auf zwei adulte Wacholderdrosseln aufmerksam, die stetig in der schütterten, kurzrasigen Vegetation auf dem kiesigen Untergrund neben einem Bitumenweg Nahrung suchten und mit dem Schnabel voller Futter in das Baum- und Buschwerk am Rand des Kieselsees flogen. Soweit erkennbar wurden lediglich Insekten von den Gräsern abgelesen oder vom Boden aufgenommen. Wiesen mit Regenwürmern gab es nicht, wenn man von einem 400 m entfernten größeren Badeplatz absieht. Die Weizenfelder der näheren Umgebung standen zu dieser Zeit noch auf dem Halm.

Zufällig fiel der Blick am 21. August auf das Nest, in dem dicht gedrängt 3 Jungvögel saßen. Die Jungvögel waren wohl 10 Tage alt und noch nicht flügge. Am 23. August war noch 1 Jungvogel im Nest. Ab dem 24. August war das Nest verlassen, aber sowohl die Alt- als auch die Jungvögel waren noch in den Ufergehölzen zu hören, oder man sah die Altvögel, wie sie Futter für die Jungen suchten bis spätestens zum 5. September. Es handelte sich um eine Einzelbrut der Wacholderdrossel. Hinweise für weitere Brutpaare in der Umgebung ergaben sich nicht.

Wenn man die Angaben aus der Literatur (Tabelle 1) zugrunde legt, müssen die Jungvögel um den 12. August geschlüpft sein. Dies wäre etwa 3 Wochen später als bisher in Hölzinger (1999) mit dem 21. Juli angegeben. In der Schweiz fand das späteste Ausfliegen von Nestlingen am 12. August 1963 bei Rheinfelden AG statt (Maumary, Vallotton & Knaus 2007); der Schlüpftermin dürfte bei dieser Brut demnach in die letzte Julidekade fallen. Vom Bodensee wurden zwei Augustbeobachtungen bekannt, als eben flügge Jungvögel gefüttert wurden: 2. August 1978 in Konstanz und 8. August 1970 in Radolfzell-Güttlingen (Schuster et al. 1983).

Klaus Bommer, Stettiner Str. 11, D-88471 Laupheim, E-Mail: bommer.k@gmx.de

Tabelle 1. Brutdauer und Nestlingszeit der Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*) aus Baden-Württemberg, Bayern und Mitteleuropa nach Literaturangaben. - *Literature records of breeding duration and nestling duration of Fieldfare (*Turdus pilaris*) from Baden-Württemberg, Bavaria and Central Europe.*

Quelle	Brutdauer in Tagen	Nestlingszeit in Tagen
<i>Baden-Württemberg</i>		
Hölzinger (1999)	10,9 (n = 53)	12-16 (ungestörte Bruten)
<i>Bayern</i>		
Wüst (1986)	12-14 (n = 14)	12-14
<i>Mitteleuropa</i>		
Glutz & Bauer (1988)	10-12	11-16
Bauer et al. (2005)	10-13	12-16

Auch der Neststandort war ungewöhnlich. Er befand sich auf einer annähernd horizontalen Astgabel einer Erle (*Alnus spec.*) in 4,5 m Höhe und etwa 4 m vom Ufer entfernt über dem Wasser. Zu Letzterem fanden sich in der Literatur keine Angaben. Das Nest war auf der See-Nordseite angelegt worden, zeigte also nach Süden zur Wasserfläche hin und lag abseits vom stark begangenen und befahrenen Bitumenweg.

Herrn Dr. J. Hölzinger danke ich herzlich für die Durchsicht des Manuskriptes.

Literatur

- Bauer, H.-G, E. Bezzel & W. Fiedler (2005): Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas. Alles über Biologie, Gefährdung und Schutz. Bd. 2: Passeriformes – Sperlingsvögel. Aula-Verlag, Wiebelsheim.
- Glutz von Blotzheim, U.N. & K.M. Bauer (1988): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 11/II. Passeriformes (2. Teil). Aula-Verlag, Wiesbaden.
- Hölzinger, J. (1999): Die Vögel Baden-Württembergs, Bd. 3.1: Singvögel I. Passeriformes – Sperlingsvögel: Alaudidae (Lerchen) – Sylviidae (Zweigsänger). Ulmer Verlag, Stuttgart.
- Maumary, L., L. Vallotton & P. Knaus (2007): Die Vögel der Schweiz. Schweizerische Vogelwarte, Sempach, und Nos Oiseaux, Monmollin.
- Schuster, S., V. Blum, H. Jacoby, G. Knötzsch, H. Leuzinger, M. Schneider, E. Seitz & P. Willi (1983): Die Vögel des Bodenseegebietes. Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Bodensee, Konstanz. 379 S.
- Wüst, W. (1986): Avifauna Bavariae: Die Vogelwelt Bayerns im Wandel der Zeit. Bd. II: Pterocli-formes Flughühner bis Passeriformes Sperlingsvögel. Ornithologische Gesellschaft in Bayern, München.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologische Jahreshefte für Baden-Württemberg](#)

Jahr/Year: 2009

Band/Volume: [25](#)

Autor(en)/Author(s): Bommer Klaus-Wolfgang

Artikel/Article: [Spätbrut der Wacholderdrossel \(*Turdus pilaris*\) bei Laupheim-Obersulmetingen, Landkreis Biberach/Riß. 47-48](#)