

Diagnosen neuer südamerikanischer Vogelarten.

Von Hans von Berlepsch.

+ 1. *Poecilothraupis palpebrosa melanops* Berl.
subsp. nov.

Syn. *P. lacrymosa* Scl. et Salv. (nec Dubus) P.Z.S. 1870 p. 780
(Merida).

Diag. *P. palpebrosa* dictae e Bogota simillima, differt capitibus
lateribus obscure nigris nec olivaceo lavatis, pileo quoque nigrescentiore
coeruleo vix lavato. Dorso obscuriore et laetius caeruleo lavato. Cor-
poré inferiore aurantio-flavo laetiore.

Long. tot. 170—176, al. 91—98, caud. $75\frac{1}{2}$ — $85\frac{1}{2}$, culm.
 $13\frac{3}{4}$ — $14\frac{1}{2}$, tars. $24\frac{1}{2}$ — $25\frac{1}{2}$ mm.

Habitat: Merida, Venezuela (coll. Goering u. S. Briceño).

Museo: H. v. B. (specimina typica.)

+ 2. *Chlorospingus albitemporalis venezuelanus* Berl.
subsp. nov.

+ Syn. *Chl. albitemporalis* Scl. et Salv. (nec Lafr.) P.Z.S. 1870
p. 780 (Merida).

Diag. *Chl. albitemporalis* dicto similis, differt capite supra nigres-
centiore (fere nigro nec brunneo), capitibus nigredine magis ad nucham
producto, necnon gula distinctius fusco maculata, alis quoque brevioribus.

Long. tot. 121—140, al. 62—68, caud. 56—58, culm. $11\frac{1}{2}$ —12,
tars. $20\frac{3}{4}$ — $21\frac{1}{2}$ mm.

Hab.: Merida, Venezuela (coll. S. Briceño).

Museo: H. v. B. (specimina typica).

+ 3. *Grallaria excelsa* Berl. sp. nov.

Diag. *G. squamigerae* simillima sed multo major. rostro imprimis
crassiore et longiore, tarsis quoque longioribus, necnon corpore supra
rufescentiore olivaceo, nucha solummodo (nec pileo toto) schistacea,
remigibusque basi intus ochraceis distinguenda.

Obs. *G. giganteae* Lawr. ex Ecuador crassitie et remigibus basi
intus fulvis affinis sed coloribus prorsus diversa.

Long. tot. 225, al. 158, caud. $70\frac{1}{2}$, culm. $34\frac{3}{4}$, tars. 68 mm.

Hab.: „Montaña Aricagua“ prope Meridam, Venezuela (coll.
S. Briceño), (obs. habitat cum *G. squamigeram* Prev.).

Museo: H. v. B. (typus).

+ 4. *Conirostrum sitticolor intermedium* Berl. subsp. n.

+ Syn. *C. sitticolor* Scl. et Salv. (nec Lafr.) P.Z.S. 1870 p. 780
(Paramo de Culata, Merida).

Diag. *C. sitticolor* dicto simillimum, sed superciliis coeruleis supra
oculos inceptis et ad nucham ductis (sicut in *C. cyaneo* Tacz.) distin-
guendum.

Long. tot. 126—137, al. 65—69, caud. 52—56, culm. $11\frac{1}{4}$ —12,
tars. $17\frac{1}{2}$ —18 mm.

Habitat: circum Merida, Venezuela (coll. S. Briceño).

Museo: H. v. B. (specimina typica).

⁺ 5. *Empidagra bahiae* Berl. sp. nov.

Syn.? *Elainea affinis* Scl. (nec Burm.) pt. Cat. Br. Mus. XIV

p. 154 (specimina e Bahia!).

Diag. *E. suiriri* dictae e Bolivia affinis sed statura majore alis praecipue caudaque longioribus, abdomineque sulphureo nec albo, nec non rectricibus externis olivaceo-griseis nec albescensibus distinguenda.

Long. tot. $146\frac{1}{2}$, al. 79, caud. $70\frac{1}{2}$, culm. $13\frac{3}{4}$, tars. 20 mm.

Hab.: Bahia, Brasil. or.

Museo: H. v. B. (typus).

⁺ 6. *Serphophaga munda* Berl. sp. nov.

Syn.? *Serphophaga verticata* Burm. Journ. f. Orn. 1860 p. 246 (typ. e Parana).

Serphophaga subcristata part. Sel. Cat. birds Brit. Mus. XIV (1888) p. 102 (specim. e Cordova et Bolivia).

Muscicapara subcristata part. D'Orb. Voy. Am. mérid. Ois. p. 326 („femelles“).

Diag.: *S. subcristatae* Vieill. affinis differt abdomine pure albo nec sulphureo, corpore supra brunnecenti-cinereo minime olivaceo lavato, nec non tectricibus alarum superioribus apice latius albo terminatis.

Long. tot. 107—95, al. $50\frac{1}{4}$ —48, caud. $53\frac{1}{2}$ — $49\frac{1}{2}$, culm. $8-7\frac{3}{4}$, tars. $16\frac{3}{4}$ — $15\frac{3}{4}$ mm.

Habitat: Bolivia alta (Samaipata, Valle grande, Olgín — coll. G. Garlepp), ? Argentina septentr. (Cordova et Parana).

Museo: H. v. B. (specimina typica).

Leucotreron fischeri meridionalis n. subsp.

von A. B. Meyer und L. W. Wiglesworth (Dresden).

Leucotreron L. fischeri (Brügg.) affinis, sed dorso alisque schistaceis, corpore subtus toto vinaceoluteo-griseo distinguenda. Long. tot. c. 340, al. 172—175, caud. 145, tarsi c. 28, rostri 15,5 mm.

Hab. Makassar, ins. Celebes meridionali.

Brüggemann beschrieb: Abh. natw. Ver. Bremen V, 82 (S.A.) 1876, Tafel IV, von Manado, Nord-Célébes, *Ptilinopus fischeri* und sagte, die Art scheine eine Bewohnerin des ornithologisch noch unbekannten Inneren der Insel zu sein und sich nur zufällig in die Gegend von Manado verirrt zu haben. Letzteres mag richtig sein, denn soweit uns bekannt, hat kein anderer Sammler sie dort erhalten; Dr. Plate aber erlegte im April und Dezember, wie uns Hr. Nehrkorn mitzuteilen die Güte hatte, eine ganze Reihe von Exemplaren bei Rurukan in der Minahassa, die jetzt in verschiedenen Sammlungen aufbewahrt werden. Die Etiketten dieser Stücke tragen die folgende Notiz: „Schnabel grünlich, Spitze gelb,

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologische Monatsberichte](#)

Jahr/Year: 1893

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Berlepsch Hans

Artikel/Article: [Diagnosen neuer südamerikanischer Vogelarten.](#)
[11-12](#)