

Die Zehen sind kurz und dick, mit dicken Ballen versehen. Auf der Außenzehe befinden sich acht bis zehn, auf der Mittelzehe sechzehn bis achtzehn, auf der Innenzehe sieben bis acht, auf der Hinterzehe vier bis fünf Quertafeln. Die übrigen Teile sind geneigt. Die Länge der Zehen beträgt ohne Kralle: Außenzehe 2 bis 2,3, Mittelzehe 3 bis 3,4, Innenzehe 2,1 bis 2,3, Hinterzehe 1,4 bis 1,5 cm. Die schwarzen, nicht sehr großen Krallen messen, im Bogen gemessen, an der Außenzehe 1, an der Mittelzehe 1,3, an der Innenzehe 1,1, an der Hinterzehe 1,3 cm. Der abgebildete Fang stammt von einem in Finland erlegten Exemplare.

XIV.

(Mit Schwarzbild Tafel I, Fig. 2).

Der Lerchenfalk, *Falco subbuteo* L.

Die Fänge sind kurz und stark, dagegen die Zehen sehr lang und dünn, mit stark gekrümmten Krallen versehen. Der Lauf ist auf der Rückseite nackt, auf der Vorderseite im oberen Drittel befiedert. Die nackten Teile sind mit fünf- bis sechseckigen Nesttäfelchen bekleidet, die auf der Vorderseite größer, an den übrigen Seiten kleiner sind. Über der Zehenwurzel bilden sie fünf bis sechs breitere Quertafeln, die aber bedeutend kleiner als beim Turmfalken sind. Die Länge des Laufes beträgt 3,5 bis 4 cm, seine Farbe ist wie die der Zehen gelb.

Die langen und dünnen Zehen sind mit Ballen in Gestalt länglicher, loser Warzen versehen. Auf der Außenzehe befinden sich zwölf bis fünfzehn, auf der Mittelzehe vierundzwanzig bis sechsundzwanzig, auf der Innenzehe zehn bis elf, auf der Hinterzehe fünf Quertafeln. Die übrigen Teile sind fein geneigt. Die Länge der Zehen beträgt ohne Kralle: Außenzehe 2,2 bis 2,3, Mittelzehe 3 bis 3,2, Innenzehe 1,9 bis 2, Hinterzehe 1,4 cm. Die stark gekrümmten und spitzen Krallen sind schwarz und messen im Bogen: an der Außenzehe 1, an der Mittelzehe 1,2, an der Innenzehe 1,2, an der Hinterzehe 1,3 cm. Der abgebildete Fang stammt von einem in Finland erlegten Exemplar.

Kleinere Mitteilungen.

Ein reizendes Idyll hat uns der Künstler auf der dieser Nummer beiliegenden Buntdruck-Tafel dargestellt. Eine ganze Gesellschaft Blau- und Schwanzmeisen hat sich versammelt und betrachtet staunend eine große Raupe, die an einem Aste der Weide, auf der sie sich umhertreiben, emporkriecht. Wirklich schade, daß ein so buntes Bild in der freien Natur kaum vorkommen dürfte. Das Bild ist der neuen Auflage von Naumanns Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas entnommen.

Red.

Nächtlicher Schlupfwinkel für Kohlmeisen. Im Winter 1899/1900, der für unsere Insel recht kalt und schneereich war, entdeckte ich durch Zufall einen höchst eigenartigen Schlupfwinkel, den Kohlmeisen sich für die Nacht ersuchen hatten. In der Nähe meines Hauses auf einem kleinen freien Platze der Dorfstraße steht eine hölzerne Pumpe mit hölzernem Ausflußrohre, aus der mein Knecht vielfach abends gegen 9 Uhr noch Wasser zu pumpen pflegte. Nun pumpte er zu seiner größten Überraschung im Januar d. J. an einem bitterkalten Abend plötzlich zwei Kohlmeisen im eigentlichsten Sinne des Wortes aus dem Rohre heraus, nämlich dergestalt, daß sie mit dem hervorquellenden Wasserstrahle in den angehängten Eimer fielen und, da sie naß und durch den Schreck verwirrt waren, leicht von ihm gegriffen und an ihrer charakteristischen Färbung als diejenigen Vögel erkannt wurden, die sich stets in meinem Garten an den aufgehängten Knochen und Speckschwarten gütlich thaten. Dieses Ereignis wiederholte sich im Laufe des Winters noch dreimal, nur mit dem Unterschiede, daß später die Tierchen nicht mehr bis in den Eimer gelangten, sondern bei dem ersten Schwengelstoße über Hals und Kopf aus dem Rohre hervorkamen und taumelnd davonflogen. Auffallend war, daß die Meisen ihr eigenartiges Quartier in der Regel erst ziemlich spät zu beziehen schienen; jedenfalls wurden sie in allen vier Fällen erst gegen 9 Uhr abends angetroffen, dagegen niemals, wenn aus irgend welchen Gründen schon um 6 oder 7 Uhr der Pumpe das Wasser entnommen wurde. Ich bemerke noch, daß, wenn auch im ganzen auf unserer Insel, namentlich in der Gegend meiner Wohnstätte, wegen Mangels an alten Bäumen wenig Schlupfwinkel für Meisen vorhanden sind, dennoch in der näheren Umgebung der erwähnten Pumpe durch einen ziemlich ausgedehnten, auch mit älteren Bäumen besetzten Pastoratsgarten und durch eine Anzahl von Verlepsi'scher Nistkästen, die ich im vorigen Jahre aufhängte, wohl noch anderweitige Gelegenheit zum nächtlichen Unterschlupf gegeben gewesen wäre.

Landslet, den 5. September 1900.

Dr. med. H. Wullenweber.

Eine merkwürdige Zuneigung legte ein prächtiger männlicher Dompfaff zu einem Bluthänfling desselben Geschlechtes an den Tag. Während besagter Dompfaff im Gesellschaftsbauer gegen andere Finken mit Ausnahme eines Leinzeißigs durchaus gleichgültig schien, gegen manche sogar eine entschiedene Abneigung bekundete, überhäufte er den Hänfling, mit dem er eine Zeitlang in diesem Frühjahr ein Bauer bewohnte, geradezu mit Liebenswürdigkeiten. Sanfte Töne ausstoßend, wie wir sie bisher noch nie von ihm vernommen, eilte der Vogel unruhig auf seinen Sitzstangen hin und her, um jedesmal, wenn er sich seinem Käfiggenossen näherte, mit vorgestrecktem Schnabel und sehnsüchtigem Gezwitzchen ihn zum Schnäbeln einzuladen, wovon dieser durchaus nicht erbaut schien und sich zu-

weilen des zudringlichen Gastes durch Beißen zu entledigen suchte. Einmal ging der Dompfaff sogar in seiner Begeisterung soweit, daß er den Hänfling zu betreten versuchte. In das Bauer geworfenes Nistmaterial nahm der verliebte Vogel sogleich in den Schnabel, bewies überhaupt durch sein ganzes Gebaren große Lust zum Nisten.

Bonn, den 17. Oktober 1900.

Fr. Sehlbach, cand. med.

Im Anschluß an die von mir im März vorigen Jahres mitgeteilte Beobachtung über überwinternde Schwarzkehlchen kann ich in diesem Jahr noch folgendes hinzufügen: Zu meiner Verwunderung traf ich auch in diesem Jahre wieder überwinternde Schwarzkehlchen (*Pratincola rubicola*) in der Umgegend von Bonn an, und zwar war es wieder auf der Chaussee von Bonn nach Godesberg, wo ich am 4. März drei, am 6. März im Laufe des Spazierganges wiederum mehrere dieser niedlichen Vögel in der Nähe des Weges beobachtete.

Bonn, den 9. März 1900.

Fr. Sehlbach.

Burmeister-Denkmal in Buenos Aires. Am 7. Oktober 1900 wurde in Palermo, begünstigt vom schönsten Frühlingswetter, das Denkmal Herman Burmeisters, des großen Forschers und Gründers des Naturhistorischen Museums in Buenos Aires, enthüllt. Der Schöpfer des schönen Denkmals ist Richard Nigier. Burmeister ist in Marmor auf dem Denkmal sitzend dargestellt, einen Tier Schädel, den er in der rechten Hand hält, prüfend, während ein aufgeschlagenes Buch auf seinen Knien ruht. Die Statue wird getragen von einem einfachen Granitsockel, der den Namen „Burmeister“ zeigt. Bald achtundeinhalb Jahr nach seinem Tode hat man an einem seiner Lieblingsplätze im Park 3 de Febrero dem Manne ein Standbild gesetzt, das seiner würdig ist, nachdem er über dreißig Jahre in Argentinien ununterbrochen und unermüdet im Dienste der Wissenschaft thätig gewesen.

Buenos Aires, im Oktober 1900.

Oswald Straßberger.

In diesen Tagen wurde nahe bei Braunschweig ein schlankschwäbliger sibirischer Taunenhäher (*Nucifraga caryocatactes leptorhynchus* R. Blas.) erlegt.

Braunschweig, 5. September 1900.

Professor Dr. R. Blasius.

Wie man im Mittelalter den „Basilisken“ zu Leibe ging. In Nr. 1 dieser Zeitschrift von 1899 besprach ich die Hahnen- und Hennenfedrigkeit und erklärte als die gefürchteten, „Basilisken“ umschließenden Eier solche, welche von hahnenfedrigen Hennen, nach der Meinung der Zeit jedoch von wirklichen Hähnen gegen das Naturgesetz gelegt wurden. Denn hahnenfedrige Hennen sind keineswegs stets (durch hohes Alter, Degeneration des Ovariums, Mißbildung oder Fehlen der inneren Geschlechtsorgane) unfruchtbar, obwohl deren Sterilität die Regel bildet. Interessante Belege hierfür wie für die Kulturgeschichte überhaupt

bieten: „E. G. Happellii Gröste Denkwürdigkeiten der Welt Oder so genannte Relationes Curiosae etc. Der erste Theil. Hamburg, gedr. u. verl. durch Thomas von Wiering im Jahr 1683.“ Der 5. und letzte Band ist vom Jahre 1690. Aus meines Vaters Bibliothek bereits wohlbekannt damit, habe ich in meinen alten Tagen diese noch viel älteren Quartbände wiederholt mit Genuß und Gewinn durchstöbert. Es heißt darin (I. 233): „Der Basilisk oder die allergifftigste Schlange der Welt.“ „Die Egyptier glauben, er werde aus dem Ey eines Ibis, oder schwarzen Egyptischen Storches gezeuget. Albertus hingegen und der gemeine Mann überall behaupten, daß er auß einem Hanen-Ey herfür komme, daß er auch einem Hahn beynahе ähnlich sey, ohne was den Schwanz betrifft.“ Auf Seite 244 wird (nach „Occulta naturae miracula Levini Lemnii, lib. 7, cap. 7) berichtet, zwei alte Hähne zu Ziriksee in Seeland hätten Eier gelegt und dieselben „mit Gewalt ausbrüten wollen, daß man sie endlich mit Stöcken auß dem Nest treiben, erwürgen und die Eyer zerschlagen müssen, um allem besorgenden Unheil bey Zeiten zuvorzukommen.“ Bekanntlich wirkte nach dem damaligen Glauben nicht nur des Volkes, sondern auch der Gelehrten schon der Blick des Basilisken tödlich, weshalb ein dem Ungeheuer vorgehaltener Spiegel den ihm nahenden Menschen schützen, das Tier aber durch die vom Glase zurückgeworfenen eigenen Blicke umbringen sollte. Daher die S. 246 erzählte, uns höchst lächerlich erscheinende, von dem Marburger „Med. Professor D. Johan Pincier“ aber hochernst geschilderte Ausrüstung eines zur Hinrichtung bestimmten armen Sünders, der „unter dem Versprechen seiner Loßzahlung“ in ein Gewölbe hinabstieg, um einen sehr giftigen Basilisken daraus hervorzuheben. „Auff Einrathen der Medicorum“ ward der Mann in eine starke Lederkleidung gesteckt, ringsum mit Spiegeln umhängt, mit Brillengläsern vor den Augen, einer brennenden Kerze für die eine, einer Zange für die andere Hand versehen. Der kühne Mann brachte ein totes Tier in der Größe einer Henne heraus u. s. w. Jedenfalls waren alle Teilnehmer an diesem Schauspieler vom Erfolge höchlich befriedigt.

Hofrat Dr. Wurm.

Ornithologisches aus Happellius. Diese alte Zeitung bringt außer weltgeschichtlichen Ereignissen auch massenhaft Kuriositäten aus allen Naturreichen und Weltteilen in Wort und Bild. Sind beide wohl unbeholfen, oft falsch und grotesk, so fesseln sie doch auch uns besser wissende Epigonen in ihrer Naivität und ihrem Streben nach Erkenntnis. Ich vermute sogar, daß unsere Dichter aus diesen Lederbänden fleißig geschöpft haben. Findet sich doch darin: die Lohengrinjsage, allerdings einfacher als in der Wagnerschen Bearbeitung, eine Tannhäusergeschichte, die Grundlage der „Kraniche des Ibycus“, der Don-Juan-Sage, der „Schwabenstreiche“, die Erzählung von Rinkels „Otto der Schütz“, u. a.

Bluttransfusion, Infusion von Arzneimitteln in Venen, die später von Paullini förmlich ausgebaute „Drekapothete“, Sympathie, Serumtherapie, Massage, Sug- gestion u. wird man mit Überraschung ebenso schon erwähnt finden, wie Waffen mit Mehrladung und Hinterladung und dergleichen mehr. Es seien hier noch einige ornithologische Notizen daraus angeführt. Mimikry, Entwicklung, Um- wandlung und phantasiischste Bastardierung der Tiere erscheint in kindlichster An- schauung. So verwandeln sich nach dem 2. Bande, Seite 1, die blattähnlich gestalteten und gefärbten Insekten (Heuschrecken, Schmetterlinge) gleich direkt in wirkliche Blätter; sie vertauschen einfach „animam sensitivam cum vegetativa“. „Japanische Hunde werden durch vielfältiges Baden im Wasser endlich in Fische verwandelt.“ S. 3: „Einige brasilianische Raupen verwandeln sich nicht in Schmetterlinge, sondern in anmutige Vögelchen, Blumenspechte von den Nieder- ländern genannt.“ Offenbar sind damit die Kolibris gemeint. S. 72 werden Beispiele von lokalem und allgemeinem Albinismus der Vögel aufgezählt. Im 3. Bande, S. 36, ist von den Muskelmägen der Vögel und deren gewaltiger Arbeitskraft die Rede. Von sieben Pistolenkugeln, die man — jedenfalls nach- einander — in den Magen einer Henne eingebracht, hatte nach 50 Stunden eine jede 7 Gran am Gewicht verloren, nach 70 Stunden 12 Gran. Der 4. Band, S. 340, bringt unter der Spizmarke: „Das Cöllnische Teuffels-Geispst“ die oben berührte Lohengringesgeschichte. Vincentius erzählt im „Naturali speculo“ aus Elemandi, lib. 3 c. 26 u. 27, ein unbekannter Ritter sei in einem von einem Schwane an silberner Kette gezogenen Schifflein rheinaufwärts nach Köln gekommen, habe dort geheiratet und viele Kinder gezeugt, sei aber nach etlichen Jahren ebenso geheimnißvoll von dem Schwane wieder abgeholt worden und seit- dem spurlos verschwunden geblieben. Auf Seite 397 desselben Bandes kommt: „Der Raben Zeugniß“, durch welches ein Mörder ebenso überführt wird, wie durch das der Kraniche in dem bekannten Gedichte unseres Schiller. Seite 756 wird die Nacht-Eule als „Nuntia luctus venturi“, wie sie schon Ovid be- nennt, und als „Feralia bubo damna canens“ (Thebaid. stat. I. 3) gruselig genug behandelt, obwohl der Verfasser oder vielmehr der Redakteur jener alten illustrierten Zeitung an vielen Orten gefunden Menschenverstand dem herrschenden Aberglauben und Doktrinarismus, freilich in der bescheidensten Weise, entgegen- stellt. Ich zweifle nicht, daß moderne Forscher, sei ihr Gebiet welches es wolle, genannter Fundgrube noch manche recht wertvolle Bausteine entnehmen können.

Hofrat Dr. Wurm.

Die Stare übernachteten zu vielen Tausenden in der Lloydallee mitten in der Stadt; gegen 6 Uhr fallen sie in dichten Scharen ein, die Zweige biegen sich unter der Last, denn Vogel sitzt an Vogel; in der Allee zu promenieren, ist gefährlich,

die Bänke unbenutzbar und ein ohrbetäubendes Gefreisch erfüllt die Luft. Durch Verkehr in der Straße, auch durch die Straßenbahn, die direkt unter den Bäumen auf beiden Seiten der Allee fährt, lassen sie sich nicht im geringsten stören.

Bremerhaven, November 1900.

Dr. P. Wesner.

Am 9. Mai bemerkte ich auf einem ornithologischen Ausfluge längs der Ilse unterhalb von Osterwieck zu meinem Erstaunen noch einen Bergfinken. Er trieb sich in dem Weidengebüsch am alten Ilsebett in der Nähe der Stummühle herum. Ich erlegte ihn für meine Sammlung. Es war ein altes Männchen im fast vollendeten herrlichen Sommerkleid. Die glänzend schwarzen Federn des Kopfes zeigen kaum noch erkennbare lichte Randung, bei den schwarzen Federn des Rückens und der Flügel ist die lichte Randung zwar noch deutlich vorhanden, aber sowohl viel schmaler als bei den im März und April erlegten Exemplaren als auch mehr weißlich-gelblich an Stelle der rötlich-gelben Färbung des Wintergefieders. Die Kehle zeigt keine Spur von schwarzer Färbung, wie diese ein am 5. April 1900 erlegtes Exemplar aufweist. Ein in so weit vorgeschrittener Jahreszeit hier erlegtes Exemplar dieses nordischen Finken ist jedenfalls interessant, doch handelt es sich im vorliegenden Falle wohl sicher nicht um das Männchen eines Brutpaares, da ich trotz gründlichen Absuchens des ganzen Terrains kein Weibchen zu sehen bekam, sondern nur ein aus irgend einem Grunde allein zurückgebliebenes Exemplar. Den Grund des Zurückbleibens scheint eine kleine Narbe an der crista des Brustbeins anzudeuten. Vielleicht rührte dieselbe von einem Dunstschuß her, den ich am 5. April am Schauener Walde — etwa 6 km von der jetzigen Fundstelle entfernt — auf einen in einem Kirschbaume an der Chauffee sitzenden Schwarm Bergfinken abgegeben hatte und der zwei Männchen — eines mit, das andere ohne schwarze Kehle — herabfallen ließ. Unser Spätling mag dabei auch leicht verwundet worden und durch die Wunde länger in hiesiger Gegend zurückgehalten sein. Er war gut bei Leibe, hatte den Magen voll Sämereien und stark entwickelte Testikeln.

Osterwieck, im Juni 1900.

Fr. Lindner.

Daß einige Nebelkrähen (*Corvus cornix* L.) auch im Sommer hier bleiben, habe ich nun in mehreren Fällen durch ganz sichere Beobachtungen derselben im Fallstein konstatieren können. In der Brutzeit sah ich einzelne in den Revieren, in denen viele Rabenkrähen nisten. Die in hiesiger Gegend erlegten Bastarde — einen habe ich selbst im Winter in meinem Garten geschossen — können also aus hiesiger Gegend stammen.

Osterwieck, im Juni 1900.

Fr. Lindner.

Bei dem Präparator Karl Feustel wurde ein unverletztes Hühnchen zum Ausstopfen eingeliefert. Dieser für unsere Gegend höchst seltene Vogel ist

von dem Kaufmann Paul Laß in Dittersdorf bei Berga in der Nacht vom 12. zum 13. September im Pfahleisen gefangen worden. Das Prachtexemplar hat eine Länge von 64 und eine Flügelweite von 158 Centimetern. Das Gefieder ist in allen seinen Teilen so vorzüglich erhalten, daß von einem Aufenthalte in der Gefangenschaft nicht die Rede sein kann.

Gera.

E. Fischer.

Rauchschwalben-Albino. Auf den Telegraphendrähten der Saalbahn zogen zwei auffallend hell gefärbte Rauchschwalben unsere Aufmerksamkeit auf sich. Sie waren weißgrau, Augen rot, Unterseite heller als Oberseite, die rötliche Kehle durch einen grauen Anflug angedeutet. Neben drei normalen *Hirundo rustica*, ihren Nestgeschwistern, saßen sie und wurden von den Alten gefüttert. Später sahen wir sie in der Saale baden.

Jena, 15. Juli 1900.

Ornith. Verein am Gymnasium C.-A. zu Jena.

Von fünf in meinem Gesellschaftsbauer mit anderen Finken zusammengehaltenen, von mir gezüchteten Bastarden eines Stieglitzmännchens und Kanarienvogelweibchens gaben im Frühjahr vorigen Jahres zwei weibliche Vögel lebhaftere Neigung zum Nisten zu erkennen. Ein jedes der beiden Tiere wurde mit einem männlichen Bastarde in ein besonderes Bauer gesetzt. Das Weibchen des einen Paares, wie das Männchen ein junger Vogel vom vorhergehenden Jahre, begann sogleich mit dem Nestbau, legte in das fertiggestellte Nest ein Ei, kümmerte sich nun aber um nichts mehr und dachte erst nach acht Tagen, nachdem das Ei längst entfernt war, daran, sich um die Wiederherstellung des gänzlich vernachlässigten und zerzausten Heimes seiner künftigen Nachkommenschaft wieder zu bemühen. Es wurden noch zwei Eier gelegt, dieselben wenige Tage bebrütet, dann jedoch im Stiche gelassen. In das Gesellschaftsbauer zurückgebracht, ließ derselbe Vogel innerhalb von zehn Tagen noch zwei Eier auf die Erde fallen. Das zweite Pärchen, ein zweijähriges Männchen und vorjähriges Weibchen, berechtigte zu besseren Hoffnungen. Ein sorgfältig gebautes Nest belegte besagtes Weibchen mit fünf Eiern, von denen zwei zerbrochen und herausgeworfen, die übrigen leider erfolglos so lange mit großer Hingabe bebrütet wurden, bis ich sie entfernte. Auch in diesem Frühjahr brütete dasselbe Tierchen wieder auf fünf Eiern höchst ausdauernd, jedoch wieder vergeblich. Das Männchen des letztgenannten Paares gebärdete sich während des Nestbaues äußerst ungestüm, nahm oft Niststoffe in den Schnabel, schlug heftig dabei mit diesem und den Flügeln auf die Erde, sich dick dabei aufblähend, ging auch zuweilen in das Brutkästchen, ohne sich jedoch, wie es schien, am Nestbau selbst zu beteiligen. Auch der andere männliche Bastard zeigte sich paarungslustig, gegen das ihm beigeßelte Weibchen oft recht zärtlich,

was er durch häufiges Schnäbeln mit demselben zu erkennen gab. Die Eier der Bastarde sind im Verhältnis zu denen des mütterlichen Kanarienvogels außerordentlich klein, obwohl die Vögel kräftig und wohlentwickelt sind. Sowohl in Größe und Form als auch in der Färbung machen sich mannigfache Verschiedenheiten bemerkbar. Von acht mir vorliegenden Exemplaren besitzen zwei eine entschieden länglich ovale, fünf andere eine ihnen ähnelnde, aber mehr bauchige Gestalt. Ihre Färbung läßt auf bald matt, bald glänzender grünlichblauem Untergrunde sanft graubraune Fleckchen und Wolken erkennen, die zumal um das stumpfe Ende oder an demselben dichter zu sein pflegen. An dieser Stelle sind auch sonst weniger zahlreich verteilte rotbraune Punkte und Striche vorhanden. Bei zwei Eiern ist die Anordnung der Flecke eine andere; bei dem diesjährigen Gelege befand sich eins, welches die sonst üblichen rotbraunen Punkte und Striche nicht aufzuweisen hatte. Es fiel mir auf, daß in einem Ei des ebengenannten Geleges zwei zarte Eiblässe zu sehen waren. Waren diese vielleicht von dem Weibchen beigebracht worden, um den Inhalt des Eies zu untersuchen nach langem vergeblichem Brüten?

Bonn, 17. Oktober 1900.

Fr. Sehlbach, cand. med.

Am 25. Mai schoß ich eine männliche Rabenkrähe (*Corvus corone* L.), die an beiden Seiten des Kopfes einen vom Schnabelwinkel unter den Augen weg nach der Ohrgegend verlaufenden, etwas durch normale schwarze Federn unterbrochenen Streifen weißer Federn hat. Ich habe das Exemplar für meine Sammlung gebalgt.

Fr. Lindner.

Hirundo rustica L. var. **pagorum** Chr. L. Brehm. Von der rostgelbbäuchigen Form der Rauchschwalbe habe ich in diesem Frühjahr bei Osterwieck mehrere Exemplare, darunter eine von ziemlich dunkler Färbung der Unterseite, beobachtet. Ein am 9. Mai bei Stötterlingen erbeutetes Männchen dieser Varietät befindet sich in meiner Sammlung. — In hiesiger Gegend hört und liest man vielfach, daß in diesem Jahre weit weniger Schwalben da seien als in früheren Jahren. Wie steht's damit in anderen Gegenden?

Osterwieck am Harz, den 7. Juni 1900.

Fr. Lindner.

Da in Nr. 12 des vorigen Jahrganges Herr Christleit seine Beobachtungen über die Stimme von *Totanus ochropus* mitteilt und „diese Frage allen Beobachtern unserer Sumpfvögel zur Prüfung vorlegt“, glaube ich, unter Zurateziehung meines Reisetagebuches, auch meine Beobachtungen mitteilen zu dürfen. Ich fand *T. ochropus* 1898, 1899 und 1900 in sehr beträchtlichen Mengen in den waldigen Sumpfsgebieten Slavoniens, wo dieser Vogel der gewöhnlichste Vertreter seiner Familie ist. Eine Verwechslung mit einer anderen Art ist ausgeschlossen, da ich viele Exemplare geschossen und auch einige als Bälge, die ich

noch besitze, aufbewahrt habe. Meine äußerst zahlreichen Beobachtungen beziehen sich allerdings vorzugsweise auf die Monate Juli und August. Ich kann über den Ruf von *T. ochropus*, in aller Kürze gesagt, nur den alten Ansichten darüber zustimmen. Nach meinen völlig von Büchern unabhängigen Aufzeichnungen, an Ort und Stelle niedergeschrieben, ist der Lockruf während des Fluges gewöhnlich dreisilbig, manchmal auch zweisilbig, wobei der erste Laut von den beiden übrigen etwas getrennt wird. Also einfach ausgedrückt: dü—dütie, — / — —, manchmal auch düi—di, oder wie ich nun auch gedruckt sehr richtig lese: dlüh = dlüidlüh. Dieser Ruf wird besonders im Abfliegen oder auch im Umherfliegen außerordentlich häufig ausgestoßen, sodaß man in kurzer Zeit den Vogel daran erkennt. Im Sitzen verhält er sich stiller und läßt manchmal auch neben dem mitgeteilten Rufe ein scharfes „ih“ hören. Ohne damit ausführlicher auf diese Angelegenheit eingehen zu wollen, stimmen also meine Beobachtungen mit denen des Herrn Christoleit nicht überein, wohl aber mit den bisher üblichen Ansichten. Ich glaube nochmals darauf hinweisen zu können, daß ich *Totanus ochropus* in Hunderten von Exemplaren beobachtet habe.

Dresden-Blauen.

Bernh. Hantsch.

Litterarisches.

Der vollendet vorliegende achte Jahrgang der illustrierten Zeitschrift für alle Naturfreunde „*Natur und Haus*“ reiht sich den vorangegangenen würdig an. Eine Reihe tüchtiger Mitarbeiter hat sich vereinigt, um in ihren Spezialfächern denen, die sich belehren wollen oder denen, die in ihren naturwissenschaftlichen Liebhabereien Rat und Unterstützung suchen, ihre Erfahrungen auch anderen zugänglich zu machen. Uns interessieren vor allen Artikel ornithologischen Inhalts, von denen der Band nicht weniger als sechsundzwanzig enthält. Unsere einheimische Vogelwelt ist ebenso vertreten als die Exoten, deren Züchtung sich eine große Anzahl Vogelfreunde angelegen sein läßt. Von großem Interesse sind die Akklimatisationsversuche Dr. von Wissels, der unseren Kanarienvogel, ähnlich wie schon länger Herr von Prosch, im Freien eingebürgert hat. Auch der Vogelschutz hat eine gute Stätte gefunden insofern, als H. Barfod mit Recht gegen den Massenmord unserer Singvögel auf Helgoland Protest erhebt und die Einführung des deutschen Vogelschutzgesetzes auf dieser Insel fordert.

Dr. Koepert.

Dr. Martin Bräß, unsere gefiederten Freunde. Leipzig 1901. Hermann Seemann Nachfolger.

Unser getreuer Mitarbeiter Dr. Bräß übergibt in Buchform eine Anzahl ornithologischer Vorträge der Öffentlichkeit, durch die er die Bestrebungen des Deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt gern unterstützen möchte. Wir sind ihm für seine Beihilfe zu lebhaftem Danke verpflichtet und haben beim Durchlesen des Buches die Überzeugung gewonnen, daß dasselbe im Kampfe für den Vogelschutz — wie wir den letzteren auffassen — von hervorragendem Werte



Natürl. Grösse.

- Parus coeruleus* L. Blaumeise. 1 junger Vogel. 2 alter Vogel.
Aegithalus caudatus (L.). Weissköpfige Schwanzmeise. 3 altes Männchen.
Aegithalus caudatus vagans (Latham). Schwarzbrauige Schwanzmeise. 4 altes Männchen. 5 junger Vogel.
Aegithalus caudatus Irbyi (Sharpe u. Dresser). Südliche Schwanzmeise. 6 Männchen.
Parus cyanus Pall. Lasurmeise. 7 Männchen. *Parus Pleskei* Cab. Russische Blaumeise. 8 Männchen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1901

Band/Volume: [26](#)

Autor(en)/Author(s): Wullenweber H., Redaktion , Sehlbach Friedrich, Straßberger O., Wurm , Weßner P., Lindner Fr., Fischer Emil, Hantzsch Bernhard

Artikel/Article: [Kleinere Mittheilungen. 67-75](#)