

Alpendohle, *Pyrrhocorax graculus*: K-1952 Brutvogel. Weit verbreitet in der alpinen Stufe. Wintergast im Tal.

Alpenkrähe, *Pyrrhocorax pyrrhocorax*: Erstbeobachtung: August 1977, Defreggerhaus, 2.950 m (Goller-Mesker).

Dohle *Corvus monedula*: K-1952: Brutvogel (etwa bis 1983, Schloss Heinfels). Seither keine Beobachtungen.

„Halsbanddohle“, *Corvus m. soemmeringii*: Schwarm auf Feldern bei Jungbrunn: April 1980 (H), einzige Beobachtung.

Saatkrähe, *Corvus frugilegus*: K-1952: Durchzügler; regelmäßige Schwärme ab November im Lienzer Raum.

Aaskrähe, *Corvus corone*: K-1952: Brutvogel; vorwiegend Rabenkrähen, wenig Nebelkrähen (ca. 10 %).

Kolkrabe, *Corvus corvus*: K-1952: Brutvogel; Brutbereich: vom Tal (bei Lavant Brutkolonie!) bis ca. 2.200 m.

Stare – Sturnidae

Star, *Sturnus vulgaris*: K-1952: Brutvogel; zahlreich brütend im Lienzer Raum, vereinzelt in Virgen, Kals, Defereggen (bis 1.750 m).

Rosenstar, *Sturnus roseus*: Irrgast; Wenige Beobachtungen in Lienz ab 1984.

Hirtenmaina, *Acridotheres tristis*: Irrgast. Eine Beobachtung: Lienz, 1984.

Blaurohrglanzstar, *Lamprocolins chalybaeus*: Irrgast; einige Beobachtungen: Prägraten 1976 (Berger), Defereggen, 1994 (Stemberger), Penzendorf, 1982 (Kranebitter).

Sperlinge – Passeridae

Haussperling, *Passer domesticus*: K-1952: Brutvogel; häufiger Brutvogel bis etwa 1.300 m.

Italiensperling, *Passer domesticus italiae*: Durchzügler, mehrere Beobachtungen im Sommer seit 1980.

Feldsperling, *Passer montanus*: K-1952: Brutvogel. Verbreitung: bis in die Täler (Kals, Gailtal u. a.).

Schneefink, *Montefringilla nivalis*: K-1952: Brutvogel; Brutareale bis 2.800 m.

Finken – Fringillidae

Buchfink, *Fringilla coelebs*: K-1952: Brutvogel; Brutnachweise in allen Höhenlagen bis 1.900 m (Moritz).

Bergfink, *Fringilla montefringilla*: K-1952: Durchzügler. Eine Brutzeitbeobachtung: Juni 1980, Tauerntal.

Girlitz, *Serinus serinus*: K-1952: Brutvogel. Brutbereiche bis ins hintere Virgental. Überwinterung möglich.

Zitronengirlitz, *Serinus citrinella*: Beobachtungen: Gailtal, 1980; Virgental, 1983 (Goller-Mesker) u. a.

Erlenzeisig, *Carduelis spinus*: K-1952: Brutvogel; verbreiteter Brutvogel bis ca. 1.700 m. Wintergast aus Nordeuropa (Ringfund).

Grünling, *Carduelis chloris*: K-1952: Brutvogel. Brutbereiche vom Tal bis ca. 1.900 m (Moritz).

Bluthänfling, *Carduelis cannabina*: K-1952: Brutvogel; spärlich verbreiteter Brutvogel bis ca. 1.900 m: Defereggen u. a.

Berghänfling, *Carduelis flavirostris*: Einzige Beobachtung am 5. 1. 1975, Lienz-Süd: kleiner Schwarm (H).

Stieglitz, *Carduelis carduelis*: K-1952: Brutvogel; Verbreitungsgebiete: alle Täler bis etwa 1.400 m (Moritz).

Birkenzeisig, *Carduelis flammea*: K-1952: Brutvogel; häufiger Brutvogel in der Almregion bis etwa 2.000 m.

Karmingimpel, *Carpodacus erythrinus*: Seit Juni 1992 regelmäßig am Tassenbacher Speicher, Mai bis Juni: Brut möglich.

Gimpel, *Pyrrhula pyrrhula*: K-1952: Brutvogel. Beobachtungen in allen Tälern bis 2.000 m.

Kernbeißer, *Coccothraustes coccothraustes*: K-1952: Brutvogel. Selten als Brutvogel beobachtet (Oberlienz).

Fichtenkreuzschnabel, *Loxia curvirostra*: K-1952: Brutvogel. Verbreitetes Brutgebiet bis etwa 2.000 m.

Ammern-Emberizidae

Goldammer, *Emberiza citrinella*: K-1952: Brutvogel. Jahresvogel in allen Tälern bis über 1.500 m.

Zippammer, *Emberiza cia*: Beobachtungen ab 1984: Gailtal (Goller), Virgen (Mesker), Defereggen (Stemberger), Peischlach (Ströckl). Brut: 1998, St. Johann i. W. (Moritz).

Ortolan, *Emberiza hortulana*: K-1952: Brutvogel im Lienzer Raum. Bis 1996 Einzelbruten bei Tristach; seither Durchzügler.

Graumammer, *Miliaria calandra*: K-1952: Seltener Brutvogel. Seither nur unsichere Beobachtungen: Ainet, St. Veit, Lienz.

Schneeammer, *Plectrophenax nivalis*: Selten beobachtet: Unterpeischlach, 1990 (K., Chr. Berger); Oktober 1999: Dölsach (Bachler).

Irrgäste, die nicht in die Liste aufgenommen wurden:

Heringsmöve, *Larus fuscus*: Einzige Beobachtung 1980, Matrei i. O. (H).

Steppenhuhn, *Syrhaptes paradoxus*: 1888, Pustertal (Dulitz).

Pelikan, *Pelicanus onocrotatus*: zwei Exemplare geschossen am Olinger Stausee, vor 1966. Stopfpräparate in Sexten.

Schwarzkehlrossel, *Turdus ruficollis atrogularis*: Einzige Beobachtung Feber 1976, Lienz (H).

Lasurmeise, *Parus cyanus*: Einzige Beobachtung: April 1968, Tristach (Haring).

Beo, *Gracula ptilogenys*: Einzige Beobachtung, Tristach 1993 (Steurer).

Naumannsdrossel, *Turdus manmann*: Zwei Beobachtungen, 1996 (H).

Prachteiderente, *Sommateria spectabilis*: Irrgast. Einzige Beobachtung: 1960 (Berg/Drautal).

Alois Heinricher

Die Vogelwelt des Dorfertaales (Kals a. G.)



Über die Vogelwelt des Dorfertaales gibt es erst seit 1938 fachlich fundierte Beobachtungen, die mehrfach von Sommergästen stammen, wie von A. Minkner und Flore Bernd. Von Arthur Minkner, einem Biologen aus Leipzig, stammen die ersten Aufzeichnungen über Vogelarten im Gebiet von Kals. Er verbrachte im Sommer 1938 hier mehrere Urlaubswochen und notierte auf seinen Wanderungen eine Menge vogelkundlicher Beobachtungen. Von Heinrich Dathe wurden diese im Jahre 1944 in den „Berichten des Vereins Schlesischer Ornithologen“ veröffentlicht.

Mit dem Jahre 1980 beginnen gezielte Erhebungen: Franz Goller und Cees Mesker (ein Holländer) arbeiteten mehrere Jahre zusammen an einer Erhebung der Vogelwelt des geplanten Nationalparks Hohe Tauern. Die Exkursionen der

◀ *Blick vom Spinevitrol talauswärts.*

Foto: Alois Heinricher

Vogelarten	1 1980 bis 1984	2 Juni 1980	3 Mai 1994	4 Juni 1938	5 1978 bis 2000	6 1979, 1995	7 1978 bis 2000	8 2001, 2002
Bartgeier							So. 1999	
Gänsegeier	Juli 1980						April 1987	
Steinadler	1980, 1983		4 Beob.	Beob.		1979	10. 9. 2000	
Wespenbussard						1979		
Mäusebussard							10. 9. 2000	
Sperber				Beob.				
Wanderfalke						Brut, 1979		
Turmfalke	1983 (3)		2 Exempl.			4. 6. (1)	1978 (1)	2001 (1)
Alpenschneehuhn							mehrere	
Birkhuhn			Beob.				mehrf.	
Steinhuhn							mehrf.	
Ringeltaube	1983 (1)		mehrf.			Aug. 1979		
Kuckuck	1983		Beob.		Juni			Juni 2001
Sperlingskauz							Aug. 2000	
Alpensegler	1983	Beob.	Beob.		Aug.79(2)	Aug. 1995	Aug. 1986	
Mauersegler						Aug. 1995		
Bergpieper				Brut	Okt. 2000			Juli 2002
Felsenschwalbe	1983	Beob.	Beob.			Aug. 1995	Brut 2000	
Rauchschwalbe		Beob.	Beob.			Aug. 1995		
Mehlschwalbe		Beob.	mehrf.					
Baumpieper	Juli 1983		Beob.		Juni 2000		Sept. 2000	
Bachstelze	Juli 1983	Beob.	Beob.		Juni, Aug.			
Gebirgsstelze		Beob.	Beob. (4)	Beob.			Mai 1993	Beob. 2000
Grünspecht								Juni 2000
Buntspecht								Beob. 2001
Schwarzspecht			Beob. (1)		Aug. 2000			
Dreizehenspecht					Aug. 2000			
Wendehals						Aug. 1979		
Zaunkönig	Juli 1983		Beob. (4)	Beob.	Juni 2000			
Wasseramsel	1984: Brut		Beob. (5)		Okt. 2000	mehrf.	mehrf.	
Heckenbraunelle	1984: Brut		Beob.		Aug. 2000		Sept. 2000	
Alpenbraunelle				Beob.				Aug. 2002
Rotkehlchen			Beob.					
Hausrotschwanz	1984: Brut		Beob.	häufig	Okt. 2000		1993, 2000	
Steinschmätzer			Beob.	häufig	Sept. 1978	Aug. 1979		
Braunkehlchen		Beob.	Beob: 1 P.		Juni 2000	Juli 1979		Juni 2001
Misteldrossel Amsel			Beob	Beob.		Juni 2000	Juli 1979	Juni 2001
Wacholderdrossel	1983		Beob.			1979, 2000		Juni 2001
Ringdrossel	1983: Brut			Beob.	Aug. 2000	Aug. 1979	Sept. 2000	
Gartengraszmücke								
Mönchsgrasmücke			Beob (2)	Beob.	Juni 2000	Aug. 1979		Juni 2001/02
Klappergrasmücke			Beob.	Beob.	Juni 2000	Juli 1979		Juni 2001
Berglaubsänger								Juni 2001
Zilpzalp					Juni 2000			Juni 2001
Wintergoldhähnchen				Beob.	Juni 2000			
Trauerschnäpper							Sept. 2000	
Weidenmeise				Beob.	Juni 2000		Sept. 2000	Juni2001,02
Tannenmeise					Juni 2000		Sept. 2000	Juni 2001
Blaumeise							Sept. 2000	
Kohlmeise							Sept. 2000	
Mauerläufer	1983 (1)			2 P.			1993	
Tannenhäher				Beob.	Juni 2000		Sept. 2000	Okt. 2001
Alpendohle				Beob.	Okt. 2000		Sept. 2000	
Rabenkrähe			Beob.	Beob.			Sept. 2000	Sept. 2001
Kolkrahe		Beob.		Beob.	Aug. 2000		Sept. 2000	
Pirol	1983							
Buchfink		Beob.	Beob	Beob.	Aug. 2000			Okt. 2001
Bergfink				Beob.				
Birkenzeisig	1983 (100)		Beob	häufig.	Aug. 2000			Okt. 2001
Erlenzeisig	1983 (50)					Aug. 1979		
Zitronengirlitz						Aug. 1995		
Girlitz	1983 (1)							
Fichtenkreuzschnabel					Juni 2000			
Gimpel				häufig				



▲ *Alpensegler: verletzter Vogel in Pflege. Daberklamme: eines der wenigen Brutreviere.*
 ◀ *Kolkrabe: ständiger Brutvogel im Dorfertal.* Fotos: Alois Heinricher

„Monticola-Tagung“ 1980 sowie der BirdLife-Österreich-Tagung 1994 in Lienz brachten wertvolle fundierte Daten. Diese Gemeinschaftsarbeiten wurden in den folgenden Jahren immer wieder ergänzt durch gezielte Erhebungen einzelner Ornithologen, wie Sabine Werner, Dieter Moritz und Alois Heinricher, aber auch durch zahlreiche Informationen heimischer Beobachter.

- 1: F. Goller und C. Mesker: Beobachtungen 1980 bis 1984
- 2: Monticola-Tagung – Oberlienz, Exkursion am 9.6.1980
- 3: BirdLife-Tagung – Lienz, Exkursion am 13.5.1994
- 4: A. Minkner – H. Dathe, Beobachtungen im Sommer 1938; publiziert 1944.
- 5: Alois Heinricher, Beobachtungen in den Jahren 1978, 1981, 2000
- 6: Bernd Flore, Beobachtungen im Juli 1979 und August 1995



Braunkehlchen: wahrscheinlich einige Brutreviere im Dorfertal. Bedrohte Vogelart! Foto: Archiv Alois Heinricher

- 7: Andere Beobachter; Sabine Werner (1993), Dieter Moritz u. a.
- 8: Alois Heinricher, Beobachtungen 2001 und 2002.

In dieser Liste (Seite 7) sind einige Besonderheiten hervorzuheben:

Es ist dies in erster Linie die Beobachtung der Brut eines Wanderfalcons im Gebiete der Blauspitze durch Bernd Flore im August 1979 und ein starker Zugtag von Mauerseglern in den letzten Augusttagen 1995 als außergewöhnlich später Termin. Als bemerkenswert gelten sicher die Beobachtungen von Zitronengirlitz (August 1995) und Braunkehlchen in den vorderen Ebenen (2000 und 2001) mit Brutverdacht.

Um das Bild von der Vogelwelt im Kalscher Gebiet abzurunden, müssten auch einige Nachbargebiete einbezogen werden. Es sind dies vor allem das Ködnitztal, einschließlich der Greiwiesen.

Das Ködnitztal: Erhebung im Mai 1994, Bereich Lucknerhaus-Lucknerhütte. Einige der festgestellten Arten reichen hier weiter hinein als im Dorfertal, wie etwa Eichelhäher und Singdrossel (mit Brutnachweis). Andere bemerkenswerte Vogelarten sind: Turmfalke, Kuckuck, Baumpieper, Bergpieper, Misteldrossel, Wacholderdrossel, Tannenhäher, Berg-Laubsänger, Zilpzalp, Mönchsgrasmücke (nur bis 1.500 m) und Zwergschnäpper (Minkner 1938). Unter der Greischneid (1.900 m) hat U. Ströckl die Brut des Dreizehenspechtes festgestellt.

Auf den Greiwiesen ist vermutlich der höchste Brutplatz der Feldlerche in Osttirol (2.350 m).



Schön-Ebene.

Fotos: Alois Heinricher

IMPRESSUM DER OHBL.:

Redaktion: Univ.-Doz. Dr. Meinrad Pizzinini. Für den Inhalt der Beiträge sind die Autoren verantwortlich.

Anschrift des Autors dieser Nummer: OSR Alois Heinricher, Hauptschuldirektor i. R., A-9900 Lienz, Roter Turm-Weg 1.

Manuskripte für die „Osttiroler Heimatblätter“ sind einzusenden an die Redaktion des „Osttiroler Bote“ oder an Dr. Meinrad Pizzinini, A-6176 Völs, Albertstraße 2a.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Osttiroler Heimatblätter - Heimatkundliche Beilage des "Osttiroler Bote"](#)

Jahr/Year: 2003

Band/Volume: [2003-04-klein_a](#)

Autor(en)/Author(s): Heinricher Alois

Artikel/Article: [Die Vogelwelt des Dorfertaales \(Kals a. G.\) 1](#)