

CURT HARTMANN

Mitteilungen zur Avifauna von Nordhessen nach der Belegsammlung des Naturkundemuseums zu Kassel**II****Abstract**

Ten remarkable species of birds are recorded for the North Hessian region, including biometrical data on 45 individuals of the European woodcock (*Scolopax rusticola* L., Scolopacidae, Charadriiformes).

Einführung

Die Ornithologische Abteilung des Naturkundemuseums zu Kassel ist seit 1950 bemüht, alle vorgelegten geschossenen oder tot aufgefundenen Vogelarten des nordhessischen Gebiets statistisch zu erfassen, auch wenn sie aus diesem oder jenem Grund nicht als Präparate im Hause verbleiben (HARTMANN 1970). Nachfolgend werden Belegdaten von Stücken mitgeteilt, die dem Museum lediglich als Frischmaterial vorgelegen haben.

Belegliste*Anas crecca crecca* L. — Krickente

St 164 ♂ XII. 1961, Ederstau Affoldern (Kreis Waldeck), geschossen.
333 g (fett), Flügel 188 mm.

St 166 ♂ 9. I. 1962, Hönebach (Kreis Rotenburg), geschossen.
337 g, Flügel 196 mm; Magen leer, nur Magensand.

St 305 ♂ juv., 16. XII. 1963, Eder bei Hemfurth, geschossen.
316 g, Flügel 183 mm.

St 187 *Mergus albellus* L. — Zwergsäger

♂ 15. III. 1962, an der Fulda bei Sandershausen (Kreis Kassel), tot gefunden.
520 g, Flügelmaß nicht genommen; im Magen nur Magensteine.

Pernis apivorus apivorus (L.) — Wespenbussard

St 397 ♂ 27. X. 1966 (!?), Reinhardswald (Kreis Hofgeismar), geschossen.
837 g (etwas fett), Flügel 390 mm, im Kropf und Magen 35,7 g Jungwespen und Puppen.

(Das sehr späte Funddatum, das der Einlieferer des Vogels angegeben hat, scheint, beurteilt nach dem Mageninhalt, nicht zu stimmen. Leider muß man immer mehr damit rechnen, daß Funddaten aus dem Gedächtnis falsch angegeben werden, weil die Tiere zunehmend nach dem Erlegen oder nach dem Fund in Kühlgeräten aufbewahrt werden.)

- St 327 ♂ 26. VI. 1964, Gellershausen (Kreis Waldeck), erschlagen.
731 g (nicht fett), Flügel 390 mm, kein deutlicher Brutfleck.
Testes: links 12 x 7, rechts 10,5 x 5,5 mm; Kropf- und Mageninhalt: 33 g Bienen, Wespen und Wespenlarven.
- St 147 *Pandion haliaetus haliaetus* (L.) – Fischadler
♂ 18. IX. 1961, Kiesteiche bei Eschwege, geschossen.
1600 g (fett), Flügel 485 mm.
- St 126 *Lyrurus tetrix tetrix* (L.) – Birkhuhn
♂ ad., 2. V. 1961, Rhön, Rotes Moor, geschossen.
1305 g, Flügel 265 mm.
- St 399 *Coturnix coturnix coturnix* (L.) – Wachtel
♀ 29. IX. 1966, Herfa (Kreis Hersfeld), geschossen.
100 g (fett), Flügel 114 mm; in Kropf und Magen 2,2 g Sauerampfersamen und etwas Sand.
- St 405 a *Crex crex* (L.) – Wachtelkönig
♀ V. 1966, Nentershausen (Kreis Rotenburg), tot gefunden.
154,7 g (fett), Flügel 136 mm; Magen leer.
Ovar 35,2 x 11,8 mm = 0,7 g, Follikel bis 9,3 mm ϕ .
Capella gallinago gallinago (L.) – Bekassine
- St 282 ♀ 6. III. 1963, Kassel, tot gefunden auf der Straße im Stadtgebiet.
99,5 g (sehr fett), Flügel 140 mm; im Magen etwas Sand.
Ovar 10,2 x 3,4 mm, Follikel bis 2 mm ϕ .
- St 344 ♂ 20. XI. 1964, Gellershausen (Kreis Waldeck), mit Flügelbruch gefunden.
69,5 g (mager), Flügel 140 mm; Magen leer.
- St 404 ♂ XII. 1966, Homberg a. d. Efze, geschossen.
107,4 g, Flügel 140,5 mm; im Magen etwas feiner Sand.
- Scolopax rusticola* L. – Waldschnepfe
In den Jahren 1958 bis 1966 konnten aus dem Bezirk Kassel 41 Stück bei der Frühjahrshalz und 4 Stück im Herbst erlegte Waldschnepfen für Wägungen und Messungen erfaßt werden.
- 1958: 2 ♂♂ Gewichte 285, 301 g; Flügel 202, 200 mm.
- 1959: 5 ♂♂ Gewichte 318, 295, 331, 272, 285 g;
Flügel 200, 195, 204, 196, 203 mm.
- 1961: 6 ♂♂ Gewichte 270, 312, 277, 303, 285, 280, 248 g;
Flügel 193, 202, 204, 205, 203, 204, 200 mm.
- 1962: 8 ♂♂ Gewichte 287, 291, 283, 319, 302, 355, 283, 266 g;
Flügel 200, 200, 214, 204, 205, 211, 193, 195 mm.
- 1 ♀ Gewicht 282, Flügel 208 mm.
- 1963: 1 ♂ Gewicht 312 g; Flügel 201 mm.
- 1964: 5 ♂♂ Gewichte: 333, 325, 358, 302, 305 g;
Flügel 195, 192, 200, 199, 199 mm.
- 3 ♀♀ Gewichte 334, 378, 333 g;
Flügel 194, 215, 195 mm.
Hiervon 1 Stück (378 g) legereif, 1 Stück (334 g) Ovar gering entwickelt.

- 1965: 6 ♂ ♂ Gewichte 336, 273, 319, 289, 305, 305 g;
Flügel 207, 195, 196, 203, 200, 199 mm.
1 ♀ Gewicht 330 g, Flügel 196; Ovar gering entwickelt, Follikel 4 mm ϕ .
1966: 4 ♂ ♂ Gewichte 333, 332, 373, 302 g;
Flügel 205, 200, 201, 198 mm.
4 Herbstvögel (geschossen 20., 31. X. und 8. XI.)
Gewichte ♀ 301, ♂ ♂ 324, 324, 271 g;
Flügel ♀ 205, ♂ ♂ 195, 195, 199 mm.

St 406 *Rissa tridactyla tridactyla* (L.) – Dreizehenmöve

♀ ad., Ruhekleid, 15. II. 1967, Kassel, Baggerteich an der Fulda, tot gefunden.
278 g (stark abgemagert), Flügel 310 mm; im Magen Fischreste.

Zusammenfassung

Die Belegdaten 10 bemerkenswerter, im nordhessischen Raum aufgefundener oder erlegter Vogelarten werden mitgeteilt; eingeschlossen sind biometrische Messungen an 45 Individuen der Waldschnepfe (*Scolopax rusticola* L., Scolopacidae, Charadriiformes) aus dem gleichen Gebiet.

Schrifttum

HARTMANN, C., 1970: Mitteilungen zur Avifauna von Nordhessen nach der Belegsammlung des Naturkundemuseums zu Kassel. I. Philippia 1: 38–43.

Manuskript bei der Schriftleitung eingegangen am 5. Juni 1971.

Anschrift des Verfassers:

C. HARTMANN
Naturkundemuseum im Ottoneum
Steinweg 2
35 Kassel 1
BRD

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Philippia. Abhandlungen und Berichte aus dem Naturkundemuseum im Ottoneum zu Kassel](#)

Jahr/Year: 1970-1973

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Hartmann Curt

Artikel/Article: [Mitteilungen zur Avifauna von Nordhessen nach der Belegsammlung des Naturkundemuseums zu Kassel II 95-97](#)