

GERHARD FOLLMANN

Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi Editi**VI****Fasciculus****Abstract**

The lichen exsiccate „Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi Editi“, a collection of chorologically, ecologically, sociologically, and taxonomically interesting species of all over the world, is continued with the labels for numbers 101–120.

**G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE
NATURALIS CASSELENSI EDITI****No. 101. *Acarospora placodiiformis* MAGN.**

(Acarosporaceae)

A. H. MAGNUSSON: Göteborgs kung. Vetensk.- Vitterh.-samh. Handl. **VI, B, 6 (17)**, 18 (1956)

Zentralspanien, Prov. Madrid: gesellig in schwach geneigten, licht- und windoffenen Trockenrasenlücken auf Gipshügeln im *Toninion caeruleonigricantis* REIMERS, 550 m, SO–SW, pH 7,5, Cerros Yesíferos de Aranjuez unweit der Laguna de Ontígola

leg. A. CRESPO et E. BARRENO (VI/1973)

det. A. CRESPO (VIII/1973)

**G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE
NATURALIS CASSELENSI EDITI****No. 102. *Alectoria ochroleuca* (HOFFM.) MASS.**

(Usneaceae)

A. B. MASSALONGO: Sched. crit. **2**, 47 (1855). — *Bryopogon ochroleucus* (HOFFM.) LINK, H. F. LINK: Grundr. Kräuterk. **3**, 164 (1833). — *Evernia ochroleuca* (HOFFM.) E. M. FRIES, E. M. FRIES: Lichenogr. europ. reform. **22** (1831). — *Usnea ochroleuca* (HOFFM.) HOFFM., G. F. HOFFMANN: Descript. Adumbr. Plant. lich. **2**, 7 (1794)

Westösterreich, Ötztaler Alpen: rasenbildend auf Rohhumusböden in lichtoffenen trockengefönten Windkantenheiden im *Thamnotietum vermicularis* GAMS, 2200 m, N, pH 4,8, Nordostabfall der Talleit Spitze gegen das Rofental oberhalb Vent

leg. et det. G. FOLLMANN (VII/1974)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE
NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 103. **Cetraria cucullata** (BELL.) ACH.
(Parmeliaceae)

E. ACHARIUS: Meth. Lich. 293 (1803). — *Lobaria cucullata* (BELL.) HOFFM., G. F. HOFFMANN: Deutschl. Flora 143 (1796). — *Parmelia cucullata* (BELL.) SPRENG., K. P. J. VON SPRENGEL: Syst. Veget. IV, 1, 281 (1827)

Westösterreich, Ötztaler Alpen: bestandsbildend auf Rohhumusböden lichtoffener, trockenge-
tönter windgefegter Hügelkuppen im *Thamnolietum vermicularis* GAMS, 2200 m, N, pH 4,9,
Nordostabfall der Talleitspitze gegen das Rofental oberhalb Vent

leg. et det. G. FOLLMANN (VII/1974)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE
NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 104. **Cetraria nivalis** (L.) ACH.
(Parmeliaceae)

E. ACHARIUS: Meth. Lich. 294 (1803). — *Lobaria nivalis* (L.) HOFFM., G. F. HOFFMANN: Deutschl. Flora 143 (1796). — *Parmelia nivalis* (L.) SPRENG., K. P. J. VON SPRENGEL: Syst. Veget. IV, 1, 281 (1827)

Westösterreich, Ötztaler Alpen: koloniebildend auf Rohhumusböden lichtoffener, trockenge-
tönter windgefegter Hügelkuppen im *Thamnolietum vermicularis* GAMS, 2200 m, N, pH 4,9,
Nordostabfall der Talleitspitze gegen das Rofental oberhalb Vent

leg. et det. G. FOLLMANN (VII/1974)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE
NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 105. **Cladonia uncialis** (L.) WEB. f. **integerrima** VAIN.
(Cladoniaceae)

E. A. VAINIO: Monogr. Clad. univ. 1, 270 (1887). — *Cladonia uncialis* (L.) NYL. var. *integerrima* (VAIN.) OLIV., H. OLIVIER: Mém. Soc. nat. Sci. nat. Cherbourg 36, 113 (1907)

Mitteldeutschland, Bez. Osthessen: horstbildend auf Rohhumus in gut entwässerten windge-
schützten Klüften zwischen Basaltblöcken im *Cladonion silvaticae* KLEM., 800 m, NW, pH 5,9,
Blockströme im Naturschutzgebiet Schafstein im Naturpark Hochrhön

leg. et det. G. FOLLMANN et I.-A. FOLLMANN-SCHRAG (X/1973)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE
NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 106. **Gorgadesia mira** TAV.

(Roccellaceae)

C. N. TAVARES: Rev. Biol. (Lisboa) 4, 132 (1964)

Kapverdische Inseln, Sao Vicente: bestandsbildend an glatten, schattseitigen, seewindbeeinflussten, meist senkrechten, teils auch überhängenden Andesitwänden im *Roccellion tinctoriae* FOLLM., 450 m, NW, pH 6,8, Südwestflanke des Monte Verde unweit Mindelo

leg. et det. G. FOLLMANN et J.-R. KESTLER-MERLIN (IV/1974)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE
NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 107. **Heterodermia leucomela** (L.) POELT

(Physciaceae)

J. POELT: Nova Hedwigia 9, 31 (1965). — *Anaptychia leucomela* (L.) MASS., A. B. MASSALONGO: Mem. lichenogr. 35 (1853); S. KUROKAWA: J. Hattori bot. Lab. 37, 589 (1973). — *Borreria leucomela* (L.) ACH., E. ACHARIUS: Lichenogr. univ. 499 (1810). — *Physcia leucomela* (L.) MICHX., A. MICHX.: Flora bor.-am. 2, 327 (1803). — *Anaptychia leucomelaena* (H. B. K.) VAIN., E. A. VAINIO: Etud. Lich. Brésil 1, 128 (1890)

Kapverdische Inseln, Sao Vicente: nestbildend über freistehenden Zwergsträuchern und Felsblöcken in der Nebelzone im *Teloschistidion chrysophthalmi* FOLLM., 700–770 m, NW–SW, pH 7,7, Gipfelregion des Monte Verde unweit Mindelo

leg. et det. G. FOLLMANN et J.-R. KESTLER-MERLIN (IV/1974)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE
NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 108. **Heterodermia lutescens** (KUR.) FOLLM.

(Physciaceae)

G. FOLLMANN: Philippia 2, 73 (1974). — *Anaptychia lutescens* KUR., S. KUROKAWA: J. Jap. Bot. 36, 55 (1955)

Westvenezuela, Mérida: gesellig an halbschattigen moosigen Neigungs- und Stirnflächen von Felsblöcken im *Teloschistidion chrysophthalmi* FOLLM., 3000 m, N, pH 7,5, Blockmauer auf der Finta Sta. Bárbara im Motatán-Tal oberhalb Chachopo

leg. B. OBERWINKLER, F. OBERWINKLER et J. POELT (III/1969)
det. J. POELT (X/1969)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE
NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 109. **Lecanora polytropa** (EHRH.) RABENH.
(Lecanoraceae)

G. L. RABENHORST: Deutschl. Kryptogamenfl. 2, 37 (1845). — *Biatora polytropa* (EHRH.) E. M. FRIES, E. M. FRIES: Summ. Veget. scand. 1, 113 (1846). — *Lecidea polytropa* (EHRH.) ACH., E. ACHARIUS: Meth. Lich. 72 (1803). — *Verrucaria polytropa* EHRH., F. EHRHART: Deutschl. Flora 196 (1796)

Mitteldeutschland, Bez. Unterharz: gehäuft an licht- und regenoffenen Neigungs- und Kulmflächen von bodennahem Kupferschieferbruch im *Acarosporetum sinopicae* (HIL.) SCHADE, 200 m, SO, pH 6,2, Abraumhalde bei Wolferode westlich Eisleben

leg. et det. S. HUNECK (IX/1973)
test. J. POELT (XII/1973)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE
NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 110. **Letharia vulpina** (L.) HUE
(Usneaceae)

A. M. HUE: Arch. Mus. IV, 1, 57 (1899). — *Alectoria vulpina* (L.) MUDD: Man. Brit. Lich. 71 (1861). — *Chlorea vulpina* (L.) NYL., W. NYLANDER: Mém. Soc. imp. Sci. nat. Cherbourg 3, 170 (1855). — *Evernia vulpina* (L.) ACH., E. ACHARIUS: Lichenogr. univ. 443 (1810). — *Usnea vulpina* (L.) HOFFM., G. F. HOFFMANN: Deutschl. Flora 138 (1796)

Westösterreich, Ötztaler Alpen: gesellig zwischen Stammgrund und Unterkrone solitärer Nadelbäume im *Letharietum vulpinae* GAMS, 2100 m, NO, pH 5,8, Hangwald am Nordwestabfall der Ramolkögel zwischen Ramolalm und Venter Ache

leg. et det. G. FOLLMANN et T. A. FOLLMANN (VII/1974)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE
NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 111. **Ochrolechia parella** (L.) MASS.
(Pertusariaceae)

A. B. MASSALONGO: Ric. aut. Lich. 32 (1852). — *Lecanora parella* (L.) ACH., E. ACHARIUS: Lichenogr. univ. 370 (1810). — *Rinodina parella* (L.) GRAY, S. F. GRAY: Nat. Arrang. Brit. Plants 1, 453 (1821)

Mitteldeutschland, Bez. Nordhessen: flächendeckend an grobkörnigen, regenoffenen halbschattigen Basaltuffwänden im *Lecideion tumidae* WIRTH, 500 m, NW, pH 7,2, aufgelassene Tuffsteinbrüche in der Nordwestflanke des Dörnbergs im Naturpark Habichtswald unweit Kassel

leg. et det. G. FOLLMANN et B. A. FOLLMANN (VI/1974)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE
NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 112. **Omphalodina melanophthalma** (RAM.) FOLLM. et REDÓN var. **melanophthalma**
(Lecanoraceae)

G. FOLLMANN et J. REDON: Willdenowia **6**, 422 (1972). — *Lecanora melanophthalma* (RAM.) RAM. var. *melanophthalma*, J. POELT: Mitt. bot. Staatssamml. München **19** — **20**: 519 (1958). — *Lecanora rubina* (VILL.) ACH. var. *melanophthalma* (RAM.) ZAHLBR., A. ZAHLBRÜCKNER: Cat. Lich. univ. **5**, 659 (1928). — *Lecanora chrysoleuca* (SMITH) ACH. var. *opaca* ACH., E. ACHARIUS: Lichenogr. univ. **411** (1810)

Nordspanien, Prov. Lérida: gesellig an licht- und windoffenen Kulm- und Neigungsflächen vogelbesuchter Granitblöcke im *Ramalinetum capitatae* FREY, 2400 m, SW, pH 6,3, Südostabfall des Pic Negre in der Sierra de Arcabell (Südostpyrenäen)

leg. et det. G. FOLLMANN (VIII/1974)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE
NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 113. **Omphalodina rubina** (VILL.) CHOISY
(Lecanoraceae)

M. CHOISY: Contr. lichénogr. **2**, 12 (1931). — *Lecanora rubina* (VILL.) ACH., E. ACHARIUS: Lichenogr. univ. **412** (1810). — *Lecanora chrysoleuca* (SMITH) ACH., E. ACHARIUS: **411** (1810). — *Omphalodium rubinum* (VILL.) MINKS, A. MINKS: Mém. Herb. Boissier **21**, 88 (1900). — *Placodium rubinum* (VILL.) MUELL.-ARG., J. MÜLLER-ARGAU: Hedwigia **31**, 153 (1892)

Nordspanien, Prov. Lérida: koloniebildend an licht- und windoffenen Kulm- und Neigungsflächen vogelbesuchter Granitblöcke im *Ramalinetum capitatae* FREY, 2400 m, SW, pH 6,3, Südostabfall des Pic Negre in der Sierra de Arcabell (Südostpyrenäen)

leg. et det. G. FOLLMANN (VIII/1973)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE
NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 114. **Ramalina capitata** (ACH.) NYL.
(Ramalinaceae)

W. NYLANDER: Bull. Soc. Linn. Normandie **II**, **6**, 258 (1972). — *Ramalina strepsilis* (ACH.) ZAHLBR., A. ZAHLBRÜCKNER: Ann. naturhist. Hofmus. Wien **9**, 130 (1894). — *Ramalina tinctoria* (WEB.) ROEHL., J. C. ROHLING: Deutschl. Flora III, **2**, 138 (1813)

Nordspanien, Prov. Lérida: gehäuft an licht- und windoffenen Kulm- und Neigungsflächen vogelbesuchter Granitblöcke im *Ramalinetum capitatae* FREY, 2400 m, SW, pH 6,3, Südostabfall des Pic Negre in der Sierra de Arcabell (Südostpyrenäen)

leg. et det. G. FOLLMANN (VIII/1973)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE
NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 115. **Ramalina requienii** (DE NOT.) JATTA
(Ramalinaceae)

A. JATTA: Syll. Lich. Ital. 64 (1900). — *Ramalina polymorpha* (LILJEBL.) ACH. var. *requienii* DE NOT., G. DE NOTARIS: Giorn. bot. ital. II, 1 (1), 215 (1846)

Südspanien, Prov. Almería: gesellig an licht- und windoffenen Neigungs- und Stirnflächen von Andesitfelsen im *Roccellion tinctoriae* FOLLM., 100 m, NO, pH 6,8, Cerro de las Cuevas bei San José östlich des Cabo de Gata

leg. et det. X. LLIMONA (XII/1970)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE
NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 116. **Roccella vicentina** (VAIN.) VAIN.
(Roccellaceae)

E. A. VAINIO: Kong. dansk. Vid. Selsk. Skr., nat. math. Afd. VIII, 5 (3), 394 (1924). — *Roccella canariensis* DARB., var. *vicentina* VAIN., E. A. VAINIO: Cat. Afr. Plants Welwitsch II, 2, 433 (1901)

Südspanien, Prov. Almería: horstbildend an schattseitigen meeresbeeinflussten Stirn- und Überhangsflächen von Andesitfelsen im *Roccelletum tinctoriae* KLEM., 350 m, N, pH 6,3, Nordabsturz des Fraile in der Sierra de Gata

leg. et det. X. LLIMONA (XII/1972)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE
NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 117. **Teloschistes flavicans** (SWANS.) NORM.
(Teloschistaceae)

J. M. NORMAN: Nyt Mag. Naturvid. 7, 229 (1853). — *Borrera flavicans* (SWANS.) ACH., E. ACHARIUS: Lichenogr. univ. 504 (1810). — *Physcia flavicans* (SWANS.) DE CAND., J. B. A. DE LAMARCK et A. P. DE CANDOLLE: Flore franç. 2, 189 (1805). — *Tornabenia flavicans* (SWANS.) MASS., A. B. MASSALONGO: Mem. lichenogr. 42 (1853)

Kapverdische Inseln, Sao Vicente: koloniebildend über freistehenden Zwergsträuchern und Felsblöcken, seltener auch auf dem Erdboden in der Nebelzone im *Teloschistidion chrysophthalmi* FOLLM., 700–770 m, NW–SW, pH 7,7, Gipfelplateau des Monte Verde unweit Mindelo

leg. et det. G. FOLLMANN et J.-R. KESTLER–MERLIN (IV/1974)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE
NATURALIS CASSELENSI EDITINo. 118. *Toninia toniniana* (MASS.) ZAHLBR.

(Lecideaceae)

A. ZAHLBRUCKNER: Ann. naturhist. Hofmus. Wien 1, 305 (1886). — *Thalloidima toninianum* MASS., A. B. MASSALONGO: Mem. lichenogr. 122 (1853). — *Toninia caesiocandida* (NYL.) T. M. FRIES, T. M. FRIES: Lichenogr. scand. 1, 339 (1874)

Zentralspanien, Prov. Madrid: flächendeckend in schwach geneigten, licht- und windoffenen Trockenrasenlücken auf Gipshügeln im *Fulgensietum fulgentis* GAMS, 550 m, SO–SW, pH 7,5, Cerros Yesíferos de Aranjuez unweit der Laguna de Ontígola

leg. A. CRESPO et E. BARRENO (VI/1973)

det. A. CRESPO (VIII/1973)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE
NATURALIS CASSELENSI EDITINo. 119. *Umbilicaria deusta* (L.) BAUMG.

(Umbilicariaceae)

J. BAUMGARTNER: Flora lipsiensis 571 (1790). — *Umbilicaria flocculosa* (WULF.) HOFFM., G. F. HOFFMANN: Deutschl. Flora 110 (1796). — *Gyrophora flocculosa* (WULF.) KOERB., G. W. KÖRBER: Syst. Lich. Germ. 95 (1855)

Mitteldeutschland, Bez. Ostthessen: bestandsbildend an bodennahen, halbschattigen, langfristig schneebedeckten Neigungs- und Stirnflächen zerstreuter Basaltblöcke im *Umbilicarium deustae* FREY, 800 m, SO–SW, pH 6,5, Eisgrabengebiet unterhalb des Schwarzen Moores im Naturpark Hochrhön

leg. et det. G. FOLLMANN et W. HARTBERG (VI/1974)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE
NATURALIS CASSELENSI EDITINo. 120. *Usnea articulata* (L.) HOFFM. subsp. *mediterranea* MOT.

(Usneaceae)

J. MOTYKA: Lich. Gen. *Usnea* Stud. monogr. 1, 121 (1936)

Kanarische Inseln, La Palma: vorhangbildend im Unterkronenteil von Nadelbäumen in lichten Waldbeständen des Nebelgürtels im *Usneetum atlanticae* KLEM., 1200 m, NO–SO, pH 6,5, Lomo de la Cumbre Vieja oberhalb der Casas Roque Faro

leg. et det. G. FOLLMANN (IV/1972)

Anmerkung

Auch diesmal möchte der Herausgeber wieder allen in den Scheden genannten Sammlern danken, ohne deren Mithilfe der vorliegende Faszikel nicht zustandegekommen wäre.

Zusammenfassung

Faszikel VI der „Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi Editi“, einer Sammlung chorologisch, ökologisch, soziologisch oder taxonomisch interessanter Flechten aus aller Welt, bringt die Scheden zu den Nummern 101–120.

Schrifttum

- FOLLMANN, G., 1968 a: Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Botanico Berolinensi Editi. I. Fasciculus. Willdenowia **4**: 383–390.
- 1968 b: Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Botanico Berolinensi Editi. II. Fasciculus. Willdenowia **4**: 391–397.
 - 1968 c: Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Botanico Berolinensi Editi. III. Fasciculus. Willdenowia **5**: 15–21.
 - 1970: Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Botanico Berolinensi Editi. IV. Fasciculus. Willdenowia **6**: 17–24.
 - 1973: Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi Editi. V. Fasciculus. Philippia **2**: 13–21.

Manuskript bei der Schriftleitung eingegangen am 1. August 1974.

Anschrift des Verfassers:

G. FOLLMANN
Naturkundemuseum im Ottoneum
Steinweg 2
35 Kassel 1
BRD

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Philippia. Abhandlungen und Berichte aus dem Naturkundemuseum im Ottoneum zu Kassel](#)

Jahr/Year: 1973-1975

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Follmann Gerhard

Artikel/Article: [Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi Editi. VI Fasciculus 139-146](#)