

GERHARD FOLLMANN

Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi Editi**X****Fasciculus****Abstract**

The lichen exsiccate „Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi Editi“, a collection of chorologically, ecologically, sociologically, or taxonomically interesting species from all over the world, is continued with the labels for numbers 181 – 200. These include some new records for smaller or larger areas.

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 181. **Acarospora charidema** (CLEM.) LLIM.
(Acarosporaceae)

A. VEZDA: Sched. Lich. exs. sel. ed. Inst. bot. Acad. Sci. czechoslov. **51**, 1267 (1974); G. FOLLMANN et S. HUNECK: Philippica **3**, 10 (1976). — *Lecanora charidema* CLEM., M. COLMEIRO: Enum. Cript. España Portugal **2**, 123 (1867)

Südspanien, Prov. Almería: zerstreut an rauhen, schattseitigen, aber trockengetönten Stirnflächen zerklüfteter Porphyritblöcke im *Acarosporium charidemi* LLIM., 800 m, SO–SW, pH 6,8, Felsflur am Ostabfall der Sierra de Alhamilla zwischen Nijar und Lucainena de las Torres

leg. et det. G. FOLLMANN (I/1975)
test. X. LLIMONA (VIII/1975)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 182. **Acarospora microcarpa** (NYL.) WEDD.
(Acarosporaceae)

H. A. WEDDELL: Bull. Soc. bot. France **21**, 343 (1874); A. H. MAGNUSSON: Monogr. Gen. *Acarospora* **83** (1929). — *Acarospora schleicheri* (ACH.) MASS. var. *microcarpa* (NYL.) OLIV., H. J. F. OLIVIER: Mém. Soc. nat. Sci. nat. Cherbourg **37**, 67 (1909)

Südspanien, Prov. Murcia: zerstreut an licht- und windoffenen Kulm- und Neigungsflächen glatter dunkler Basaltfelsen über anderen Krustenflechten im *Parmelion conspersae* HADAC, 280 m, SO–SW, pH 6,9, Berghänge um Tallante zwischen Cartagena und Mazarrón

leg. et det. X. LLIMONA et J. L. EGEA (X/1975)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE
NATURALIS CASSELENSI EDITINo. 183. *Buellia almeriensis* LLIM.
(Physciaceae)

A. VEZDA: Sched. Lich. exs. sel. ed. Inst. bot. Acad. Sci. czechoslov. **48**, 1199 (1973); X. LLIMONA: Opusc. spars. Dep. Bot. Fac. Sci. Univ. Barcin. **6**, 10 (1974)

Südspanien, Prov. Almería: zerstreut an lichtoffenen, schwach geneigten, harten grubigen Gipskrusten im *Acarosporium placodiiformi-reagentis* LLIM., 350 m, S, pH 6,9, Trockenrasen im Yesar de los Duendes nahe Vera

leg. et det. X. LLIMONA (IX/1975)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE
NATURALIS CASSELENSI EDITINo. 184. *Cornicularia steppae* SAV.
(Parmeliaceae)

V. P. SAVICZ: Not. syst. Inst. crypt. Hort. bot. Reipubl. ross. **3**, 187 (1924); E. DU RIETZ: Ark. Bot. **20** (11): 42 (1926)

Ostspanien, Prov. Teruel: als freilebende Wanderflechte zusammengetrieben in warmgetönten windoffenen Lehmpfannen und Trockenrissen zwischen Kalkschrofen im *Parmelietum vagantis* (KELL.) KLEM., 1050 m, SW, pH 7,7, verarmte Zwergstrauchheide in der Sierra de la Costera unweit Fuentes Calientes

leg. et det. G. FOLLMANN (VII/1975)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE
NATURALIS CASSELENSI EDITINo. 185. *Desmazieria bourgeana* (NYL.) FOLLM.
(Ramalinaceae)

G. FOLLMANN: Philippia **3**, 86 (1976). — *Ramalina bourgeana* NYL., W. NYLANDER: Bull. Soc. Linn. Normandie, Sér. **II**, **4**, 152 (1870). — *Ramalina rosacea* (MASS.) SCHAER., G. HARTUNG: Neue Denkschr. allg. schweiz. Ges. **15**, 147 (1857)

Südspanien, Prov. Almería: truppweise an rauen, licht- und windoffenen Kulmflächen zerklüfteter dunkler Lavablöcke im *Ramalinetum bourgeanae* FOLLM., 200 m, NO-SO, pH 7,1, Küstenberge an der Punta de los Muertos südlich Carboneras am Cabo de Gata

leg. et det. G. FOLLMANN (I/1975)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE
NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 186. **Desmazieria maciformis** (DEL.) FOLLM.
(Ramalinaceae)

G. FOLLMANN: *Philippia* 3, 87 (1976). — *Parmelia maciformis* DEL., D. F. DELISE: *Descript. Egypte* 2, 288 (1813). — *Ramalina maciformis* (DEL.) BORY, J. B. G. M. BORY DE SAINT-VINCENT: *Dict. class. Hist. nat.* 14, 548 (1828); O. L. LANGE: *Flora*, Abt. B, 158, 325 (1969)

Südisrael, Negev-Wüste: gesellig an licht- und windoffenen Hornsteinknollen im *Caloplacetum ehrenbergii* FOLLM., 550 m, NO–NW, pH 6,6, Zwergstrauchvegetation in der Umgebung des Avdat Farm and Desert Research Center of the Hebrew University of Jerusalem

leg. et det. O. L. LANGE (IX/1967)
test. G. FOLLMANN (I/1967)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE
NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 187. **Evernia prunastri** (L.) ACH.
(Usneaceae)

E. ACHARIUS: *Lichenogr. univ.* 442 (1810). — *Lobaria prunastri* (L.) HOFFM., G. F. HOFFMANN: *Deutschl. Flora* 140 (1796). — *Ramalina prunastri* (L.) CHEV., F. F. CHEVALIER: *Flore gén. Envir. Paris* 1, 607 (1826)

Kanarische Inseln, Gran Canaria: bestandsbildend an rauher, halbschattiger Laubbaumborke vom Mittelstamm- bis zum Unterkronenteil im *Pseudevernietum furfuraceae* (HIL.) OCHSN., 1000–1100 m, SO–SW, pH 6,5, Kastanienpflanzungen und Alleebäume im Nebelgürtel zwischen Lanzarote und Cueva Corcho

leg. et det. G. FOLLMANN (IX/1968)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE
NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 188. **Gyalecta cupularis** (HEDW.) SCHAER.
(Gyalectaceae)

L. E. SCHAERER: *Lich. Helv. Spic.* 2, 79 (1826). — *Gyalecta jenensis* (BATSCH) ZAHLBR., A. ZAHLBRÜCKNER: *Cat. Lich. univ.* 2, 720 (1924). — *Lecidea cupularis* (HEDW.) ACH., E. ACHARIUS: *Meth. Lich.* 56 (1803). — *Verrucaria cupularis* (HEDW.) HOFFM., G. F. HOFFMANN: *Deutschl. Flora* 176 (1796)

Mitteldeutschland, Bez. Nordhessen: zerstreut an senkrechten, halbschattigen feuchtgetönten Bruchflächen von Wellenkalk im *Gyalectetum cupularis* (KLEM.) FOLLM., 250 m, NW–SW, pH 8,5, Taleinschnitt im Kiefernwald unter der Hasenkanzel nordwestlich Werleshausen im Werrabergland

leg. et det. G. FOLLMANN (V/1976)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE
NATURALIS CASSELENSI EDITINo. 189. *Hypogymnia atrofusca* (SCHAER.) RAES.
(Parmeliaceae)

V. J. RÄSÄNEN: Ann. bot. Soc. zool.-bot. fenn. Vanamo 18 (1), 13 (1943); H. KROG: Lichenologist 6, 138 (1974). — *Hypogymnia intestiniiformis* (VILL.) RAES. var. *atrofusca* (SCHAER.) POELT, J. POELT: Mitt. bot. Staatssamml. München 4, 403 (1962). — *Parmelia atrofusca* (SCHAER.) CROMB., J. M. CROMBIE: Grevillea 7, 99 (1879). — *Parmelia intestiniiformis* (VILL.) ACH. var. *atrofusca* (SCHAER.) HASSELR., T. E. HASSELROT: Acta phytogeogr. suec. 33, 86 (1953)

Mittelösterreich, Hohe Tauern: flächendeckend an glatten, windoffenen, aber länger schneebedeckten Kulm- und Neigungsflächen von Gneisblöcken im *Parmelietum omphalodis* FREY, 2100 m, NW–SW, pH 6,2, Hochläger an der Höhenburg zwischen Mooserboden und Wasserfallboden

leg. et det. G. FOLLMANN (IX/1973)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE
NATURALIS CASSELENSI EDITINo. 190. *Hypogymnia imshaugii* KROG.
(Parmeliaceae)

H. KROG: Norsk Polarinst. Skr. 144, 96 (1968); K. E. OHLSON: Bryologist 76, 374 (1973)

Westliche Vereinigte Staaten von Nordamerika, Staat Washington: gesellig an Schuppenborke im halbschattigen Mittelstamm- und Unterkronenteil von Nadelbäumen im *Pseudevernia furfuracea* BARKM., 800 m, SO–SW, pH 6,3, Hochwald am Storm King Mountain Trail in den Olympic Mountains im Clallam County

leg. et det. G. FOLLMANN (IX/1969)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE
NATURALIS CASSELENSI EDITINo. 191. *Hypogymnia intestiniiformis* (VILL.) RAES.
(Parmeliaceae)

V. RÄSÄNEN: Ann. bot. Soc. zool.-bot. fenn. Vanamo 18 (1), 13 (1943); H. KROG: Lichenologist 6, 139 (1974). — *Hypogymnia encausta* (J. E. SMITH) WATS., W. WATSON: Trans. Proc. bot. Soc. Edinburgh 32, 504 (1939). — *Parmelia encausta* (J. E. SMITH) ACH., E. ACHARIUS: Meth. Lich. 202 (1803). — *Parmelia intestiniiformis* (VILL.) ACH., E. ACHARIUS: Meth. Lich. 253 (1803)

Westösterreich, Stubai Alpen: großflächig an glatten, windoffenen, aber länger schneebedeckten Granitblöcken im *Parmelietum omphalodis* FREY, 1900 m, NO–NW, pH 6,4, Hochläger im Melachtal unweit der Längentaler Sennhütte unter dem Lissenser Fernerkogel

leg. et det. G. FOLLMANN (IX/1975)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE
NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 192. **Lasallia brigantium** (ZSCHACKE) LLANO var. **hispanica** (FREY) LLANO
(Umbilicariaceae)

G. A. LLANO: Hvalrad Skr. 48, 122 (1965). — *Umbilicaria brigantium* ZSCHACKE var. *hispanica* FREY, E. FREY: Ber. schweiz. bot. Ges. 59, 443 (1949)

Mittelspanien, Prov. Guadalajara: koloniebildend an licht- und windoffenen Stirnflächen von Gneisblöcken zwischen Hartlaubgehölzen im *Lasallietum pustulatae* (HIL.) WIRTH, 1200–1300 m, SO–SW, pH 6,5, Westhänge des Valle de Pelagallinas an den Ausläufern der Sierra del Robledal

leg. et det. A. CRESPO et E. BARRENO (III/1976)
test. G. FOLLMANN (VII/1976)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE
NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 193. **Parmelia rutidota** J. D. HOOK. et TAYL.
(Parmeliaceae)

J. D. HOOKER et T. TAYLOR: London J. Bot. 3, 645 (1844). — *Parmelia ochroleuca* MUELL.-ARG., J. MÜLLER-ARGAU: Flora 65, 306 (1882)

Mittelchile, Prov. Valparaíso: gesellig an rauen halbschattigen Borkenpartien des Mittelstamm- und Unterkronenteils alter Südbuchen im *Parmelietum rutidotae* FOLLM., 1500 m, SO–SW, pH 6,6, Hangwald am Südostabfall des Cerro Roble bei Los Andes

leg. G. FOLLMANN et M. MAHU (IX/1964)
det. G. FOLLMANN (VII/1976)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE
NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 194. **Parmelia soledians** NYL.
(Parmeliaceae)

W. NYLANDER: Bull. Soc. Linn. Normandie, Sér. II, 6, 259 (1872). — *Parmelia conspersa* ACH. var. *soledians* (NYL.) BOIST., A. B. M. BOISTEL: Nouv. Flore Lich. 2, 64 (1903)

Nordspanien, Prov. Gerona: kleinflächig an glatten halbschattigen Borkenpartien des Mittelstamm- und Unterkronenteils solitärer Laubbäume im *Xanthorion parietinae* OCHSN., 50 m, NO–SO, pH 7,1, Olivenhaine nördlich Rosas auf der Halbinsel Cadaqués

leg. et det. X. LLIMONO et V. WIRTH (VIII/1972)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE
NATURALIS CASSELENSI EDITINo. 195. **Physcia stellaris** (L.) NYL. f. **rosulata** (ACH.) NYL.
(Physciaceae)W. NYLANDER: Not. Sällsk. Fauna Flora fenn. Forh. 5, 111 (1861). — *Physcia stellaris* (L.) NYL. var. *rosulata* (ACH.) HUE, A. M. HUE: Nouv. Arch. Mus., Sér. III, 2, 319 (1890)Mittlere Vereinigte Staaten von Nordamerika, Staat Iowa: flächendeckend an rauen halbschattigen Borkenpartien des Mittelstammes solitärer Laubbäume im *Physcietum ascendens* FREY et OCHSN., 800 m, NO–NW, pH 6,7, Auwald in der Jungmoränenlandschaft am Iowa River unweit Coralville nördlich Iowa City

leg. et det. G. FOLLMANN (IX/1969)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE
NATURALIS CASSELENSI EDITINo. 196. **Physconia venusta** (ACH.) POELT
(Physciaceae)J. POELT: Nova Hedwigia 12, 130 (1966). — *Physcia pulverulenta* (SCHREB.) HAMPE var. *venusta* (ACH.) NYL., W. NYLANDER: Acta Soc. Linn. Bordeaux 21, 308 (1856). — *Physcia venusta* (ACH.) NYL., W. NYLANDER: Synops. Lich. 1, 421 (1860)Zentralspanien, Prov. Madrid: vereinzelt auf halbschattigen vorspringenden Borkenrücken zerklüfteter Eichenstämme im *Parmelietum acetabuli* OCHSN., 1600 m, SO, pH 6,5, Schluchtwälder bei Montejo de la Sierra in den südlichen Ausläufern der Montes Carpetanos

leg. et det. G. FOLLMANN, A. CRESPO et E. BARRENO (XI/1974)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE
NATURALIS CASSELENSI EDITINo. 197. **Psora lurida** (DILL.) DE CAND.
(Lecideaceae)J. B. A. DE LAMARCK et A. P. DE CANOLLE: Flore franç. 2, 370 (1805). — *Biatora lurida* (DILL.) E. M. FRIES, E. M. FRIES: Sched. crit. 5–6, 9 (1825). — *Lecidea lurida* (DILL.) ACH., E. ACHARIUS: Meth. lich. 77 (1803). — *Psora squamata* (DICKS.) HOFFM., G. F. HOFFMANN: Deutschl. Flora 161 (1796)Mitteldeutschland, Bez. Nordhessen: großflächig an Bruchflächen und auf Schuttbändern wind- und lichtoffener Wellenkalkfelsen im *Toninietum candidae* KAIS., 300 m, W, pH 8,1, Kalkterrassen am Westabfall der Ebenhöhe nordwestlich Werleshausen im Werrabergland

leg. et det. G. FOLLMANN (V/1976)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE
NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 198. **Usnea ceratina** ACH.
(Usneaceae)

E. ACHARIUS: Lichenogr. univ. 619 (1810); J. MOTYKA: Lich. Gen. *Usnea* Stud. monogr. 1, 365 (1937). — *Usnea barbata* (L.) WIGG. var. *ceratina* (ACH.) SCHAEER., L. E. SCHAEERER: Enum. crit. Lich. eur. 3 (1850). — *Usnea plicata* A. L. SMITH, A. L. SMITH: Handb. Brit. Lich. 42 (1921)

Süddeutschland, Südbaden: zerstreut an halbschattigem Astwerk im Unterkronenteil alter Laubbäume im *Usneion florido-ceratinae* BARKM., 1100 m, NW–SW, pH 6,4, Buchenwald südlich des Schauinsland im Schwarzwald

leg. et det. G. FOLLMANN (VII/1957)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE
NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 199. **Usnea rubiginea** (MICHX.) MASS.
(Usneaceae)

A. B. MASSALONGO: Mem. I. R. Ist. Veneto 10, 45 (1861). — *Usnea ceratina* ACH. f. *rubiginea* (MICHX.) KREMPELH., A. VON KREMPELHUBER: Vid. Medd. naturhist. For. Kjobenhavn 5, 4 (1874). — *Usnea rubicunda* STIRT., J. STIRTON: Scott. Natur. 6, 102 (1881); J. MOTYKA: Lich. Gen. *Usnea* Stud. monogr. 1, 339 (1937)

Nordspanien, Prov. Pontevedra: tuffbildend an halbschattigen grobscholligen Borkenpartien im Mittelstamm- und Unterkronenteil alter Nadelbäume im *Usneetum rubigineae* (BARKM.) FOLLM., 1050 m, NW, pH 6,5, Hangwälder südlich des Río Lerez unweit Cercedo

leg. et det. G. FOLLMANN (VII/1975)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE
NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 200. **Teloschistes villosus** (ACH.) NORM.
(Teloschistaceae)

J. M. NORMAN: Nyt. Mag. Naturvid. 7, 229 (1853). — *Anaptycha villosa* (ACH.) BOIST., A. B. M. BOISTEL: Nouv. Flore Lich. 2, 49 (1903). — *Borreria villosa* (ACH.) ACH., E. ACHARIUS: Lichenogr. univ. 501 (1810). — *Tornabenia villosa* (ACH.) MASS., A. B. MASSALONGO: Mem. lichenogr. 41 (1853)

Kanarische Inseln, Gran Canaria: gesellig an geschützten Rippenpartien im Dornenwerk des Mittelstammes alter Säuleneuphorbien im *Teloschistetum flavicantis* FOLLM., 200 m, NW, pH 6,8, Sukkulentensteppe an der Punta de Gondara nördlich San Nicolás

leg. ed det. G. FOLLMANN (IX/1968)

Anmerkung

Auch diesmal gilt der Dank des Herausgebers wieder allen in den Scheden genannten Kollegen, Mitarbeitern und Sammlern, ohne deren uneigennützigte Hilfe der vorliegende Faszikel nicht zustandegekommen wäre.

Zusammenfassung

Faszikel X der „Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi Editi“, einer Sammlung chorologisch, ökologisch, soziologisch oder taxonomisch interessanter Flechten aus aller Welt, bringt die Scheden zu den Nummern 181–200. Unter dem Sammelgut befinden sich einige Neufunde für kleinere oder größere Gebiete.

Schrifttum

- FOLLMANN, G., 1968 a: Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Botanico Berolinensi Editi. I. Fasciculus. Willdenowia **4**: 383–390.
- 1968 b: Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Botanico Berolinensi Editi. II. Fasciculus. Willdenowia **4**: 391–397.
 - 1968 c: Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Botanico Berolinensi Editi. III. Fasciculus. Willdenowia **5**: 15–21.
 - 1970: Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Botanico Berolinensi Editi. IV. Fasciculus. Willdenowia **6**: 17–24.
 - 1973: Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi Editi. V. Fasciculus. Philippia **2**: 13–21.
 - 1974: Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi Editi. VI. Fasciculus. Philippia **2**: 139–146.
 - 1975 a: Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi Editi. VII. Fasciculus. Philippia **2**: 213–220.
 - 1975 b: Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi Editi. VIII. Fasciculus. Philippia **2**: 286–294.
 - 1976: Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi Editi. IX. Fasciculus. Philippia **3**: 30–37.

Manuskript bei der Schriftleitung eingegangen am 1. August 1976.

Anschrift des Verfassers:

Prof. Dr. G. FOLLMANN
Naturkundemuseum im Ottoneum
Steinweg 2
3500 Kassel 1
BRD

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Philippia. Abhandlungen und Berichte aus dem Naturkundemuseum im Ottoneum zu Kassel](#)

Jahr/Year: 1976-1978

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Follmann Gerhard

Artikel/Article: [Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historia Naturalis Casselensi Editi. X Fasciculus 90-97](#)