

GERHARD FOLLMANN

Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti ab Instituto Botanico Universitatis Coloniensis Editi**XX****Fasciculus****Abstract**

The lichen exsiccata „Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi Editi“ (1973–1982), a collection of biologically, chorologically, ecologically, sociologically, or taxonomically interesting species from all over the world, is continued under the title „Lichenes Exsiccati Selecti ab Instituto Botanico Universitatis Coloniensis Editi“. The present fascicle contains the labels for numbers 381–400. As usual, the samples include new records for smaller or larger floral regions. In addition, a new combination is proposed: *Heterodermia comosa* (ESCHW.) FOLLM. et FERR. (bas. *Parmelia comosa* ESCHW., syn. *Anaptychia comosa* [ESCHW.] MASS.; Physciaceae). Appended are an addressee's index and a bibliographic synopsis.

Das vorliegende Exsikkatenwerk vereint biologisch, chorologisch, ökologisch, soziologisch oder systematisch interessante Flechtenarten aus allen Florenreichen. Es soll zur besseren Kenntnis dieser variablen Pflanzengruppe und ihrer spezifischen Verbreitungsmuster beitragen. Da sich Flechtenflora und Flechtenvegetation infolge tiefgreifender Umweltveränderungen in weltweitem Rückgang befinden, erfüllt es gleichzeitig die Aufgabe einer aktuellen Floraendokumentation. Im Gegensatz zu vergleichbaren Flechtersammlungen wird besonderes Gewicht auf eine hinreichende ökologische und soziologische Charakterisierung der ausgegebenen Lichenentaxa gelegt, wenngleich dies – vor allem bei außereuropäischem Sammelgut – noch immer auf beachtliche Schwierigkeiten stößt. Auch die teilweise verwinkelte Synonymik wird stärker als gemeinhin üblich berücksichtigt, vermittelt sie doch oft genug aufschlußreiche Einblicke in die Forschungsgeschichte. Jeder Faszikel umfaßt 20 Nummern, die auf dem Tauschwege an Kryptogamenherbarien und Einzelforscher gehen. (Eine Bezieherliste ist beigelegt.) Von selteneren Sippen abgesehen, beträgt die Auflage jeweils 50 Exemplare aus einheitlichen Populationen.

Faszikel I–IV (1968–1970) wurde am Botanischen Museum Berlin (B: „Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Botanico Berolinensi Editi“) zusammengestellt, Faszikel V–XIX (1973–1982) am Naturkundemuseum Kassel (KASSEL: „Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi Editi“). Anhangsweise findet sich eine Übersicht der Publikationsdaten der Einzelteile. Bedingt durch den erneuten Wechsel des Arbeitsplatzes des Herausgebers wird die Reihe jetzt unter der Bezeichnung „Lichenes Exsiccati Selecti ab Instituto Botanico Universitatis Coloniensis Editi“ am Botanischen Institut der Universität Köln (KOELN) fortgeführt. Da jedoch nur der Verlagsort wechselte, nicht aber der Bearbeiter und die bei den vorausgegangenen Faszikeln beachteten Kriterien – besonders auch im Hinblick auf den Artenschutz – wird die ursprüngliche Form und Numerierung beibehalten. Angebote, Bestellungen und Mitteilungen sind nunmehr an Prof. Dr. G. FOLLMANN, Botanisches Institut, Universität Köln, Gyrhofstraße 15, 5000 Köln 41, BRD, zu richten.

GERHARD FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI AB INSTITUTO
BOTANICO UNIVERSITATIS COLONIENSIS EDITI

No. 381. ***Anthracotheicum goniostomum*** MUELL.-ARG.
(Pyrenulaceae)

J. MÜLLER-ARGAU: Flora **66**, 246 (1883). — *Anthracotheicum depressum* MUELL.-ARGAU., J. MÜLLER-ARGAU: Flora **66**, 245 (1883)

Nordargentinien, Prov. Corrientes: zerstreut an verhältnismäßig glatten Borkenpartien des halbschattigen unteren Zweigwerks niederer, teilweise abgestorbener Laubbäume und -sträucher im *Ochrolechietum austroamericanae* FOLLM., 300 m, NW-SW, pH 6,5, Mantelgesellschaft des degradierten Regenwaldes am Paso Crucecita im Departamento Concepción

leg. L. FERRARO et M. M. ARBOT (VI/1974)
det. L. FERRARO (II/1976)

GERHARD FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI AB INSTITUTO
BOTANICO UNIVERSITATIS COLONIENSIS EDITI

No. 382. ***Bryoria capillaris* (ACH.) BRODO et HAWKSW.**
(Usneaceae)

I. M. BRODO et D. L. HAWKSWORTH: Op. bot. **42**, 115 (1977). — *Alectoria cana* (ACH.) LEIGHT., W. A. LEIGHTON: Lich. Flora Great Brit. 88 (1871). — *Alectoria capillaris* (ACH.) CROMB. — J. M. M. CROMBIE: J. Bot. **9**, 177 (1871). — *Alectoria implexa* (HOFFM.) NYL. var. *capillaris* (ACH.) STIZENB., E. STIZENBERGER: Ann. naturhist. Hofmus. Wien **7**, 131 (1892). — *Alectoria jubata* (L.) ACH. var. *capillaris* (ACH.) ACH., E. ACHARIUS: Lichenogr. univ. 593 (1810)

Südfrankreich, Dép. Roussillon: vorhangartig gehäuft im unteren, teils abgestorbenen halbschattigen Zweigwerk älterer Überhälter von *Abies alba* MILL. im *Evernietum divaricatae* FREY, 1900 m, NO-NW, pH 6,3, nebeloffener geschlossener Nadelwald am Nordhang des Mont Canigou südwestlich Velmanya

leg. G. FOLLMANN et B. A. FOLLMANN (VII/1982)
det. G. FOLLMANN (XII/1982)

GERHARD FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI AB INSTITUTO
BOTANICO UNIVERSITATIS COLONIENSIS EDITI

No. 383. ***Cetraria iberica* CRESPO et BARR.**
(Parmeliaceae)

A. CRESPO et E. BARRENO: An. Jard. bot. Madrid **37**, 205 (1980). — *Cetraria californica* MERR. fide KAERN., G. K. MERRILL: Bryologist **13**, 28 (1910). — *Cetraria merrillii* DU RIETZ fide KAERN., G. E. DU RIETZ: Ark. Bot. **A**, 20 (11), 42 (1926)

Mittelspanien, Prov. Madrid: zerstreut im licht- und windoffenen Zweigwerk teils überalterter Trichtersträucher von *Cistus ladanifer* L. im *Parmeliopsisidetum ambiguum* HIL., 890 m, N-W, pH 6,4, ausgedehnte trockengetönte Zistrosenbestände der Hangformation von El Berrueco in der Sierra de Guadarrama

leg. et det. A. CRESPO (VII/1981)

GERHARD FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI AB INSTITUTO
BOTANICO UNIVERSITATIS COLONIENSIS EDITI

No. 384. ***Coenogonium linkii*** EHRENB.
(*Gylectaceae*)

C. G. NEES VON ESENBECK: Horae phys. Berol. 120 (1820). — *Coenogonium andinum* KARST., W. NY-LANDER: Bot. Z. 20, 178 (1862). — *Coenogonium controversum* PERS., C. GAUDICHAUD: Voy. Uranie, Bot. 214 (1826)

Nordargentinien, Prov. Misiones: in mehr oder minder anliegenden Kleinfilzen, teilweise über Laubmoosen, an halbschattigen luftfeuchten Borkenpartien der Mittelstämme und Unteräste von Laubbäumen im *Coenogonietum linkii* FOLLM., 250 m, NO-SO, pH 6,5, degraderter Regenwald unweit Casa de Quiroga im Departamento San Ignacio

leg. et det. L. FERRARO (XII/1981)
praep. G. FOLLMANN (I/1983)

GERHARD FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI AB INSTITUTO
BOTANICO UNIVERSITATIS COLONIENSIS EDITI

No. 385. ***Heterodermia comosa*** (ESCHW.) FOLLM. et FERR.
(*Physciaceae*)

G. FOLLMANN: Philippia 5, 118 (1983). — *Anaptychia burnetii* DODGE, C. W. DODGE: Nova Hedwiga 38, 206 (1971). — *Anaptychia comosa* (ESCHW.) MASS., A. B. MASSALONGO: Mem. lichenogr. 39 (1853). — *Parmelia echinata* TAYL., W. J. HOOKER, London J. Bot. 6, 166 (1847). — *Physcia comosa* (ESCHW.) NYL., W. NY-LANDER: Mém. Soc. imp. Sci. nat. Cherbourg 3, 175 (1855)

Nordargentinien, Prov. Corrientes: nestartig an halbschattigen, verhältnismäßig glatten Borkenpartien des unteren, teilweise abgestorbenen Zweigwerks verschiedener Laubbäume im *Parmelietum perlatae* FOLLM., 120 m, NO-SO, pH 6,7, Galeriewald am Río Paraná unweit San Cosme

leg. A. KRAPOVICKAS (VI/1973)
det. L. FERRARO (III/1974)

GERHARD FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI AB INSTITUTO
BOTANICO UNIVERSITATIS COLONIENSIS EDITI

No. 386. ***Himantormia lugubris*** (HUE) MACK.-LAMB
(*Usneaceae*)

I. MACKENZIE-LAMB: Sci. Rep. Brit. Antarct. Surv. 38, 18 (1964); C. W. DODGE: Lich. Flora Antarct. Cont. 221 (1973). — *Ramalina lugubris* HUE, A.-M. HUE: Lich. Expéd. antarct. franç. 2, 34 (1915)

Westantarktis, Südshetlandinseln: teppichartig an verhältnismäßig glatten Kulm- und Stirnflächen licht- und windoffener Andesitfelsen im *Usneetum fasciatae* FOLLM., 360 m, S, pH 6,8, Südbabbruch des Nunatak El Torre zwischen den Glaciares El Torre und Ventoso an der Bahía Almirantazgo auf der Isla Rey Jorge

leg. et det. R. OCHYRA (I/1980)
test. G. FOLLMANN (X/1982)

GERHARD FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI AB INSTITUTO
BOTANICO UNIVERSITATIS COLONIENSIS EDITI

No. 387. **Lecanora albescens** (HOFFM.) FLOERKE
(Lecanoraceae)

J. VON FLOTOW: Flora 11, 633 (1828). — *Lecanora anomala* (ACH.) ACH., E. ACHARIUS: Lichenogr. univ. 381 (1810). — *Lecanora galactina* (ACH.) ACH., E. ACHARIUS: Lichenogr. univ. 424 (1810). — *Lecanora sommerfeltiana* FLOERKE, S. C. SOMMERFELDT: Suppl. Flora lapp. 84 (1826). — *Placodium albescens* (HOFFM.) DE CAND., J. B. A. DE LAMARCK et A. P. DE CANDOLLE: Flore franç. 2, 380 (1805)

Mitteldeutschland, Bez. Nordhessen: kleinfächig an licht- und windoffenen, aber teilweise regengeschützten Stirn- und Überhangflächen stark ausgearbeiteter Dolomitfelsen im *Caloplacetum saxicolae* DU RIETZ, 300 m, SO-SW, pH 7,5, naturnaher Trockenrasen auf dem Höhenzug in der Werraschleife von Albungen südlich Hitzerode

leg. et det. G. FOLLMANN und B. A. FOLLMANN (IV/1977)

GERHARD FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI AB INSTITUTO
BOTANICO UNIVERSITATIS COLONIENSIS EDITI

No. 388. **Lecanora conizaeoides** NYL.
(Lecanoraceae)

J. M. CROMBIE: J. Bot. 23, 195 (1885). — *Lecanora conizaea* (ACH.) NYL. var. *conizaeoides* (NYL.) A. L. SMITH: Handb. Brit. Lich. 54 (1921). — *Lecanora pityrea* ERICHS., C. F. E. ERICHSEN: Verh. bot. Ver. Prov. Brandenburg 72, 125 (1929)

Ostdänemark, Seeland: flächendeckend auf angerottetem Nadelholz einer halbschattigen Balkonverkleidung eines verlassenen Strandhauses im *Lecanoretum conizaeoidis* BARKM., 10 m, NO-SO, pH 6,3, Mosedestrand bei Greve

leg. et det. M. SKYTTE-CHRISTIANSEN (I/1981)
praep. G. FOLLMANN (X/1982)

GERHARD FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI AB INSTITUTO
BOTANICO UNIVERSITATIS COLONIENSIS EDITI

No. 389. **Lecidea russula** ACH.
(Lecideaceae)

E. ACHARIUS: Meth. Lich. 61 (1803). — *Biatora russula* (ACH.) MONT., J. F. C. MONTAGNE: Ann. Sci. nat., Bot., Sér. II, 16, 121 (1841). — *Callopisma sanguinolentum* KREMPELH., A. VON KREMPELHUBER: Verh. zool.-bot. Ges. Wien 26, 449 (1876). — *Lecidea coccinea* SCHWEIN., A. HALSEY: Ann. Lyc. nat. Hist. New York 1, 1 (1824). — *Lecidea rubrica* ZENK, K. C. T. GOEBEL et G. KUNZE: Pharm. Waarenk. 1, 151 (1829)

Nordargentinien, Prov. Corrientes: zerstreut an kleinscholligen Borkenpartien des halbschattigen, teilweise abgestorbenen unteren Zweigwerks verschiedener Laubbäume im *Ochrolechitum austroamericanae* FOLLM., 100 m, NO-SO, pH 6,5, naturnaher Feuchtwald bei Riachuela am Río Paraná unweit Corrientes

leg. et det. L. FERRARO (X/1980)
praep. FOLLMANN (I/1983)

GERHARD FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI AB INSTITUTO
BOTANICO UNIVERSITATIS COLONIENSIS EDITI

No. 390. **Leptogium puberulum** HUE
(Collemataceae)

A.-M. HUE: Lich. Expéd. antarct. franç. 2, 15 (1915); C. W. DODGE: Lich. Flora Antarct. Cont. 31 (1973)

Westantarktis, Südshetlandinseln: nestartig über ausgedehnten, mehr oder minder waagrechten, kurzrasigen feuchten Moospolstern an Geröllflanken in einer *Deschampsia-Polytrichum*-Gesellschaft, 40 m, NO, pH 6,1, Cresta Pinguino an der Bahia Almirantazgo südlich der Estación Arctowski auf der Isla Rey Jorge

leg. et det. R. OCHYRA (II/1980)
test. G. FOLLMANN (IX/1982)

GERHARD FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI AB INSTITUTO
BOTANICO UNIVERSITATIS COLONIENSIS EDITI

No. 391. **Leptoraphis epidermidis** (ACH.) T. M. FRIES
(Pleosporaceae)

T. M. FRIES: Nova Acta reg. Soc. Sci. Upsal., Ser. III, 3, 373 (1861). — *Arthopyrenia oxyspora* (NYL.) MUDD, W. A. MUDD: Man. Brit. Lich. 306 (1861). — *Pyrenula oxyspora* (NYL.) HEPP, P. HEPP: Flecht. Eur. 46 (1857). — *Verrucaria epidermidis* ACH., E. ACHARIUS: Meth. Lich. 118 (1803). — *Verrucaria oxyspora* NYL., W. NYLANDER: Bot. Not. 1852, 179 (1852)

Südnorwegen, Prov. Oppland: zerstreut an glattrindigen lichtoffenen Mittelstämmen und Unterästen von *Betula pubescens* EHRH. im *Melanietum olivaceae* (BARKM.) FOLLM., 600–700 m, SW, pH 6,2, lockere Moorbirkengruppen in der Bruchlandschaft unweit Fjellheim

leg. et det. M. SKYTTE-CHRISTIANSEN (IX/1982)
praep. G. FOLLMANN (I/1983)

GERHARD FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI AB INSTITUTO
BOTANICO UNIVERSITATIS COLONIENSIS EDITI

No. 392. **Lobaria amplissima** (SCOP.) FORSS.
(Stictaceae)

K. B. J. FORSELL: Bih. kung. svensk. Vetensk.-Akad. Handl. VIII, 3 (3), 111 (1883). — *Lobaria glomulifera* (LIGHTF.) HOFFM., G. F. HOFFMANN: Deutschl. Flora 148 (1796). — *Lobaria laciniata* (HUDS.) VAIN., A. E. VAINIO: Termész. Füzet. 22, 307 (1899). — *Sticta amplissima* (SCOP.) RABENH., G. L. RABENHORST: Deutschl. Kryptogamenfl. 2, 64 (1845). — *Sticta glomulifera* (LIGHTF.) DEL., D. F. DÉLISE: Hist. Lich. *Sticta* 129 (1822)

Nordspanien, Prov. Oviedo: flächendeckend über halbschattigen feuchtespeichernden Moosfilzen an grobborkigen Mittelstämmen und Stammbasen älterer Laubbäume, vorwiegend *Fagus sylvatica* L., im *Lobarietum pulmonariae* FREY, 1200 m, NW–SW, pH 6,0, wechselfeuchter Hangwald in der Reserva de Somiedo am Osthang des Cordal de la Mesa

leg. et det. G. FOLLMANN et I.-A. FOLLMANN-SCHRAG (IX/1980)

GERHARD FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI AB INSTITUTO
BOTANICO UNIVERSITATIS COLONIENSIS EDITI

No. 393. **Lobaria laetevirens** (LIGHTF.) ZAHLBR.
(Stictaceae)

A. ZAHLBRUCKNER: Nat. Pflanzenfam. I, 1, 188 (1906). — *Lobaria herbacea* (HUDS.) DE CAND., J. B. A. DE Lamarck et A. P. DE CANDOLLE: Flore franç. 2, 403 (1805). — *Pulmonaria herbacea* (HUDS.) HOFFM., G. F. HOFFMANN: Descript. Adumbr. Plant. Lich 1, 51 (1790). — *Ricasolia laetevirens* (LIGHTF.) LEIGHT., W. A. LEIGHTON: Lich. Flora Great Brit. 121 (1871). — *Sticta laetevirens* (LIGHTF.) RABENH., G. L. RABEN-HORST: Deutschl. Kryptogamenfl. 2, 64 (1845)

Nordspanien, Prov. Oviedo: schindelartig über halbschattigen feuchtespeichernden Moosfilzen an rauhborkigen Mittelstämmen und Stammbasen älterer Laubbäume, vorwiegend *Fagus sylvatica* L., im *Lobarietum pulmonariae* FREY, 1200 m, NW-SW, pH 6,2, wechselfeuchter Hangwald in der Reserva de Somiedo am Osthang des Cordal de la Mesa

leg. et det. G. FOLLMANN et I.-A. FOLLMANN-SCHRAG (IX/1980)

GERHARD FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI AB INSTITUTO
BOTANICO UNIVERSITATIS COLONIENSIS EDITI

No. 394. **Maronea constans** (NYL.) HEPP
(Acarosporaceae)

P. HEPP: Flecht. Eur. 771 (1860). — *Acarospora constans* (NYL.) OLIV., H. OLIVIER: Mém. Soc. nat. Sci. nai. Cherbourg 37, 74 (1909). — *Lecanora constans* NYL., W. NYLANDER: Mém. Soc. imp. Sci. nat. Cherbourg 3, 199 (1855). — *Maronea kemmerli* KOERB., G. W. KÖRBER: Parerg. lich. 91 (1859). — *Rinodina constans* (NYL.) TUCK., E. TUCKERMAN: Synops. North. Am. Lich. 1, 210 (1882)

Nordwestspanien, Prov. La Coruña: zerstreut am glattborkigen Mittelstamm und im Zweigwerk der Unterkrone von *Alnus glutinosa* (L.) GAERTN. im *Pyrenuletum nitidae* HIL., 400 m, NW-SW, pH 6,3, lichter Auwald am Río Miño unweit Orense

leg. et det. E. BARRENO, A. G. BUENO, A. CRESPO, N. J. RICO et L. G. SANCHO (XII/1981)

GERHARD FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI AB INSTITUTO
BOTANICO UNIVERSITATIS COLONIENSIS EDITI

No. 395. **Pertusaria culbersonii** VÉZDA — Topotypus
(Pertusariaceae)

A. VEZDA: Lich. sel. exs. 60, 1487 (1977)

Costa Rica, Prov. San José: bestandsbildend über lockeren Bodenpartikeln und angerotteten Pflanzenresten in lichtoffenen windgeschützten Vegetationsnischen zwischen niederen Paramosträuchern im *Pertusarietum culbersonii* FOLLM., 3300 m, ohne ausgeprägte Exposition-abhängigkeit, pH 6,3, Asunción am Cerro de la Muerte in den westlichen Ausläufern der Cordillera de Talamanca

leg. et det. G. FOLLMANN (XII/1978)
test. A. VEZDA (IX/1982)

GERHARD FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI AB INSTITUTO
BOTANICO UNIVERSITATIS COLONIENSIS EDITI

No. 396. **Ramalina pollinaria** (WESTR.) ACH.

[ad *Ramalinam humilem* sensu ROEHLING respondens]

(Ramalinaceae)

E. ACHARIUS: Lichenogr. univ. 608 (1810). — *Ramalina tennica* RAES., V. RÄSANEN: Flecht. Estland 27 (1931). — *Ramalina humilis* (ACH.) ROEHL., J. C. ROEHLING: Deutschl. Flora III 2, 140 (1813). — *Ramalina pollinaria* (WESTR.) ACH. var. *humilis* ACH., E. ACHARIUS: Lichenogr. univ. 609 (1810). — *Ramalina polymorpha* (ACH.) ACH. var. *pollinaria* (WESTR.) MASS., A. B. MASSALONGO: Mem. lichenogr. 66 (1853)

Westdeutschland, Bez. Daun: lockerrasig an halbschattigen, verhältnismäßig windgeschützten Stirnflächen grobkörniger Tuffstufen im *Lecanoretum orostheae* HIL., 590 m, SO-SW, pH 6,5, Südabfall des Schwirzheimer Kopfes zwischen Prüm und Gerolstein in der Hohen Eifel

leg. et det. G. FOLLMANN (XII/1982)

GERHARD FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI AB INSTITUTO
BOTANICO UNIVERSITATIS COLONIENSIS EDITI

No. 397. **Ramalina polymorpha** (ACH.) ACH.

[ad *Ramalinam digitellatam* sensu NYLANDER respondens]

(Ramalinaceae)

E. ACHARIUS: Lichenogr. univ. 600 (1810); H. KROG et P. W. JAMES: Norw. J. Bot. 24, 36 (1977). — *Ramalina capitata* (ACH.) NYL., J. M. M. CRUMBIE: Grevillea 7, 141 (1879). — *Ramalina digitellata* NYL., W. NYLANDER: Flora 63, 10 (1880). — *Ramalina meyeri* STEIN, B. STEIN: Jahresber. schles. Ges. vaterl. Cult. 66, 135 (1888). — *Ramalina protecta* MAGN., A. H. MAGNUSSON: Bot. Not. 109: 150 (1956)

Ostspanien, Prov. Teruel: koloniebildend an halbschattigen luftfeuchten Überhängen feinkörniger, aus dem Hochwald ragender Sandsteinklippen im *Lecideetum lucidae* SCHADE, 1600 m, NW, pH 6,1, Sierra de Javalón in den Montes Universales unweit Jabaloya

leg. et. det. G. FOLLMANN et B. A. FOLLMANN (VII/1982)

test. H. KROG (IX/1982)

GERHARD FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI AB INSTITUTO
BOTANICO UNIVERSITATIS COLONIENSIS EDITI

No. 398. **Ramalina terebrata** HOOK. et TAYL.

(Ramalinaceae)

J. D. HOOKER et T. TAYLOR: Lond. J. Bot. 3, 654 (1844); C. W. DODGE: Lich. Flora Antarct. Cont. 240 (1973). — *Evernia de-gasperi* CENG.-SAMBO, M. CENGIA-SAMBO: Lich. Terra Fuoco 40 (1926). — *Ramalina laevigata* E. M. FRIES var. *terebrata* (HOOK. et TAYL.) MUELL.-ARG., J. MÜLLER-ARGAU: Nuov. Giorn. bot. ital. 21, 37 (1889)

Westantarktis, Südshetlandinseln: gesellig an stark geneigten, teilweise überhängenden grobkörnigen Tuffwänden unter Pinguinkolonien im *Ramalinetum terebratae* FOLLM., 50–70 m, SW, pH 7,1, Nordflanke des Einbruchs zum Kratersee (Bahía Foster) unweit der Caleta Balleños auf der Isla Deception

leg. G. FOLLMANN et P. WEISSER (II/1963)

det. G. FOLLMANN (VII/1982)

GERHARD FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI AB INSTITUTO
BOTANICO UNIVERSITATIS COLONIENSIS EDITI

No. 399. **Usnea antarctica** DU RIETZ
(Usneaceae)

G. E. DU RIETZ: Svensk bot. Tidskr. **20**, 93 (1926). — *Neuropogon antarcticus* (DU RIETZ) MACK.-LAMB, I. MACKENZIE-LAMB: J. Linn. Soc., Bot. **52**, 210 (1939). — *Usnea crombii* DOGE, C. W. DODGE: Rep. B. A. N. Z. Antarct. Exped., Ser. **B**, 7, 212 (1948). — *Usnea granulifera* (VAIN.) MOT., J. MOTYKA: Lich. Gen. *Usnea* Stud. monogr., Pars. syst. **1**, 35 (1936). — *Usnea subpapillata* DODGE, C. W. DODGE: Rep. B. A. N. Z. Antarct. Exped., Ser. **B**, 7, 204 (1948)

Ostantarktis, Victoria Land: mattenbildend an verhältnismäßig geschützten, mehr oder minder geneigten Stirnflächen größerer glatter Granitblöcke im *Usneetum antarcticae* FOLLM., Meereshöhe, N, pH 6,3, Felstrift des Birthday Ridge an der Yule Bay im nördlichen Victoria Land

leg. et det. L. KAPPEN (XII/1981)
test. G. FOLLMANN (I/1983)

GERHARD FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI AB INSTITUTO
BOTANICO UNIVERSITATIS COLONIENSIS EDITI

No. 400. **Usnea hirta** (L.) WIGG.
(Usneaceae)

F. H. WIGGERS: Primit. Flor. Holsatiae 91 (1780); J. MOTYKA: Lich. Gen. *Usnea* Stud. monogr., Pars syst. **1**, 83 (1936). — *Usnea barbata* (L.) WIGG. var. *hirta* (L.) E. M. FRIES, E. M. FRIES: Lichenogr. eur. ref. 18 (1831). — *Usnea florida* (L.) WIGG. var. *hirta* (L.) ACH., E. ACHARIUS: Meth. Lich. 309 (1803). — *Usnea plicata* (L.) WIGG. var. *hirta* (L.) ACH., E. ACHARIUS: Lichenogr. univ. 623 (1810)

Mittelspanien, Prov. Madrid: aspektbestimmend an halbschattigen grobborkigen Oberstämmen und im Zweigwerk der Unterkronen von *Pinus sylvestris* L. im *Pseudevernetum furfuraceae* (HIL.) OCHSN., 1300 m, NW-SW, pH 6,4, lichte Kiefernwälder am Südhang der Maliciosa in der Sierra de Guadarrama oberhalb Mataelpino

leg. et det. G. FOLLMANN et B. A. FOLLMANN (VII/1982)

Appendix Nomenclatorica

Heterodermia comosa (ESCHW.) FOLLM. et FERR.

Bas. *Parmelia comosa* ESCHW. apud MART. in Icon. Plant. crypt. **2**, 25 (1828)

Syn. *Anaptychia comosa* (ESCHW.) MASS. in Mem. lichenogr. 39 (1853)

Exs. Lich. exs. sel. Inst. Bot. Univ. Colon. ed. 385 (KOELN)

Prop. G. FOLLMANN et L. FERRARO (1983)

Acceptorum Enumeratio Fasciculorum I-XX

1. LSU Louisiana State University
 Department of Botany
 Louisiana State Herbarium
Baton Rouge
 Louisiana 70 803
VEREINIGTE STAATEN VON NORDAMERIKA
2. B Botanisches Museum
 Kryptogamenabteilung
 Königin-Luise-Straße 6-8
 1000 **Berlin** 33
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
3. BRA Slowakisches Nationalmuseum (O¹)
 Botanische Abteilung
 Vajanského Nábr. 2
 88 535 **Bratislava**
TSCHECHOSLOWAKEI
4. BRNO Academia Scientiarum Bohemoslovacae
 Institutum Botanicum
 Tábor 28 a
 60 200 **Brno**
TSCHECHOSLOWAKEI
5. COLO University of Colorado
 University Museum
 Botanical Department
Boulder
 Colorado 80 302
VEREINIGTE STAATEN VON NORDAMERIKA
6. FH Harvard University
 Farlow Herbarium of Cryptogamic Botany
 20 Divinity Avenue
Cambridge
 Massachusetts 02 138
VEREINIGTE STAATEN VON NORDAMERIKA
7. CTES Universidad Nacional del Nordeste
 Departamento de Botánica y Ecología
 Sargentó Cabral 2139
Corrientes
ARGENTINIEN

¹ Tauschverkehr unterbrochen, daher unvollständig

8. DUIS Gesamthochschule Duisburg
 Fachbereich Botanik
 Lotharstraße 65
 4100 **Duisburg**
 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
9. DUKE Duke University
 Department of Botany
Durham
 North Carolina 27 706
 VEREINIGTE STAATEN VON NORDAMERIKA
10. GZU Universität Graz
 Institut für Systematische Botanik
 Holteigasse 6
 8010 **Graz**
 ÖSTERREICH
11. H University of Helsinki
 Botanical Museum
 Unioninkatu 44
 00 170 **Helsinki** 17
 FINNLAND
12. IRVE University of California (O)
 School of Biological Sciences
 Department of Ecology and Evolutionary Biology
Irvine
 California 92 717
 VEREINIGTE STAATEN VON NORDAMERIKA
13. KASSEL Naturkundemuseum im Ottoneum
 Phytowissenschaftliche Abteilung
 Steinweg 2
 3500 **Kassel** 1
 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
14. KOELN Universität Köln
 Botanisches Institut
 Gyrhofstraße 15
 5000 **Köln** 41
 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
15. KUO Kuopio Museum
 Department of Natural History
 Kauppakatu 23
 70 100 **Kuopio** 10
 FINNLAND

16. L Rijksherbarium (O)
Department of Cryptogams
Schelpenkade 6
Leiden
HOLLAND
17. Herbarium Piperianum (O)
H. PIPER
Charlottenburger Straße 11
5090 **Leverkusen**
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
18. LG Université de Liège
Service de Botanique Systématique
Sart Tilman
4000 **Liège**
BELGIEN
19. BM British Museum
Department of Botany
Cromwell Road
London SW 7 5 BD
ENGLAND
20. STU Staatliches Museum für Naturkunde
Botanische Abteilung
Arsenalplatz 3
7140 **Ludwigsburg**
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
21. LD University of Lund
Botanical Museum
Ö. Vallgatan 18
22 361 **Lund**
SCHWEDEN
22. MAF Universidad Complutense
Facultad de Farmacia
Departamento de Botánica
Ciudad Universitaria
Madrid 3
SPANIEN
23. MB Universität Marburg (O)
Botanisches Institut
Lahnberge
3550 **Marburg**
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

24. MARSP Université de Marseille
 Faculté de Pharmacie
 Laboratoire de Botanique
 Boulevard Jean Moulin
13 385 Marseille
FRANKREICH
25. MIL Milwaukee Public Museum
 Botany Department
 800 West Wells Street
Milwaukee
 Wisconsin 53 233
VEREINIGTE STAATEN VON NORDAMERIKA
26. MVM Museo Nacional de Historia Natural
 Departamento de Botánica
 Casilla de Correo 399
Montevideo
URUGUAY
27. M Botanische Staatssammlung
 Kryptogamenabteilung
 Menzinger Straße 67
8000 München 19
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
28. MURCIA Universidad de Murcia
 Facultad de Ciencias Naturales
 Departamento de Botánica
Murcia
SPANIEN
29. Herbarium Kalbianum
 K. KALB
 Adalbert-Stifter-Straße 5 b
8430 Neumarkt
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
30. NY New York Botanical Garden
 Cryptogamic Herbarium
 Bronx Park
New York 10 458
VEREINIGTE STAATEN VON NORDAMERIKA
31. NICH Hattori Botanical Laboratory (O)
 3888 Hon-machi
Nichinan
 Miyazaki Prefecture 889-25
JAPAN

32. O University of Oslo
Botanical Museum
Trondheimsveien 23 b
Oslo 5
NORWEGEN
33. CANL National Museum of Natural Sciences
Botany Division
Ottawa 4
Ontario K1A OM8
KANADA
34. Herbarium Grueningerianum
W. GRÜNINGER
Friedrich-Ebert-Straße 46
7410 Reutlingen
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
35. MIN University of Minnesota
Department of Botany
University Herbarium
Saint Paul
Minnesota 55 101
VEREINIGTE STAATEN VON NORDAMERIKA
36. TFMC Museo Insular de Ciencias Naturales
Departamento de Botánica
Apartado 853
Santa Cruz
Tenerife
KANARISCHE INSELN
37. Herbarium Mahuanum (O)
M. MAHU
Casilla de Correo 653
Santiago de Chile
CHILE
38. Herbarium Schummianum
F. SCHUMM
Schreiberstraße 36
7000 Stuttgart 1
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

39. TNS National Science Museum
Division of Cryptogams
Hyakunin-cho 3-23-1
Shinjuku-ku
Tokyo 160
JAPAN
40. TUR University of Turku
Department of Botany
20 500 **Turku** 50
FINNLAND
41. UPS University of Uppsala
Institute of Systematic Botany
Post Office Box 541
75 121 **Uppsala** 1
SCHWEDEN
42. ASU Arizona State University
Department of Botany and Microbiology
Tempe
Arizona 85 281
VEREINIGTE STAATEN VON NORDAMERIKA
43. Herbarium Thøgersenianum
P.-J. THØGERSEN
Heimstad
2324 **Vang** H
NORWEGEN
44. US Smithsonian Institution (O)
United States National Herbarium
Department of Botany
Washington D. C. 20 560
VEREINIGTE STAATEN VON NORDAMERIKA
45. W Naturhistorisches Museum
Botanische Abteilung
Burgring 7
1014 **Wien**
ÖSTERREICH

Anmerkung

Wie stets gilt der Dank des Herausgebers allen in den Scheden genannten Kollegen, Mitarbeitern und Sammlern, diesmal ganz besonders Frau Prof. Dr. A. CRESPO (Madrid) und Frau Prof. Dr. L. FERRARO (Corrientes) sowie Herrn Dr. R. OCHYRA (Krakau) und Herrn Dr. M. SKYTTE-CHRISTIANSEN (Kopenhagen), ohne deren uneigennützige Hilfestellung auch der vorliegende Faszikel nicht zustandegekommen wäre. Dank gebührt auch der Philippi-Gesellschaft zur Förderung der Naturwissenschaften (Kassel) für die Erlaubnis zum Druck der Kompilation im vorliegenden *Philippia*-Heft.

Zusammenfassung

Das Exsikkatenwerk „*Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi Editi*“, eine Sammlung von biologisch, chorologisch, ökologisch, soziologisch oder systematisch interessanten Flechten aus aller Welt, wird unter der Bezeichnung „*Lichenes Exsiccati Selecti ab Instituto Botanico Universitatis Coloniensis Editi*“ fortgesetzt. Der vorliegende Faszikel XX enthält die Scheden zu den Nummern 381–400. Wie gewohnt stellen einige Proben Neufunde für kleinere oder größere Florengebiete dar. Außerdem wird eine Neukombination vorgeschlagen: *Heterodermia comosa* (ESCHW.) FOLLM. et FERR. (bas. *Parmelia comosa* ESCHW., syn. *Anaptychia comosa* [ESCHW.] MASS.; Physciaceae). Anhangsweise finden sich eine Bezieherliste sowie eine Faszikelübersicht.

Synopsis

- FOLLMANN, G., 1968 a: *Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Botanico Berolinensi Editi*. I. Fasciculus. Willdenowia **4**: 383–390.
— 1968 b: *Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Botanico Berolinensi Editi*. II. Fasciculus. Willdenowia **4**: 391–397.
— 1968 c: *Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Botanico Berolinensi Editi*. III. Fasciculus. Willdenowia **5**: 15–21.
— 1970: *Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Botanico Berolinensi Editi*. IV. Fasciculus. Willdenowia **6**: 17–24.
— 1973: *Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi Editi*. V. Fasciculus. Philippia **2**: 13–21.
— 1974: *Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi Editi*. VI. Fasciculus. Philippia **2**: 139–146.
— 1975 a: *Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi Editi*. VII. Fasciculus. Philippia **2**: 123–220.
— 1975 b: *Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi Editi*. VIII. Fasciculus. Philippia **2**: 286–294.
— 1976 a: *Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi Editi*. IX. Fasciculus. Philippia **3**: 30–37.
— 1976 b: *Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi Editi*. X. Fasciculus. Philippia **3**: 90–97.
— 1977 a: *Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi Editi*. XI. Fasciculus. Philippia **3**: 189–198.
— 1977 b: *Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi Editi*. XII. Fasciculus. Philippia **3**: 288–295.

- 1978: *Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi* Editi. XIII. *Fasciculus. Philippia* 3: 379–388.
- 1979 a: *Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi* Editi. XIV. *Fasciculus. Philippia* 4: 38–46.
- 1979 b: *Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi* Editi. XV. *Fasciculus. Philippia* 4: 128–136.
- 1980: *Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi* Editi. XVI. *Fasciculus. Philippia* 4: 204–212.
- 1981 a: *Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi* Editi. XVII. *Fasciculus. Philippia* 4: 314–322.
- 1981 b: *Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi* Editi. XVIII. *Fasciculus. Philippia* 4: 379–387.
- 1982: *Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi* Editi. XIX. *Fasciculus. Philippia* 5: 40–48.

Manuskript bei der Schriftleitung eingegangen am 15. Januar 1983.

A n s c h r i f t d e s V e r f a s s e r s :

Prof. Dr. G. FOLLMANN
Botanisches Institut
Universität Köln
Gyrhofstraße 15
5000 Köln 41
BRD

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Philippia. Abhandlungen und Berichte aus dem Naturkundemuseum im Ottoneum zu Kassel](#)

Jahr/Year: 1982-1987

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Follmann Gerhard

Artikel/Article: [Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti ab Instituto Botanico Universitatis Coloniensis Editi. XX. Fasciculus 111-126](#)