

Hundert Jahre Pilzkunde in Nordwestoberfranken 1843 - 1945

Heinz Engel
Wiesenstraße 10
D-8621 Weidhausen b.Coburg

Z u s a m m e n f a s s u n g:

Ein Überblick über die 'Mykologische Arbeit' in früheren Jahren wird gegeben.

Die hervorragenden pilzkundlichen Tätigkeiten von
Dr. F r i e d r i c h S t a u d e,
A u g u s t S o l l m a n n und
Dr. A l f r e d A d e
werden dabei besonders berücksichtigt, und über Ihr Schaffen wird berichtet.

Die aus der Literatur ersichtlichen Pilzfunde werden aufgelistet. Über 100 Pilzarten, die von Mitarbeitern der 'PKA Weidhausen b.Coburg' in jüngerer Zeit (nach 1945) nicht oder noch nicht gefunden wurden, werden besonders zusammengefaßt.

Einleitung:

Bei der Durchsicht und dem Studium älterer Literatur begegnen uns drei Namen von hervorragenden Pilzkennern, die im nordwestoberfränkischen Raum, besonders den Kreisen Coburg und Lichtenfels, stark engagiert waren. Es sind dies die bereits oben erwähnten Herren S t a u d e und S o l l m a n n aus Coburg und A d e aus Weismain, Krs. Lichtenfels. Vereinzelt tauchen auch andere Namen auf:

B r ü c k n e r
K i e ß l i n g
L a n g f e l d e r
R o h f e l d e r
S t e i n a u
Z a n g u.a..

Die Arbeiten umfassen den Zeitraum vom 3. Oktober 1843, als F. S t a u d e, Cathatelasma imperiale (FR.) SING. (= Agaricus biarmillatus ss. STAUDE), am Beerhügel des Coburger Festungsberges entdeckte, bis ca. 1920, mit Funden des Kaiserlings Amanita caesarea SCOP., in den Kreisen Coburg und Kronach, auf die A. A d e hinwies. Viele der zitierten Funde dürften aber bereits vor 1843 zu datieren sein, doch fehlen hier die genauen Angaben.

In der Zeit zwischen 1920 bis 1945 scheint sich in der Pilzkunde bei uns wenig getan zu haben, jedenfalls ist mir zur Zeit darüber nichts bekannt.

Meine Recherchen erheben keinesfalls einen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere Fundangaben können sich in mir bis dato unbekannter Literatur verbergen, und so mancher frühere Fund könnte in größeren Herbarien belegt sein, wie das Beispiel Sarcoscypha coccinea (FR.) LAMBOTTE in diesem Jahr (1985) gezeigt hat (siehe Seite 32).

Sollten sich in dieser Hinsicht weitere Erkenntnisse ergeben, werde ich in einem Nachtrag darüber berichten.

Dr. Friedrich Staude:

Sein mykologisches Wirken dürfte ca. in die erste Hälfte bis Mitte des 19. Jahrhunderts zu datieren sein. Er verstarb 1861.

Er verfaßte nicht nur die Gattungsbeschreibungen von Collybia (FR.) STAUDE 1857, siehe ZfM. 1981 (1): 6 und Clitocybe, sondern setzte einen mykologischen Markstein mit seinem Pilzbuch



besonders für das 'Coburger Land'.

In diesem Pilzbuch zu lesen ist eine besondere Freude!
Nachfolgend das Wichtigste in einer Zusammenfassung.
Zunächst bringt er auf 17 Seiten eine Einleitung, wobei folgende Themen behandelt werden:

- + Anatomischer Bau der Pilze.
- + Chemische Bestandtheile der Schwämme.
- + Symptome der Schwammvergiftung und deren Behandlung.
- + Das Sammeln der Schwämme für die Küche.
- + Die Zubereitung der Schwämme für die Küche
(mit 13 Rezepten).

Auf weiteren zehn Seiten folgt:

+ Die systematische Uebersicht der Pilze,
um dann auf 140 Seiten detaillierte Beschreibungen von 465 Pilz-
arten zu bringen. Den Schluß des schönen Bändchens bilden 52 co-
lorierte Abbildungen.

Es ist anzunehmen, daß die allermeisten Pilzarten auch von ihm
besonders im Kreis Coburg gefunden worden sind. Alle Arten ohne
Funddaten werden auf den Seiten 26 - 34 genannt. Eine Auflistung
mit Fundortbezeichnungen siehe die Seiten 35 - 39 dieses Beitrages.
Eine Liste von Pilzfunden wird zusammen mit denen anderer Autoren
(S o l l m a n n, A d e) auf den Seiten 47 - 50 gebracht. Es handelt sich
dabei um Arten, die in jüngerer Zeit (nach 1945), bei uns nicht regi-
striert wurden, sowie um einige Arten die augenblicklich nicht deut-
bar sind. Hier einige Details aus seinem Buch:

I. Ordnung Coniomyces (Staubpilze).

Hier werden u.a. einige Brand- und Rostpilze ohne Fundortan-
gaben genannt: *Ustilago sitophila*, *U. segetum*, *Fusidium sulphureum*,
Aecidium euphorbiae, *A. grossulariae*, *A. berberidis*, *Roestelia cancel-
lata*, *Peridermium pini*, *Puccinia graminis*, *Phragmidium incrassatum*,
Torula cerevisiae, *T. herbarum*, *Exosporium tiliae*, *E. rubi*, *Coryneum
umbonatum*, *Podisoma fuscum*, *Gymnosporangium juniperi*; ferner einige
'Fungi imperfecti' wie *Fusarium latericium*, *Tubercularia vulgaris*,
Isaria eleutheratorum und *I. agaricina*.

II. Ordnung Hyphomycetes (Fadenpilze).

Sporotrichum densum, *Bactridium flavum*, *Botrytis vulgare*, *Peni-
cillium glaucum*, *Aspergillus glaucus*, *Coremium vulgare*, *Helmintho-
sporium velutinum*, *Cladosporium herbarum*, *Stilbum luteum*, *Pilobolus
crystallinus*, *Ascophora mucedo*, *A. elegans*, *Mucor mucedo*, *M. carnis*.

III. Ordnung Pyrenomycetes (Kernpilze).

Vornean gestellt wird das 'Mutterkorn' *Claviceps purpurea*,
wahrscheinlich wegen seiner schwarzen Sklerotien. Anm.: 'Diese
Art gehört aber zur Ordnung Clavicipitales, gleichfalls, die
zum Schluß genannte Puppen-Kernkeule *Cordyceps militaris*.' Da-
zwischen findet man Namen einiger Mehltaupilze, wie *Alphitomor-
phas communis*, *A. adunca*, *A. penicellata*; einige *Sphaeria*-Arten wie
S. maculaeformis, *S. bombardia*, *S. dryina*, *S. peziza*, *S. berberidis*, *S. fusca*
und die Holzkeulen *Hypoxylon vulgare* (Co) und *H. digitatum*.

IV. Ordnung Gasteromycetes (Balgpilze).

Hier sind sowohl Myxomyceten (Schleimpilze), Ascomyceten
(Schlauchpilze) und Gasteromyceten (Bauchpilze) zusammengefaßt.
Folgende Myxomyceten werden genannt: *Aethalium septicum* (= *Fuligo
septica*) (Co), *Lycogala plumbeum* (= *L. epidendrum*) (Ww) und ohne
Fundortangaben *Reticularia umbrina*, *Trichia fallax*, *Stemonitis
fusca*, *St. typhoides*, *Cribraria vulgaris*, *Dictydium umbilicatum*, *Eu-
rotium herbariorum*, *Physarum aureum*, *P. nutans*, *Leocarpus vernicosus*,
Craterium pedunculatum s. *vulgare*, *Trichoderme viride*, *Lycogala
epidendrum*. An Bovisten und Stäublingen werden genannt: *Lycoperdon
bovista* (= *Langermannia gigantea*) (Co), *Geaster hygrometricus*
(= *Astraeus hygrometricus*) (Ah), ohne Fundortangaben, aber für die
hiesige Gegend mit Häufigkeitsangaben bedacht: *Bovista nigrescens*,
B. plumbea, *Lycoperdon pyriforme*, *L. gemmatum* (= *perlatus*), *L. exipuli-
forme*, *L. perlatus*, *L. echinatum*, *L. pusillum* (= *Bovista pussila*),
L. caelatum und *Geaster fornicatus* s. *quadrifidus* (= *Geastrum* q.)
Sphaerobolus stellatus, *Cyathus crucibulum*, *olla*, *striatus*, *Hartboviste*.

Stictis radiata	Strahliger Tropfenpilz =	
Bulgaria inquinans	Beschmutzende Bulgaria =	
Ascobolus glaber	Glatte Schlauchwerfer =	
- papillatus	Warziger Schlauchw.	Lasiobolus equinus
- furfuraceus	Kleiger Schlauchw.	=
Peziza vulgaris	Gemeiner Becherschw.	Pezizella vulgaris
- scutellata	Schildf. -	Scutellinia scutellata 1)
- livida	Graugelber Becherschw.	Humaria livida
- hemisphaerica	Halbkugeliger B.	- hemisphaerica
- coccinea	Scharlachrother B.	Sarcoscypha coccinea 2)
- humosa	Erd-Becherschwamm	Octospora humosa
- leucoloma	Weißbrandiger Bechers.	- leucoloma
- macropus	Großstieliger-	Macropodia macropus
- cochleata	Schneckenförmiger B.	Otidea cochleata
- alutacea	Lederfarbiger B.	- alutacea
- aurantia	Orange-Becherschw.	Aleuria aurantia

<i>Peziza leporina</i>	Hasenohr-Becherschw.	<i>Otidea leporina</i>
- <i>onotica</i>	Eselsohr--	- <i>onotica</i>
<i>Vibrissea truncorum</i>	Stamm-Zitterpilz	=
<i>Geoglossum glabrum</i>	Glatte Erdzunge	<i>Geoglossum ophioglossoides</i>
- <i>hirsutum</i>	Rauhe Erdzunge	<i>Trichoglossum hirsutum</i>
- <i>viride</i>	Grüne -	<i>Microglossum viride</i>
<i>Helvella crispa</i>	Herbstlorchel	=
<i>Morchella conica</i>	Kegelförmige Morchel	=
- <i>patula</i>	Offene Morchel	<i>Gyromitra gigas</i>
- <i>mitra s.</i>		
<i>rimosipes</i>	Käppchenmorchel	<i>Mitrophora semilibera</i>

b) Basidientragende Keulenschwämme

<i>Pistillaria pusilla</i>	Kleiner Stempelpilz	=
- <i>muscicola</i>	Moosbewohnender St.	<i>Eocronartium muscicolum</i>
<i>Typhula gyrans</i>	Gedrehter Kolbenträger	=
<i>Calocera cornea</i>	Hornartiger Hornträger	=
- <i>viscosa</i>	Klebriger Hornträger	=
<i>Clavaria stricta</i>	Steifer Keulenschw.	<i>Ramaria stricta</i>
- <i>abietina</i>	Tannen-Keulenschw.	- <i>abietina</i>
- <i>aurea</i>	Goldgelber Keulenschw.	- <i>aurea</i> 3)
- <i>rugosa</i>	Runzeliger -	<i>Clavulina rugosa</i>
- <i>cristata</i>	Kammförmiger Keulenschw.	- <i>cristata</i>
- <i>amethystina</i>	Amethyst-Keulenschw.	- <i>amethystina</i>
<i>Sparassis brevipes</i>	Kurzstieliger Ziegenb.=	4)

D. Hutschwämme

"Schwämme von sehr verschiedener Gestalt und Substanz, welche das gemeinsame Merkmal haben, daß sie das Fruchtlager an der Unterseite eines hutförmigen Fruchträgers tragen; nur scheinbar wird bei dem sogenannten umgeschlagenen Hut das Fruchtlager oberhalb getragen. Das Fruchtlager selbst ist warzig, stachelig, röhrig oder blätterig und die Sporen stehen meist zu 4 oder 6 auf Basidien, zwischen welchen sich noch sogenannte Pollinarien befinden."

<i>Thelephora quercina</i>	Eichen-Warzenpilz	<i>Peniophora quercina</i>
- <i>pini</i>	Fichten-Warzenpilz	? - <i>pini</i>
- <i>hirsuta</i>	Rauhhaariger Warzenp.	<i>Stereum hirsutum</i>
- <i>sanguinolenta</i>	Blutrünstiger Warz.	<i>Stereum sanguinolentum</i>
- <i>purpurea</i>	Purpurfarbiger Warz.	<i>Chondrostereum purpureum</i>
- <i>laciniata</i>	Zerschlitzzter Warz.	<i>Thelephora terrestris</i> (syn.)
- <i>terrestris</i>	Erd-Warzenpilz	=
- <i>palmata</i>	Handförmiger Warz.	=
- <i>caryophyllaeae</i>	Nelkenfarbiger W.	<i>Thelephora caryophyllaea</i>
<i>Radulum orbiculare</i>	Kreisrunder Raspelpilz/Hyphoderma radula	
<i>Irpex fusco-violaceus</i>	Braunvioletter Eggen-schwamm	<i>Trichaptum fusco-violaceum</i> 5)
<i>Sistotrema confluens</i>	Zusammemfließender Schaufelpilz	=
<i>Hydnum pinastri</i>	Tannen-Stachelpilz	? <i>Leucogyrophana pinastri</i>
- <i>erinaceum</i>	Igel-Stachelbart	<i>Hericium erinaceum</i> 6)
- <i>coralloides</i>	Korallen-Stachelsch.	- <i>coralloides</i> 7)
- <i>adustum</i>	Verbrannter Stachels.	? <i>Bjerkandera adusta</i>
- <i>melaleucum</i>	Schwarzweißer St.	<i>Phellodon melaleucus</i>
- <i>repandum</i>	Ausgeschweiffter St.	=
- <i>rufescens</i>	Bräunlich-rother St.	=
- <i>imbricatum</i>	Ziegeldachförmiger St.	<i>Sarcodon imbricatus</i>
- <i>foetidum</i>	Stinkender Stachels.	- <i>laevigatum</i>

Merulius lacrymans	Hausschwamm	Serpula lacrimans
- tremellosus	Gallertartiger Ader- schwamm	=
Trametes suaveolens	Wohlrriechende Tram.	= 8)
Polyporus Medulla panis/	Brod-Löcherpilz(?)	Sammelart(u.a. Antrodia sp.)
- vulgaris	Gemeiner -	(?) - dünne, res. Porlinge
- abietinus	Tannen-Löcherpilz	Trichaptum abietinum
- versicolor	Bunter--	Trametes versicolor
- zonatus	Gegürtelter Löcherp.	- multicolor
- hirsutus	Rauhhaariger Löcherp.	- hirsuta
- velutinus	Sammthaariger L.	- - evtl. auch pubescens
- cinnabarimes/	Zinnoberrother L.	Pycnoporus cinnabarinus
- populinus	Pappel-Löcherpilz	Oxyporus populinus
- marginatus	Fichtenpilz	Fomitopsis pinicola
- pinicola	-	- (syn.)
- cinnamomeus/	Zimtbrauner L.	Phellinus conchatus
- conchatus	Muschelförmiger L.	Phellinus conchatus
- ribis	Johannisbeer-L.	- ribis
- fulvus	Gelbbrauner Löcherp.	Inonotus rheades + nodulosus
- igniarius	Unächter Feuerschw.	Phellinus igniarius
- officinalis/	Lärchenschwamm	Laricifomes officinalis
- hispidus	Steifhaariger L.	Inonotus hispidus
- fumosus	Strauchfarbener L.	Bjerkandera fumosa
- adustus	Verbrannter L.	- adusta
- nidulans	Nistender Löcherp.	Hapalopilus nidulans
- destructor	Zerstörender Hauss.	?
- stipticus	Zusammenziehender L.	Tyromyces stipticus
- lobatus	Gelappter Löcherp.(?)	Laetiporus sulphureus
- giganteus	Riesen-Löcherpilz	Meripilus giganteus
- cristatus	Kammförmiger Löcherp.	Albatrellus cristatus
- confluens	Semmelpilz	Albatrellus confluens
- frondosus	Belaubter Löcherpilz	Grifola frondosa
- umbellatus	Haselschwamm, Eichhase/	Dendropolyporus umbellatus
- varius	Verschiedener L.	Polyporus varius
- perennis	Ausdauernder L.	Coltricia perennis
Boletus cyanescens	Blauwerdender Röhrenp./	Gyroporus cyanescens
- felleus	Gallen-Röhrenpilz	Tylopilus felleus
- radicans	Wurzelnder Röhrenp.	=
- spadiceus	Kastanienbrauner R.	Xerocomus spadiceus
- bovinus	Kuhpilz	Suillus bovinus
- granulatus	Gekörnter Röhrenp.	- granulatus
Shizophyllum commune	Gemeiner Spaltblät- terschwamm	Schizophyllum commune
Lenzites sepiaria	Zaun-Lenzblätterschw.	Gloeophyllum sepiarium
Crepidotus mollis	Weicher Halbstiefel- Blätterschwamm	=
Pleuropus salignus	Weidenblätterschwamm	Pleurotus salignus
Cantharellus auranti-	Pomeranzengelber- pflifferling	Hygrophoropsis aurantiaca
acus		
" 'Giftiger oder falscher Eierschwamm'. (Cantharellus alect- crolophoides SCHAEFF.) Hut fleischig, weich, bis 2 1/2" breit, feinfilzig, in der Mitte niedergedrückt, am Rand eingerollt und geschweift, pomeranzenfarbig; Falten steif, niedrig, gedrängt, wieder- holt-gabel-theilig, dunkel-pomeranzenfarbig; Strunk rund, oft ge- krümmt, nach unten verdünnt, bis 2" hoch, voll, feinfilzig, pomeran- zenfarbig, am Grunde später schwärzlich. Der Schwamm hat einen mehl- artigen, etwas scharfen Geruch, und ist schädlich, deshalb er mit dem gemeinen Pflifferling nicht verwechselt werden darf, von dem er sich durch den feinen Filz auf der Oberfläche des Huts, welches sich wie feines Waschleder anfühlt, unterscheidet. Wächst gesellig in Nadel- wäldern, auf Hutweiden u.s.w., viel seltner als der eßbare Pflifferl. "		

Cantharellus cibarius/ Gelber Pfiffer =

U.a.: "Dieser heerdenweise in Gruppen oder Kreisen im Sommer und Herbste in allen unsern Nadelwäldern häufig wachsende, auch nicht selten in Birkenwäldern vorkommende Schwamm, hat einen angenehmen mehlartigen Geruch und einen etwas scharfen, fast pfefferartigen Geschmack. Sein Fleisch ist derb und etwas zähe. Er gehört zu den eßbaren Schwämmen, welcher in großen Massen von dem Landvolke gesammelt wird, um zu Markte gebracht oder in eigenem Hause gegessen zu werden. Er ist eine gesunde gute, wenn auch nicht besonders feine Speise."

Coprinus deliquescens Zerfließender Tin-

tenblätterschw. ?

Agaricus truncorum	Strunkbewohnender B.	Coprinus truncorum	
Coprinus fimetarius	Mist-oder Krötens. -	cinereus	
Agaricus fuscescens	Bräunlicher Tintenbl./ ?		
- atramentarius/	Tintenschwamm	Coprinus atramentarius	
- comatus	Schopf-Tintenschw. -	comatus	
- ovatus	Eiförmige Schopfs. -	- v.ovatus	
- disseminatus	Gesäter Blätterschw.-	disseminatus	
- campanulatus	Glockenförmiger B.	Panaeolus sphinctrinus	
- papilionaceus/	Schmetterlingsförmiger B. -	papilionaceus	
- spadiceo-gri-			
seus	Braungrauer Bl.	Psathyrella spadiceo-griseo	
- corrugis	Gerunzelter Bl. -	corrugis	
- gyroflexus	Gewundener Blätterschw.-	gyroflexa	
- ericaeus	Heide-Blätterschw.	Hypholoma ericaeum	
- cernuus	Uebergebogener Bl.	Psathyrella cernua	
- spadiceus	Gelbbrauner Bl. -	spadicea	
- fascicularis	Büscheliger Bl.	Hypholoma fasciculare	
- lateritius	Ziegelfarbiger Bl. -	sublaterium	
- aeruginosus	Spangrüner Bl.	Stropharia aeruginosa	9)
- hypnorum	Moosblätterschw.	Galerina hypnorum	
- tener	Zarter Blätterschw.	Conocybe tenera	
- gramicola	Gras-Blätterschw.	Marasmius gramineum	
- conspersus	Gepudierter Bl.	Tubaria conspersa	
- escharoides	Grindartiger Bl. ?		
- sapineus	Tannen-Blätterschw.	Gymnopilus sapineus	
- fastibilis	Ekelschwamm	Hebeloma fastibile	10)
- crustilini-			
formis	Thränenekelschw. -	crustiliniforme	
- geophyllus	Erdblättriger Bl.	Inocybe geophylla	
- cinnamomeus			
s.croceus	Zimmt-Blätterschw.	Dermocybe cinnamomea	11)
- calochrous	Schönhäutiger Bl.	Cortinarius calochrous	
- varius	Veränderlicher Bl. -	varius	12)
- bivelus	Ringfranziger Bl. -	bivelus	
- pascuus	Wiesen-Blätterschw. ?	Entoloma sp.	
- conicus	Kegelförmiger Bl.	Hygrocybe conica	
- ceraceus	Wachs-Blätterschw. -	ceracea	
- eburneus	Elfenbeinschwamm	Hygrophorus eburneus	
- cossus	- Abart	- cossus	
- pyrogalus	Waldteufel, Brennreizker	Lactarius pyrogalus	
- torminosus	Grimmreizker	- torminosus	
- scrobiculatus/	Grubiger Milchbl. -	scrobiculatus	
- cicilioides	Gefranzter Bl. -	citriolens	
- theiogalus	Schwefelmichend.Bl.-	thiogalus	
- quietus	Ruhiger Milch-Bl. -	quietus	
- vietus	Welker Milch-Bl. -	vietus	

Agaricus	emeticus	Giftiger Täubling	Russula emetica	13)
-	ruber	Rother Täubling	?	
-	emeticus var.			
-	pileo virescente	Licht-olivengrüner T.?		
-	fallax	Zimtbrauner Täubling	?	
-	atro-purpurea	Dunkelrother Täubl.	Russula atropurpurea	
-	caeruleus	Blauer Täubling	-	coerulea
-	fragilis	Zerbrechlicher T.	-	fragilis
-	rosaceus	Rosentäubling	-	rosacea
-	aeruginosus	Spangrüner Täubling	-	aeruginea
-	olivascens	Olivengrüner Täubl.	-	olivascens
-	virescens	Grünlicher Täubling	-	virescens
-	cyanoxanthus	Graublauer -	-	cyanoxanthus
-	citrinus s.			
-	auratus	Citronengelber Täubl.	-	(?) aurata 14)
-	alutaceus	Lederfarbiger Täubl.	-	alutacea
-	furcatus	Gabelblättriger T.	?	
-	adustus	Brandiger Täubling	-	adusta 15)
-	foetens	Stinkender Täubling	-	foetens
-	campanella	Glöckchen-Blätterschw.	Xeromphalina campanella	
-	pyxidatus	Büchsenförmiger Bl.	Omphalina pyxidata	
-	vulgaris	Gemeiner Blätterschw.	Mycena vulgaris	
-	galopus	Milchender Blätterschw.	-	galopus
-	alcalinus	Alkalischer Blätterschw.	-	alcalina
-	galericulatus	Helmförmiger Bl.	-	galericulata
-	polygrammus	Geschwänzter Bl.	-	polygramma
-	purus	Reiner Blätterschw.	-	pura
-	androsaceus	Schild-Blätterschw.	Marasmius androsaceus	
-	rotula	Radblättriger Bl.	-	rotula
-	scorodonius	Lauchschwamm	-	scorodonius
-	dryophilus	Waldbewohnender Bl.	Collybia dryophila	
-	collinus	Hügel-Blätterschw.	Marasmius collinus	
-	esculentus	Essbarer Blätterschw.	Strobilurus esculentus	
-	oreades	Oreaden-Blätterschw.	Marasmius oreades	
-	butyraceus	Butteriger Blätterschw.	Collybia butyracea	
-	radicatus	Wurzelnder -	Oudemansiella radicata	
-	laccatus	Lack-Blätterschw.	Laccaria laccata	
-	fragrans	Riechender Blätterschw.	Clitocybe fragrans	
-	suaveolens	Wohlriechender Bl.	-	suaveolens
-	flaccidus	Flatteriger Bl.	-	flaccida
-	gilvus	Fahlgelber Blätterschw.	Lepista gilva	
-	dealbatus	Weißer-Blätterschw.	Clitocybe dealbata	
-	odorus	Anis-Blätterschwamm	-	odora
-	albellus	Weißer Maischwamm	Calocybe gambosa	16)
-	personatus	Maskirter Blätterschw.	Lepista personata	
-	sulphureus	Schwefelgelber Bl.	Tricholoma sulphureum	
-	mucidus	Schleimiger Bl.	Oudemansiella mucida	
-	granulosus	Gekörnter Blätterschw.	Cystoderma granulosum	
-	clypeolarius	Schildblätterschw.	Lepiota clypeolaria	
-	procerus	Regenschirmschwamm	Macrolepiota procera	17)
-	excoriatus	Geschundener Bl.	-	excoriata
-	rubescens	Perlenschwamm	Amanita rubescens	18)
-	asper	Rauher Blätterschw.	-	aspera
-	excelsus	Hoher Blätterschw.	-	(?) spissa 19)
-	pantherinus	Pantherschwamm	-	pantherina
-	muscaria	Gemeiner Fliegenschw.	-	muscaria 20)
-	caesareus	Kaiserling	-	caesarea 21)
-	phalloides	Knollen-Blätterschw.	-	phalloides 22)

Bemerkungen

Bei einigen der genannten Arten steht zu lesen: 'häufig oder selten in hiesiger Gegend'.

Hinter manchen Pilznamen verbergen sich nach heutiger Erkenntnis mehrere Arten (Aggregate).

Interessant sind auch manche Wertbezeichnungen, die zum Teil auch heute noch zutreffen, aber zum Teil auch nach derzeitigen Gesichtspunkten anders einzuordnen sind.

Einige Passagen werden wörtlich zitiert. Diese sind in " gesetzt.

a) b) Ziffer a) = Seite bei S t a u d e / b) = Seite d. Beitrages

30 27 1) "Fleischig-wachsartig, bis 3''' breit, flach-schüsselförmig, mit bald blasserer, bald dunklerer, meist hochrother Scheibe, am Rand mit schwarzen, steifen, wimperartigen Haaren. An faulendem Holz in Wäldern vom Frühjahr bis in den Herbst, heerdenweise." Sammelart.

30 27 2) U.a. "An feuchten Stellen in Wäldern auf von Erde bedeckten faulenden Zweigen." Erst in diesem Jahr, am 31. März, gelang B. H a n f f eine Aufsammlung dieser Art in Nordwestoberfranken, allerdings nicht im Kreis Coburg, sondern bei Kaider im Kreis Lichtenfels. H. O. B a r a l, der uns die Aufsammlung bestätigte, teilte mir mit, daß diese Art bereits im Februar 1881 am alten Festungsweg in Coburg gefunden wurde. Leg.?, hinterlegt im Herbar Hausknecht in Jena. Nachdem heute 5 Sarcoscypha-Arten bekannt sind (siehe Z.f.M. 50 (1): 117 - 145), dürfte die Art S t a u d e s nur Aggregat sein.

40 28 3) "Ein wohlschmeckender, gesunder Schwamm, der im Spätsommer und Herbst in Nadelwäldern wächst." R. aurea ist eine Art der Kalkbuchenwälder und ziemlich selten, die schon wegen des Standortes nicht in betracht kommen kann. Sie war bis vor kurzer Zeit eine Kollektivart. Was aber wirklich gefunden wurde, kann heute nicht mehr festgestellt werden. Evt. könnte auch die 1973 neu beschriebene und in Bergfichtenwäldern vorkommende Art R. largentii MARR & STUNTZ in Frage kommen?

42 28 4) Bei dieser Art verweist S t a u d e auf die Abb. KROMBH. t. 22. f. 2-4. "Dem vorigen (S. crispa) ähnlich, Aeste aber mit gerade auslaufenden Spitzen, ganzrandig und nicht zurückgebogen. Wurde bis jetzt nur einmal im Holze am Brand gefunden. Siehe auch S. brevipes Seite 19.

44 28 5) Hier dürfte es sich um Trichaptum abietinum handeln.

45 28 6) "In hiesiger Gegend ungewiß". Hier ist nur ein neuerer Fund bekannt (siehe 'Die Pilzflora von Coburg I, Jahrb. der Coburger Landesstiftung 1973: 257), am 20.09.1970, Callenberger Forst bei Coburg, morscher Fagus-Stumpf, leg./det. H. E n g e l.

45 28 7) U.a. "Dieser fleischige, eßbarer Pilz wächst im Herbst an alten Stämmen der Laub- und Nadelhölzer, und erreicht eine Größe von über 1 Fuß Durchmesser; selten." Nachdem früher die 'Korallenstachelbärte' nur als eine Art aufgefaßt wurden, könnte hier nach der Substratangabe sowohl der 'Tannen-Stachelbart' Hericium corraloides (SCOP. ex FR.) PERS. als auch der 'Ästige' Stachelbart H. clathroides (PAL. ex FR.) S.F. GRAY in Frage kommen.

52 29 8) U.a. "Dieser kräftige und angenehm nach Veilchenwurz oder Anis riechende Schwamm wächst häufig auf geköpften alten Stämmen der Silber- und Dotterweiden. Ehemals war er officinell, und wurde gegen Lungensucht angewendet."

a) b) Ziffer

83 30 9) Als Aggregat aufzufassen.

U.a. "Dieser unangenehm nach ranzigem Oele riechende Schwamm gehört zu den schädlichen; er wächst einzeln, zuweilen auch gesellig, im Sommer und Herbst, sowohl an mulmigen Baumstämmen in Wäldern, wie auch an Wiesen. In hiesiger Gegend nicht häufig."

88 30 10) U.a. "Der Geruch und Geschmack dieses Schwammes hat
89 etwas Ekelhaftes, doch habe ich dies nie in so hohem Ma-
X ße wahrgenommen, als gewöhnlich angegeben wird. Biswei-
len ist der Geruch kaum merklich unangenehm und der
Geschmack nur bitterlich-rettichartig. Da das Aussehen
dieses Schwammes, wegen seiner matten Färbung, nichts
Auffallendes und Verdächtiges hat, so hat man große
Vorsicht zu gebrauchen, um denselben nicht als eßbar
zu sammeln." Dazu die Krankheitsgeschichte Seite X.
" a) Vergiftung der W... Eheleute, beide in den 60. Jahren.
Nach Verlauf von einer Stunde trat Magenschmerz, und
reißender kolikartiger Schmerz in den Dünndärmen mit
Neigung zum Erbrechen ein, welches unter Würgen nur
sparsam erfolgte. Die Hinfälligkeit war, als ich die
Kranken sah, bereits auffallend groß, die Haut kühl, der
Puls klein, sehr frequent, zitternd; von Zeit zu Zeit
brach ein kalter Schweiß hervor, die Glieder zuckten.
Anfangs war der Durst brennend heftig, bald aber trat
eine solche Abgeschlagenheit und Betäubung ein, daß die
Kranken kein bestimmtes Verlangen mehr äußerten. Der Tod
war zu fürchten. Auf die unten zu erwähnende Behandlung
trat baldige Besserung und nach einigen Tagen vollkom-
mende Genesung ein. Die ersten Erscheinungen der Bes-
serung waren: Aufhören des Zitterns der Glieder, lang-
samerer, freierer, weicherer Puls, Wiederkehr der natür-
lichen Wärme auf der Haut und endlich allmähliches
Verschwinden der übrigen krankhaften Symptome.
b) Vergiftung mehrerer Personen durch den Ekelschwamm.
Diese Vergiftung kam sehr frühzeitig zur Behandlung,
und wurde durch schnelle Hilfe beseitigt."

94 30 11) Als Aggregat aufzufassen.

97 30 12) U.a. "Dieser Schwamm ist an Größe und Gestalt, wie auch
in Farbe sehr veränderlich, daher er das Geschick gehabt
hat, von verschiedenen Schriftstellern mit 25 verschie-
denen Namen belegt zu werden."

112 31 13) Aggregat.

113 U.a. "Der Speitäubling hat bisweilen einen nur unbe-
deutenden, bisweilen einen ekelhaften Geruch, einen sehr
scharfen, auch bitterlichen Geschmack und ist entschie-
den giftig. Sein Genuß erregt wie K r a p f's denkwür-
dige Vergiftung bestätigt, brennend-heftigen Schmerz
im Magen mit Uebelkeit und Ekel, schmerzhaftes Dehnen
in den Eingeweiden. Erbrechen und Diarrhöe, die beschwer-
lichste Beängstigung, Schwindel, kalten Schweiß, kleinen
fadenförmigen, schnellen Puls, und es erfolgt, wenn keine
Hülfe gebracht wird, wie andere Beispiele lehren, selbst
der Tod."

115 31 14) Hier werden die Täublinge auch allgemein abgehandelt. U.a.
"Die Täublinge wachsen, wie an vielen anderen Orten, so
auch in der Umgebung von Coburg, sowohl nach Zahl der
Arten wie an Zahl der Individuen in erstaunlicher Menge;
selbst in Jahren, welche dem Wachsthum der Schwämme
weniger günstig sind, sieht man in allen Waldungen diese

a) b) Ziffer

durch ihren eigenthümlichen Habitus leichtkenntlichen Schwämme den Boden bedecken....Standort und Witterungsverhältnisse üben auf die Güte des Schwammes bisweilen einen noch nicht vollkommen erklärten,abändernden Einfluß aus.Als eine Volksregel ist daher anzusehen,daß die Täublinge als verdächtige,schädliche,oder gar giftige Schwämme zu meiden sind."

- 116 31 15) U.a. "Ist giftig."
 125 31 16) Der Maipilz wird in drei Arten unterteilt.
 126 Agaricus graveolens,Starkkriechender Maischwamm.
 'Auf Grasplätzen und unter Gebüsch im Frühjahr wachsend.
 Hut weißlich,gelblich oder auch rußig-braun.'Könnte
 mit der von mir gefundenen Abart identisch sein,die ich
 seit vielen Jahren in den grasigen Waldungen auf der
 Sennigshöhe,Krs.Coburg,Muschelkalkgebiet,unter Kiefer,
 Wacholder,Schlehengebüsch finde.
A.albellus,Weißer Maischwamm.
 Hut weiß,später graubraun,feucht-schuppig,wie betropft,in
 Laubwäldern.'
A.pomonae,Pomona-Maischwamm LENZ.A.gambosus FR.
 Hut blaßgelb,wie fettig,auf Grasplätzen.'
 133 31 17) U.a. "Er ist eßbar und wird oft zu Markte gebracht.Da er
 reichliche und gesunde,wenn auch nicht besonders fein-
 schmeckende Mahlzeiten giebt,so ist er immerhin für das
 Volk als ein zweckmäßiges Nahrungsmittel zu empfehlen."
 134 31 18) U.a. "Dieser bei uns in Laub-und Nadelwäldern im Sommer
 und Herbst einzeln,aber nicht selten wachsende Schwamm,
 ist schädlich,und jedenfalls wegen der möglichen Verwechs-
 lung mit seinen wahrhaft giftigen Verwandten streng zu
 meiden."
 134 31 19) U.a. "am Grunde mit Knollen und Wulst,nach oben mit ei-
 nem weiten,glockenförmigen,gestreiften Ring.Er ist giftig."
 135
 137 31 20) U.a. "Der Fliegenschwamm wächst häufig im Sommer und Herbst
 in allen unseren Wäldern,und wird vom Volke gesammelt,um
 als Gift für die Stubbenfliegen aufgestellt zu werden."
 136 31 21) U.a. "Dieser,mehr dem Süden angehörend,wird im mittleren
 und nördlichen Deutschland nicht gefunden,weßhalb in hie-
 siger Gegend zu einer Verwechslung dieser beiden Schwäm-
 me (Fliegenpilz-Kaiserling) keine Gelegenheit gegeben ist."
 Er wurde dann aber doch auch bei uns gefunden (siehe
 A d e in Z.f.P. 1936: 98)".Anfang der 20. Jahre (1920)
 wurden über 100 Expl. bei Lahm,Krs.Coburg,MTB 5831,ge-
 funden,leg.Z a n g.In etwa gleicher Zeit sind Funde
 bei Presseck,Krs.Kulmbach und bei Altenstein,Krs.Coburg
 bekanntgeworden,leg.K i e ß l i n g u.B r ü c k n e r.
 Nach 1945 wurde er auch bei Oberheid,Krs.Bamberg,leg./det.
 H e i l m a n n und bei Fabrikschleichach,Steigerwald,
 gefunden.
 137 31 22) Aggregat.U.a. "Nach der Farbe des Hutes kann man mehrere
 Abarten unterscheiden: a) die gelbe,A.citrinus SCHAEFF..
 ...wurde auch als besondere Art angesehen und A.mappa ge-
 genannt.b) die grüne,A.viridis PERS.,c) die bräunlich-
 grüne,A.virescens FLOR.,d) die weiße,bei welcher der
 ganze Schwamm weißlich und ohne Fetzen erscheint."

- - - - -

Auf den nachfolgenden Seiten werden die Pilzarten aufgelistet,bei denen auch Fundorte genannt sind.Diese werden in Kürzeln angegeben,deren genaue Bezeichnungen auf Seite 50 vermerkt sind.

Es handelt sich dabei um Arten,die auch von uns nach 1945 regi-
 striert wurden.

Nr.)	Deutscher Name bei S t a u d e:	Wissenschaftlicher Name bei/ S t a u d e:	Wissenschaftlicher Name nach neuerer Literatur(1985):	Fundorte:
001)	Holz-Kugelpilz	Hypoxylon vulgare	Xylaria hypoxylon (LINNAEUS) DUM.	Co
002)	Faul-Stäubling	Aethalium septicum	Fuligo septica (L.) WIGGERS var. septica	Co
003)	Bleifarbiges Milchs.	Lycogala plumbeum	Dictydialium plumbeum (SCHUM.) ROST.	Ww
004)	Riesen-Staubpuff	Lycoperdon bovista	Langermannia gigantea (BATSCH ex PERS.) R/Co	
005)	Viertheiliger Sternp./ Geastrum fornicatum s. quadrifidus	Geastrum fornicatum s. quadrifidus	Geastrum quadrifidum PERS. ex PERS.	Gs
006)	Witterungs-Sternpuff/	Geastrum hygrometricus	Astraeus hygrometricus (PERS.) MORGAN	Ah
007)	Schüsself. Becherpilz/	Cyathus scutellaris	Crucibulum laeve (HUDS. ex RELH.) KAMPLY.	Nc
008)	Präsentirtellerf. B.	Peziza hypocrateriformis	Helvella macropus (PERS. ex FR.) KARST.	Co
009)	Orange-Becherschw.	Peziza aurantia	Aleuria aurantia (FR.) FÜCK.	Bb
010)	Ader-Becherschwamm	- acetabulum	Paxina acetabulum (L. ex ST. AMANS) KUNTZE	Gs
011)	Sumpf-Mützenpilz	Mitrulea paludosa	Mitrulea paludosa FR.	Nc
012)	Kappenförmiger M.	- cucullata	Heyderia abietis (FR.) LINK	Nc
013)	Gelblicher Spatelp.	Spathulea flavida	Spathularia flavida PERS.: FR.	Ah
014)	Krauser Spatelpilz	- crispa	-	Ah
015)	Schlüpfrieger Kappenp.	Leotia lubrica	Leotia lubrica PERS.	Nc
016)	Frühlorchel, Speisel.	Helvella esculenta	Gyromitra esculenta (PERS.) FR.	Bx, Of
017)	Insellorchel	- infula	- infula (SCHFF.) FR.	Bx, Of
018)	Edbare Morchel	Morchella esculenta	Morchella esculenta PERS. ex ST. AMANS/Bi, Co, Pl, Rb, S	3
019)	Klebriger Hornträger/	Calocera viscosa	Calocera viscosa (PERS. ex FR.) FR.	Ah, Ca (WW)
020)	Zungen-Keulenschw.	Clavaria ligula	Clavariadelphus ligula (SCHFF. ex FR.) D.	Ah
021)	Herkuleskeule	- pistillaris	- pistillaria (FR.) DONK	Bb, Gs, Ww
022)	Grauer Keulenschw.	Clavaria grisea	Clavulina cinerea (FR.) SCHROETER	Bb
023)	Safrangelber Keul.	- crocea	Ramariopsis crocea (PERS. ex FR.) CORNER	Zd
024)	Schöner Keulenschw.	- formosa	Ramaria formosa (FR.) QUEL.	Bb, Hs
025)	Aschgrauer Keulens.	- cinerea	Clavulina cinerea (FR.) SCHROETER	Gs
026)	Gelber Keulenschw.	- flava	Ramaria flava (SCHFF. ex FR.) QUEL.	Ah, Bb, Hs
027)	Traubiger Keulens.	- botrytis	- botrytis (FR.) RICKEN	Bb, Hs, Ww
028)	Krauser Ziegenbart	Sparassis crispa	Sparassis crispa (WULF.) ex FR.	Cb
029)	Ohrlöffel-Stachels.	Hydnum auriscalpium	Auriscalpium vulgare S. F. GRAY	Bb, Wa
030)	Filziger Stachels.	- tomentosum	Phellodon tomentosus (L. ex FR.) BANKER	Bb
031)	Schwarzer Stachels.	- nigrum	- niger (FR. ex FR.) KARST.	Of
032)	Becherförmiger St.	- cyathiforme	Hydnellum concrescens (PERS. ex SCHW.) B.	Bb
033)	Aschgrauer Stachels.	- cinereum	Bankera violascens (ALB. & SCHW. ex FR.) P.	Of
034)	Orangefarb. -	- aurantiacum	Hydnellum aurantiacum (BATSCH ex FR.) K.	Bb, Cb
035)	Rostbrauner Stachels.	- ferrugineum	- ferrugineum (FR. ex FR.) KARST.	Bb
036)	Wohlrüchender St.	- suaveolens	- suaveolens (SCOP. ex FR.) KARST.	Bb, Cb, Sd
037)	Schuppiger Stachels.	- subsquamosum	Sarcodon scabrosus (FR.) P. KARST.	Of
038)	Eichen-Wirrschwamm	Daedalea quercina	Daedalea quercina (L. ex FR.)	Co

039)	Einfärbiger Wirrsch.	Daedalea unicolor	Co
040)	Leberpilz, Zungenp.	Fistulina hepatica	Co
041)	Wohlrriechende Tram.	Trametes odorata	Gs
042)	Weiden-Löcherpilz	Polyporus salicinus	Ww
043)	Zunderschwamm	fomentarius	N/Wl
044)	Birkenschwamm	betulinus	Bb
045)	Bläulicher Löcherp.	caesius	Of
046)	Schwefelgelber L.	sulphureus	Ol
047)	Semmelpilz	confluens	Co
048)	Glänzender Löcherp.	lucidus	K.&P./Bb, Eb
049)	Schuppiger -	squamosus	Gs, Hs
050)	Winter-Löcherpilz	brumalis	Co
051)	Schaf-Löcherpilz	ovinus	Co
052)	Rauher Röhrenpilz	Boletus scaber	K.&P. Bb
053)	Steinpilz, Herrenp.	edulis	S.F. GRAY Bb
054)	Hexenpilz	luridus	Ah, Bb, Eb, Nk, Sf
055)	Schusterpilz	erythropus	Co, Fi
056)	Satanaspilz	Satanas	Co, Fi
057)	Dickfüßiger Röhr.	pachypus	Br
058)	Schönfüßiger Röhr.	calopus	Ah
059)	Filziger Röhrenpilz	subtomentosus	Ah
060)	Sandpilz	variegatus	QUEL. Bb, Gs
061)	Pfefferpilz	piperatus	O.K. Bb
062)	Kastanienbrauner R.	badius	BAT. Bb
063)	Ringpilz	luteus	Bb
064)	Der schöne Ringpilz	elegans	Ah, Bb
065)	Tannen-Lenzblätters.	Lenzites abietina	Ah
066)	Birken--	betulina	Ah
067)	Zusammenziehender B.	Panus stipticus	P.K. Co
068)	Muschelförmiger Bl.	conchatus	Of
069)	Schuppiger-Zäh-Bl.	Lentinus lepideus	Bb, Of
070)	Schwarzfilziger-Bl.	Paxillus atro-tomentosus	Cb, Of, Ww
071)	Fingerollter Bl.	involutus	Co
072)	Panusartiger Bl.	panuoides	Wa
073)	Erdständiger -	Pleuropus geogenius	Co
074)	Austernschwamm	ostreatus	Co
075)	Eichenholz-Blätters.	Agaricus dryinus	SING. Co
076)	Ulmen-Blätterschw.	ulmarius	KUM. Co
077)	Füllhorn-Trichters.	Craterellus cornucopioides	KÜHN. Co
078)	Gelblicher-Trichters-	lutescens	Bb
079)	Studentenkäppchen	clavatus	S.F. GRAY Rb, Sd
080)	Schimmernder Tint.	Coprinus micaceus	FR. Co

Cerrena unicolor (BULL.ex FR.)	MURR.	Co
Fistulina hepatica (SCHAEFF.)	ex FR.	Gs
Gloeophyllum odoratum (WULF.ex FR.)	IMAZ.	Ww
Phellinus igniarius var. trivialis (B.ex K.)	N./Wi	
Fomes fomentarius (L.ex FR.)	FR.	Bb
Piptoporus betulinus (BULL.ex FR.)	P.K.	Of
Postia caesia (SCHRAD.ex FR.)	P.KARST.	Ol
Laetiporus sulphureus (BULL.ex FR.)	MURR.	Co
Albatrellus confluens (A. & S.ex FR.)	K. & P./Bb, Eb	Gs, Hs
Ganoderma lucidum (FR.)	P.KARST.	Co
Polyporus squamosus (HUDS.)	ex FR.	Co
- brumalis (PERS.)	ex FR.	Co
Albatrellus ovinus (SCHAEFF.ex FR.)	K. & P.	Bb
Leccinum scabrum (BULL.ex FR.)	S. F. GRAY	Bb
Boletus edulis BULL.ex FR.	Ah, Bb, Eb, Nk, Sf	
- luridus SCHFF.ex FR.		Co, Fi
- erythropus (FR.ex FR.)	PERS.	Co, Fi
- satanas LENZ		Br
- pachypus ss. SECRETAN		Ah
- calopus FR.		Ah
Xerocomus subtomentosus (L.ex FR.)	QUEL. Bb, Gs	
- variegatus (SWARTZ ex FR.)	O. K. Bb	
Calciporus piperatus (BULL.ex FR.)	BAT.	Bb
Xerocomus badius (FR.)	KÜHN.ex GILB.	Bb
Suillus luteus (L.ex FR.)	S. F. GRAY	Ah, Bb
- grevillei (KOTZSCH)	SING.	Ah
Gloeophyllum abietinum (BULL.ex FR.)	P. K. Co	
Lenzites betulinus (L.ex FR.)	FR.	Of
Panellus stypticus (BULL.ex FR.)	KARST.	Bb, Of
Panus conchatus (BULL.ex FR.)	FR.	Cb, Of,
Lentinus lepideus (FR.ex FR.)	FR.	Co
Paxillus atromentosus (BATSCH)	FR.	Wa
- involutus (BATSCH)	FR.	Co
- panuoides FR.		Co
Hohenbuehelia geogenia (DC ex FR.)	SING.	Co
Pleurotus ostreatus (JACQ.ex FR.)	KUM.	Co
- dryinus (PERS.ex FR.)	KUMMER	Cb
Lyophyllum ulmarium (BULL.ex FR.)	KÜHN.	Co
Craterellus cornucopioides (L.)	ex PERS.	Bb, Ww
Cantharellus tubaeformis FR.		Bb
Gomphus clavatus (PERS.ex FR.)	S. F. GRAY	Rb, Sd
Coprinus micaceus BULL.ex FR.)	FR.	Co

081)	Gefleckter Blätters.	Agaricus maculatus	Gomphidius maculatus (SCOP.) FR.	Gs
082)	Schmieriger Bl.	viscidus	Chroogomphus rutilus (SCHFF.ex FR.) O.K.M.Of	
083)	Schleimiger - .	glutinosus	Gomphidius glutinosus (SCHFF.) FR.	Ah, Bb
084)		- var. rosea	- roseus (L.) FR.	Ww
085)	Thränender Blätters.	lacrymabundus	Psathyrella velutina (Pers.ex FR.) SING.	Bb
086)	Spangrüner -	aeruginosus	Stropharia aeruginosa (CURT.ex FR.) QUEL.	Bb
087)	Brachpilz, Ehegärtel	campestris	Agaricus campestris (L.) FR.	Co, Gs, Rb, Sf
088)	Wald-Champignon	silvaticus	- silvaticus SCHFF.	Ah
089)	Acker-Champignon	arvensis	- arvensis SCHFF.ex FR.	Ah
090)	Seidenschwamm	bombycinus	Volvariella bombycina (Pers.ex FR.)	Bb, Co
091)	Stattlicher Bl.	speciosus	- speciosa (FR.) SING.	Co
092)	Ziegelfarbiger Bl.	laticatus	Hypholoma sublateritium (FR.) QUEL.	Bb, Gs
093)	Gelber Blätterschw.	flavidus	Pholiota flavida (SCHFF.ex FR.) SING.	Bb
094)	Rissiger Blätterschw.	rimosus	(?) Inocybe rimosus BULL.	Ah
095)	Stockschwamm	mutabilis	Kuehneromyces mutabilis (SCHFF.ex FR.) S&S	Co
096)	Höckeriger Blätters.	tuberculosus	Pholiota tuberculosa (SCHFF.ex FR.) KUM.	Gs
097)	Fetter Blätterschw.	adiposus	- adiposa (FR.) KUMMER	Gs
098)	Goldflammiger Bl.	aurivellus	- aurivella (BATSCH ex FR.) KUM.	Gs
099)	Sparriger Blätters.	squarrosus	- squarrosa (Pers.ex FR.) KUMMER	Ah, Co
100)	Frühzeitiger Bl.	praecox	Agrocybe praecox (Pers.ex FR.) FAY.	Cb
101)	Runzelblätterschw.	caperatus	Rozites caperata (Pers.ex FR.) KARST.	Bb, Gs, Hs
102)	Aprikosenfarbiger Bl.	armeniacus	Cortinarius armeniacus (SCHFF.ex FR.) FR.	Ah, Bb
103)	Besudelter Blätters.	collinitus	- collinitus FR.	Gs
104)		mucosus	- mucosus (BULL.ex FR.) FR.	Gs
105)	Graustieliger Bl.	glaucopus	- glaucopus (SCHFF.ex FR.) FR.	Bb
106)	Bläulicher Blätters.	caerulescens	- caerulescens (SCHFF.ex SECR.) Bb	
107)	Amethystfarbiger Bl.	amethystinus	- traganus FR.	Bb, Cb
108)	Rehbrauner Blätters.	cervinus	Pluteus atricapillus (KONR.) KÜHN.	Bb, Co
109)	Rosenschwamm	rhodopolium	Entoloma rhodopolium (FR.) KUMMER	Rt
110)	Pflaum-Blätterschw.	prunulus	Clitopilus prunulus (SCOP.ex FR.) KUMMER	Ah, Bb
111)	Papageigrüner Bl.	psittacinus	Hygrocybe psittacina (SCHFF.ex FR.)	Gs, Nk
112)	Hochrother Blätters.	puniceus	- punicea (FR.) KUMMER	Gs
113)	Mennigrother Bl.	miniatus	- miniata (FR.) KUMMER	Gs
114)	Junfernschwamm	virgineus	Camarophyllus virgineus (WULF.ex FR.) K.	Bb, Ec
115)	Scharlachrother Bl.	coccineus	Hygrocybe coccinea (SCHFF.ex FR.) KUMMER	Gs
116)	Schneeweißer Bl.	niveus	Camarophyllus niveus (SCOP.ex FR.) WÜN.	Bb
117)	Wiesenschwamm	pratense	- pratensis (Pers.ex FR.) K.	Ec
118)	Gleißender Blätters.	penarius	Hygrophorus penarius FR.	Ec
119)	Goldzahniger Bl.	chrysodon	- chrysodon (BATSCH) FR.	Bb
120)	Kleberiger Milch-Bl.	uvidus	Lactarius uvidus FR.	Co, Gs

121)	Gemeiner Milch-Bl.	Agaricus	trivialis	Lactarius	trivialis FR.	Bb, Ww
122)	Graugrüner Milchbl.	-	blennius	-	blennius FR.	Bb
123)	Weißmilchender Bl.	-	insulsus	-	insulsus FR.	Cb
124)	Gebogener Milch-Bl.	-	flexuosus	-	flexuosus FR.	Bb, Cb, Co
125)	Bleifarbiges Bl.	-	plumbeus	(?)	turpis (WEINM.) FR.	Gs
126)	Pfefferschwamm	-	piperatus	-	piperatus (L.ex FR.)	Bb, Cb, Co
127)	Wollpfefferschwamm	-	vellerius	-	vellerius (FR.) FR.	Bb, Cb, Co
128)	Strittiger Milch-Bl.	-	controversus	-	controversus PERS.ex FR.	Gs
129)	Flaumhaariger M.	-	pubescens	-	pubescens FR.	Co
130)	Aechter Reizker	-	deliciosus	-	deliciosus FR.	Co
131)	Scharfer Milch-Bl.	-	acris	-	acris BOLT ex FR.	Bb, Gs
132)	Süßriechender M.	-	glyciosmus	-	glyciosmus FR.	Bb
133)	Rothbrauner Milch-Bl.	-	rufus	-	rufus (SCOP.) FR.	Ah
134)	Süßlicher Milch-Bl.	-	subulcis	-	subulcis BULL.ex FR.	Bb, Of
135)	Aechter Brätling	-	volemus	-	volemus FR.	Bb, Br, Gs
136)	Mildester Milch-Bl.	-	mitissimus	-	mitissimus FR.	Bb, Of
137)	Lederfarbiger Täubl.	-	alutaceus	-	alutaceus (PERS.ex FR.) FR.	Bb
138)	Stinkender Täubling	-	foetens	-	foetens FR.	Bb
139)	Knoblauch Blätters.	-	alliaceus	-	Marasmius alliaceus (JACQ.ex FR.) FR.	Gs
140)	Reiner Blätterschw.	-	purus	-	Mycena pura (PERS.ex FR.) KUMMER	Bb
141)	Durchbohrender Bl.	-	perforans	-	Micromphale perforans (HOFM.ex FR.) SING./Bb	Bb
142)	Sammtstieliger Bl.	-	velutipes	-	Flammulina velutipes (CURT.ex FR.) SING./Co	Co
143)	Spindelschwamm	-	fusipes	-	Collybia fusipes (BULL.ex FR.) QUEL.	Bb, Co
144)	Becherförmiger Bl.	-	cyathiformis	-	Pseudoclitocybe cyathiformis (BULL.ex FR.) S./Ww	S./Ww
145)	Buckeliger Trichter-Bl.	-	gibbus	-	Clitocybe gibba (PERS.ex FR.) KUMMER	Bb
146)	Nebelgrauer Bl.	-	nebularis	-	Lepista nebularis (FR.) HARMAJA	Ed
147)	Starkriechender Mais-	-	graveolens	-	Calocybe gambosa (FR.) DONK	Ig, Rb
148)	Pomona-Maischwamm	-	pomonae	-	-	Ig, Nc, Rb, Ww
149)	Weißer Blätterschw.	-	albus	-	Tricholoma album (SCHFF.ex FR.) QUEL.	Bb
150)	Gelber -	-	chrysenterus	-	Calocybe chrysenteron (BULL.ex FR.) S.	Bb, Ed
151)	Seifenartiger Bl.	-	saponaceus	-	Tricholoma saponaceum (FR.) KUMMER	Bb, Gs, Ww
152)	Geschwollener Bl.	-	tumidus	(?)	portentosum (FR.) QUEL.	Bb
153)	Erd-Blätterschwamm	-	terreus	-	terreum (SCHFF.ex FR.) KUM.	Bb
154)	Kuhfarbiger Bl.	-	vaccinus	-	vaccinum (PERS.ex FR.) KUM.	Bb
155)	Reinweißer Blätters.	-	columbetta	-	columbetta (FR.) KUMMER	Gs
156)	Röthlicher -	-	rutilans	-	Tricholomopsis rutilans (SCHFF.ex FR.) SED	SED
157)	Weißbrauner Bl.	-	albobrunneus	-	Tricholoma albobrunneum (PERS.ex FR.) K.Co	K.Co
158)	Gelbbrauner Bl.	-	flavo-brunneus	-	flavobrunneum (FR.) KUMMER	Bb
159)	Ritter-Blätterschw.	-	equestris	-	(?) auratum (PAUL.ex FR.) GILL/Ah, Bb, Cb	GILL/Ah, Bb, Cb
160)	Rosenrother Bl.	-	russula	-	Hygrophorus russula (SCHFF.ex FR.) QUEL.	Ah, Ww

- 161) Honiggelber Bl. Agaricus melleus
 162) Orangefarbiger Bl. - aurantius
 163) Kammiger Blätters. - cristatus
 164) Spitzschuppiger Bl. - acutesquamosus
 165) Scheidenschwamm - vaginatus

Bemerkungen

024) U.a. "Äste....orange-rosenfarbig, mit stumpfen, gelblichen End-Aestchen, nicht selten mit schwefelgelben, doldenartigen Spitzen. Ein fleischiger angenehm schmeckender Schwamm." - Gilt als giftig.

040) Wird als essbar bezeichnet und als Substrate werden Eichen, Walnußbäume, Buchen und Kastanien genannt.

046) U.a. "...hat einen nicht unangenehmen Geruch und Geschmack. Es wird in hiesiger Gegend dieser Schwamm vom Landvolke unter dem Namen Eierschwamm auch gegessen."

047) U.a. "In hiesiger Gegend häufig, ... dennoch bis jetzt wenig bekannt, und noch nicht zu Markte gebracht. Da man von demselben in wenigen Minuten Tragkörbe voll sammeln kann, und er eine ebenso gesunde wie schmackhafte, wie reichliche Nahrung giebt, auch keine Veranlassung zu Verwechslung mit giftigen Schwämmen bietet, so ist er zum Einsammeln für die Küche sehr zu empfehlen."

051) U.a. "Das Schafeuter roh genossen hat einen pikanten, nußkernähnlichen Geschmack und giebt zubereitet eine gesunde, wohl schmeckende Nahrung."

052) Wird als Sammelart betrachtet. U.a. "Es variiert dieser Schwamm vielfach in seiner Farbe, wonach man folgende Formen unterscheiden kann: a) mit orangefarbenem oder gelblichem Hute und gleichfarbigen Schüppchen

- Armillariella mellea (VAHL in Fl. Dan. Bb, Co, Gs, ex FR.) KARST. Of, Rb, Ww
 Tricholoma aurantium (SCHFF. ex FR.) RI. Bb
 Lepiota cristata (A. & S. ex FR.) KUMMER/Bb, Cb, Gs
 - acutesquamosa (WEINM.) KUMMER Ww
 Amanita vaginata (BULL. ex FR.) QUEL. Ah, Bb, Co

am Strunk; Boletus aurantiacus. b) mit rauhbraunem Hute und gleichfarbigen Schüppchen am Strunk; B. fuligineo-cinereus. c) mit braunschwarzem Hut, gelblich werdenden Röhrenchen und schwarzen Schuppen am Strunk; B. fusco-niger."

Bei a) dürfte evtl. Leccinum aurantiacum (BULL.) S.F. GRAY in Frage kommen. Jetzt gültiger Name L. rufum (SCHFF. 1774) KREISEL. b) und c) sind nicht sicher zu deuten.

Ferner wird auch noch für die hiesige Gegend als häufige und viel gesammelte Art B. rufus (Rothbrauner Röhrenpilz, Rothkopf) genannt. Hier könnte es sich um die 'Heiderotkappe' L. testaceoscabrum (SECR.) SING. handeln. Jetzt gültiger Name L. versipelle (FRIES 1835) SNELL 1944.

054, 055) B. luridus ist hier noch Kollektivart.

"Er variiert mit umbrafarbigem Hute und rothem ungenetztem Strunk; B. erythropus."

057) Schade, daß bei fast allen Artnamen die Autorennamen nicht genannt werden, doch verweist Stauder auf verschiedene Abbildungen. Der 'Dickfußiger Röhrenpilz, Bitterpilz, Dickfuß', Boletus pachypus, ist jedenfalls der Sektion Calopodes FR. zuzuordnen. Was sich hinter dieser Art verbirgt, ist nicht sicher zu sagen, wie auch Pilata/Dermek (1974) dies vermerken. Jedenfalls dürfte B. pachypus (FR.) QUEL. nicht in Frage kommen, eher die Art ss. SECRETAN'S.

August S o l l m a n n :

War ein jüngerer Zeitgenosse von Dr.F.S t a u d e.Sein Wirken ist in die zweite Hälfte des vorigen Jahrhunderts bis über die Jahrhundertwende hinaus zu datieren.Er war Mittelschullehrer.

Soweit mir diesbezügliche Literatur z.Zt. zur Verfügung steht, schlägt sich sein mykologisches Wirken im Werk T h.N i t s c h k e s 'Pyrenomycetes Germanici' mit einigen Fundangaben nieder(siehe Seite 47/48),sowie in ein eigens verfaßtes Pilzbüchlein:

Anleitung
zum

Bestimmen der vorzüglichsten eßbaren Schwämme Deutschlands
für

Haus und Schule
von

AUGUST S O L L M A N N

Mit mehr als 150 Abbildungen

Hildburghausen

Kesselringsche Hofbuchhandlung 1862

Dieses allgemein gehaltene Büchlein,das keine Fundortangaben unseres Gebietes umfaßt,enthält:

a) Zubereitung (mit 18 Rezepten).

Zwei sollen davon wiedergegeben werden:

aa) "Die ausgepreßten Stückchen werden mit Salz,Kümmel,Butter und etwas gehackter Petersilie so lange in einer Pfanne gebraten, bis sie fertig sind.Nach Belieben kann man auch Fleischbrühe, Kartoffelscheibchen,Brotstückchen,Mehl,Zwiebel,Eier,Sardellen, Häring und Pfeffer zusetzen."

bb)"Die Hüte werden unter heißer Asche gebraten,dann geschält und und mit etwas Salz und Oel ohne andere Gewürze gespeist."

b) Einfache Tabelle der Pilzarten.

c) Kurzbeschreibungen von 64 Pilzarten.

d) Abbildungen in Schwarz-weiß.

Bei diesem Büchlein mögen wohl selbst gefundene Pilzarten die Grundlage bilden.Die meisten der angeführten Artnamen haben auch heute noch ihre Gültigkeit,während die Gattungen jetzt oft umbenannt wurden.

Auf den nachfolgenden Seiten 41 und 42 erfolgt eine Auflistung der von S o l l m a n n beschriebenen Arten.

Beschrieben werden folgende Pilzarten:

Nr.)	Deutscher Name:	Wissenschaftlicher Name bei S o l l m a n n:	Wissenschaftlicher Name nach neuerer Literatur:	In NW-Oberfranken auch nach ca.1950 gefunden:
01)	Igel-Stachelbart	Hydnum erinaceus(BULL.)	Heridium erinaceum(BULL.ex FR.)PERS.	+
02)	Korallen-Stachelbart	-	coralloides(SCOP.)+?-	+
03)	Stoppelpilz	-	repandum(LINN.)	+
04)	Hirschzunge/Habichtsp.	-	imbricatum(LINN.)	+
05)	Leberpilz	Boletus hepaticus(HUDS.)	Sarcodon imbricatus(L.ex FR.)P.KARST.	+
06)	Belaubter Röhrling	-	fondosus(SCHRANKK.)	+
07)	Eichhase	-	umbellatus(PERS.)	+
08)	Zusammenfließender R.-	-	confluens(ALB.& SCHW.)	+
09)	Schafeuter	-	ovinus(SCHAEFF.)	+
10)	Riesschupper Röhrling	-	subsquamosus(LINN.)	+
11)	Königs-Röhrling	-	regius(KROMBH.)	+
12)	Essbarer Röhrling	-	edulis(BULL.)	+
13)	Gelber Röhrling	-	luteus(LINN.)	+
14)	Gelblicher Röhrling	-	flavidus(FR.)	+
15)	Schöner Röhrling	-	elegans(SCHUM.)	+
16)	Bekörter Röhrling	-	granulatus(LINN.)	+
17)	Rauher Röhrling	-	scaber(FR.)	+
18)	Milder Röhrling	-	mitis(KROMBH.)	+
19)	Ochsen-Röhrling	-	bovinus(LINN.)	+
20)	Speisepfifferling	Cantharellus cibarius(FR.)	Cantharellus cibarius FR.	+
21)	Keulenförmiger-Pfiff.-	-	clavatus(FR.)	+
22)	Schmackhafter Blätter-schwamm	-	Agaricus deliciosus(LINN.)	+
23)	Birnen Bl.	-	volemus FR.	+
24)	Eingerollter Bl.	-	involutus(BATSCH)	+
25)	Austernförmiger Bl.	-	ostreatus(JACQ.)	+
26)	Ulmen Bl.	-	ulmarius(BULL.)	+
27)	Pflaumen-Bl.	-	prunulus(SCOP.)	+
28)	Knochenweißer Bl.	-	eburneus(BULL.)	+
29)	Wiesen Bl.	-	pratensis(PERS.)	+
30)	Honiggelber Bl.	-	melleus(VAHL.)	+
31)	Geschundener Bl.	-	excoriatus(SCHAEFF.)	+
32)	Hoher Bl.	-	procerus(SCOP.)	+
33)	Goldfarbiger Bl.	-	caesareus(SCHFF.)	+
34)	Veränderlicher Bl.	-	mutabilis(SCHFF.)	+
35)	Runzeliger Bl.	-	caperatus(PERS.)	+
			Leccinum scabrum(BULL.ex FR.)S.F.GRAY	+
			Suillus bovinus(L.ex FR.)O.KUNTZE	+
			Cantharellus cibarius FR.	+
			Gomphus clavatus(PERS.ex FR.)S.F.GRAY	+
			Lactarius deliciosus FR.	+
			- volemus FR.	+
			Paxillus involutus(BATSCH)FR.	+
			Pleurotus ostreatus(JACQ.ex FR.)KUMMER	+
			Lyophyllum ulmarius(BULL.ex FR.)KÜHN.	+
			Clitopilus prunulus(SCOP.ex FR.)KUMMER	+
			Hygrophorus eburneus(BULL.ex FR.)FR.	+
			Cammarophyllus pratensis(PERS.ex FR.)KUM.	+
			Armillariella mellea(VAHL.in Fl.Dan.ex FR.)KARST.	+
			Macrolepiota excoriata(SCHFF.ex FR.)	+
			Macrolepiota procera(SCOP.ex FR.)SING.	+
			Amanita caesarea(SCOP.ex FR.)PERS.ex SCHW.	+
			Kuehneromyces mutabilis(SCHFF.ex FR.)SING.& SCHW.	+
			Rozites caperata(PERS.ex FR.)KARST.	+

36)	Feld Bl.	Agaricus campestris(LINN.)	Agaricus campester(L.) FR.	+
37)	Acker Bl.	arvensis(SCHFF.)	arvensis SCHFF.ex FR.	+
38)	Wald Bl.	sylvaticus(SCHFF.)	sylvaticus SECR.ex SCHFF.	+
39)	Esbarer Bl.	esculentus(WULF.)	Strobilurus esculentus(WULF.ex FR.)SING.	+
40)	Oreuden Bl.	oreadus(BOLTON)	Marasmius oreades(BOLT.ex FR.)FR.	+
41)	Starkriechender Bl.	graveolens(PERS.)	Calocybe gambosa var.graveolens(PERS.)DONK?	+
42)	Huf-Bl.	gambosus FR.	(FR.)DONK	+
43)	Weißer Bl.	albellus DE CAND.	var.albellum(FR.)	?
44)	Getigelter Bl.	tigrinus(SCHFF.)	Tricholoma pardinum QUEL.	+
45)	Lauch=Bl.	scorodonius(FR.)	Marasmius scorodonius(FR.)FR.	+
46)	Krauser Strunkschwamm/Sparassis	crispa(FR.)	Sparassis crispa(WULF.)ex FR.	+
47)	Amethystfarbiger Keulenpilz			nicht
48)	Korallen K.	Clavaria amethystina(BULL.)	Clavulina zollingeri LEV.	+
49)	Traubiger K.	coralloides(LINN.)	Clavulina cristata(FR.)SCHROETER	+
50)	Goldfarbiger K.	botrytis(PERS.)	Ramaria botrytis(FR.)RICKEN	+
51)	Gelber K.	aurea(SCHAEFF.)	aurea(SCHAEFF.ex FR.)QUEL.	+
52)	Ritzstielige Morchel	flava(TOURNEF.)	flava(Schaeff.ex FR.)QUEL.	+
53)	Kegelförmige M.	Morchella rimosipes(DE CAND.)	Mitrophora semilibera(DC ex FR.)LEV.	+
54)	Köstliche M.	conica(PERS.)	Morchella conica(PERS.)	+
55)	Edbare Speisemorchel	deliciosa(FR.)	- var.deliciosa FR.	+
56)	Riesenlorchel	esculenta(PERS.)	esculenta Pers.ex ST.AMANS	+
57)	Krause Lorchel	Helvella gigas(KROMBH.)	Gyromitra gigas(KROMBH.)COOKE	+
58)	Grubige Lorchel	crispa(FR.)	Helvella crispa FR.	+
59)	Insel=Lorchel	lacunosa(AFZ.)	lacunosa AFZ.ex FR.	+
60)	Riesnstaubbuff	infula(SCHFF.)	Gyromitra infula(SCHAEFF.ex PERS.)QUEL.	+
61)	Birmenstaubbuff	Bovista giganteum	Langermania gigantea(BATSCH ex PERS.)ROSTK+	+
62)	Beutelstaubbuff	pyriforme	Lycoperdon pyriforme SCHAEFF.ex PERS.	+
63)	Weißer Trüffel	saccatum	Calvatia excipuliformis(SCHAEFF.ex PERS.)PERD.+	+
64)	Speise Trüffel	Tuber albidum	Choiromyces venosa VITT.	+
		- cilarium	?	?

Dr. Alfred A d e:

Dr.h.c.A.A d e wurde am 17.Juli 1876 in Sarbogard in Ungarn geboren.Er starb mit 92 Jahren am 12.11.1968 in Gemünden a.Main.

Seine Schul- und Studienzeit verbrachte er in München.

Beruflich war er als Ober-Regierungs-Veterinärtrat bis ca.1912 in Weismain,Krs.Lichtenfels,tätig;um dann bis 1917 in Bad Brückenau und später in Gemünden a.Main beheimatet zu sein.

Zu seinem 75.Geburtstag erhielt er die Ehrendoktorwürde der Universität Würzburg verliehen.

Er war der geborene Naturforscher!Er sammelte nicht nur Pflanzen,Moose und Pilze,sondern auch Schnecken,Käfer,Mineralien und Versteinerungen.

Er erforschte nicht nur seine engere Heimat,sondern erweiterte sein enormes Wissen bei Studienfahrten in Deutschland und verschiedenen europäischen Ländern,u.a.Italien,Spanien,Portugal,Ungarn,Griechenland,Norwegen,Jugoslawien.

A d e s größtes Unglück dürfte der Verlust seines ganzen Herbars gewesen sein,das am Ende des letzten Krieges durch einen Bombenangriff in alle Winde zerstreut wurde,die letzten Blätter sollen ca.600 m entfernt beim Bahnhof in Gemünden gelegen haben.

Sein naturkundliches Forschen fand seinen Niederschlag in vielen ungewöhnlichen und vielfältigen Publikation.Hier einige Beispiele:

- + Flora des bayerischen Bodenseegebietes,1902.
- + Beiträge zur Pilzflora Bayerns.
- + Das Sammeln und Präparieren von Kryptogamen,Pilze im allgemeinen,1916.
- + Bemerkungen über die Polymorphie der Rubusbastarde nebst Beschreibungen einiger bayerischer Rubus-Neufunde,1912.
- + Bearbeitung der Gattung Rubus in Vollmann,Flora von Bayern,1912.
- + Vorarbeiten zur Durchforschung des Pflanzenschonbezirktes Berchtesgaden.
- + Ein Ausflug ins Murnauer Moor.
- + Die Isarauen unterhalb Moos bei Plattling.
- + Neue Rubusformen aus dem Bergischen,1930/31.
- + - - - - - Oberbergischen,1935.
- + "Drei neue Pilze",1924.
- + "Neue Pilze",1926.
- + "Vergiftung durch Oleanderblätter",1912.
- + Ledum palustre L.,eine für Bayern verschollene Pflanze,1908.
- + Wilhelm Gugler,ein Nachruf,1910.
- + Die Herkunft der (sarmatischen) und der südlichen (mediterranen) Pflanzen und Tiere im fränkischen Maingebiet.
- + I.Mainfränkische Pflanzen überdauern die Eiszeiten,zugleich Waldgeschichte von Mainfranken,1934.
- + Heimatbilder aus Oberfranken,Volkskundliche Vierteljahresschrift,1914/15.
- + Über die Tierwelt Oberfrankens.
- + Natur- und Heimatkundliches aus dem Bezirk Lichtenfels,1912.
- + Vorschläge zur Verbesserung und Ausnützung der Wiesen auf der hohen Rhön,1908.

- + Altes und Neues aus der bayerischen Rhön, 1914.
- + Weidewirtschaftliche Beobachtungen in Bayern, 1911.
- + Allerlei aus der Hochrhön, 1915.
- + Gewinnung des Stickstoffes und Herstellung von Salpeter aus dem Stickstoff der Luft.
- + Über die Schädlichkeit und Unschädlichkeit von mit Bordeauxer Brühe bespritzten Weinblättern, 1906.
- + Vorsicht beim Verfüttern des Kartoffelkrautes, sowie Bemerkungen über die hiesige Kartoffelernte, 1911.
- + Kryptogamen aus Bayern.
- + Merkblatt über die Bekämpfung der Erdraupe, 1916.
- + Kriegsfütterung der Haustiere, 1917.
- + Beitrag zur Kriegsfütterung der Haustiere, 1917.
- + Bemerkungen über die oberfränkische Schafzucht im Allgemeinen und das fuchsköpfige Frankenschaf im Besonderen, 1912.
- + Von der Pflanzenwelt des Kahlgrundes, 1930.
- + Unterfränkische Frühlingsblumen, 1930.
- + Besprechungen über F r. P e t r a k, Pilze und Pflanzenkrankheiten, 1927.
- + Dianthus Arpadianus ADE et BORN. nov. spec. mit Tafel, 1936.
- + A. A d e u. K. H. R e c h t e r: Samothrake, 1936.
- + Das Vorkommen atlantischer Pflanzen im Spessart, 1937.
- + A. A d e u. F. K o p p e: Beitrag zur Kenntnis der Moosflora der atlantischen Inseln und der pyrenäischen Halbinsel.
- + Unterfranken im Frühlingsschmuck, 1929.
- + A. A d e u. A. S c h u h m a c h e r - W a l d b r ö h l: Neue Rubuskreuzungen aus dem Bergischen XX, 1932.
- + Geum montanum in der Rhön, 1924.
- + Bemerkenswerte Pilze, Kryptogamische Forschungen, 1929.
- + Alpendohlen schaffen den Nährboden für ein seltenes Moos, 1921.
- + Die Hochweiden der Rhön, 1908.
- + Schilderung der Sommerweide für Ziegen auf dem Berg der Niestener Schloßruine bei Weismain, 1914.
- + Die Pflanzenwelt des Kahlgebietes und der Umgebung von Heigenbrücken, 1942.
- + Ein neuer Florenbürger Deutschlands, 1936.
- + Beiträge zur Kenntnis der Flora Mainfrankens, 1941/1943.
- + Besprechung von Dr. J o h. B r u b y, Brunn. Die Brombeere der Sudeten-Karpathengebiete, 1943.
- + Leben und Wirken des Forschers und Arztes Dr. H. S t a d l e r, 1950.
- + Siehe auch Literaturverzeichnis dieses Beitrages Nr. 01-10, Seite 51.

Auch in Beiträgen anderer Autoren sind seine Forschungen beinhaltet. So die Bearbeitungen der Gattung Rubus in V o l l m a n n, 1914 und in K. u. F. B e r t s c h, 1933. "Der Kalmut", 1925, enthält eine große Anzahl Ade'scher Angaben. U. a. veröffentlichten H. R e h m, F r. P e t r a k, v. H ö h n e l in ihren mykologischen Beiträgen viele von A d e gesammelte Pilze als neue Arten. Seine Forschungen über die Laub- und Lebermoose sind in Beiträgen von F a m i l l e r, 1912, zu finden. Letztlich hat er selbst, oder zusammen mit anderen Wissenschaftlern, einige Pilzarten neu beschrieben (siehe Seite 46).

In der Literatur zitierte Funde A d e s, die nach 1945 auch von uns gemacht wurden.

I = Laufende Nummer, II = Pilzart, III = Kürzel des Fundortes, IV = Nummer der Literatur.

Klasse Ascomycetes (Schlauchpilze)

I	II	III	IV
01)	Actidium nitidum(ELLIS)ZOGG als Bulliardella sphaerioides(KARST.)REHM	We	21
02)	Diaporthe sarothamni(AÜERSW.)REHM als D.genistae ADE	Bd	2
03)	Gloniopsis curvata(FR.)SACC. als Hysterographium biforme SACC.	We	21
04)	Glonium lineare(FR.)de NOT.	We	21
05)	(?) Godronia cerasi als Dermatea cerasi(PERS.)de NOT.	We	21
06)	Hypoderma virgultorum DC. als H.comune f.rubi(P.)DC.	We	21
07)	Hysterium angustatum ALB.& SCHW.	We	21
08)	- pulicare PERS. als H.alneum	We	21
09)	Lasiostictis fimbriata SCHW.	We	21
10)	Lophodermium arundinaceum(SCHRAD.)CHEV.	Ak	21
11)	Lophium mytilinum(PERS.)FR.	We	21
12)	Mollisia arundinacea(DC.)PHILL.	Ak	22
13)	- benesuada(TUL.)PHILL.	We	22
14)	- culmina(SACC.)REHM	We	22
15)	- lycopodia LE BRET & MALBR.	Ma	22
16)	Naemacyclus niveus(PERS.)SACC.evt.N.minor BUTIN	We	21
17)	Pezicula frangulae(FR.)FUCK. als Dermatea versiforme	We	21
18)	Saccobolus bekkii HEIMERSL.	Mr	11
19)	- glaber(PERS.per PERS.)LAMB.	We	11
20)	Tapesia cinerella REHM	We	22
21)	- lividofusca(FR.)REHM	Kr	22
22)	- rosae(PERS.)FUCK.	Bk	22
23)	Tympanis pinastri var.picea FR.	We	21

Klasse Basidiomycetes (Ständerpilze) - Ordnung Agaricales (Blätterp.)

24)	Amanita caesarea SCOP.(leg.Brückner,Zang,Kießling)As,La,Ps	09
25)	- strobiliformis(VITT.)QUEL. als A.solitaria BULL.	We 09
26)	Chamaemyces fracidus(FR.)DONK als Lepiota polysticta B.Gk	09
27)	Cortinarius caesiocyaneus BRITZ. als Phlegmacium caerulescens FR.f.caesiocyaneum(B)K.	Wn 04
28)	- delibutus FR. als Myxarium delibutum FR./Eh,Gr,We	05
29)	- orellanus (FR.)FR. als Dermocybe o.FR. Bu,Ws	10
30)	Leucocortinarius bulbiger(ALB.& SCHW.ex FR.)SING. Eh,Bu	09
	als Armillaria bulbiger ALB.& SCHW.	
31)	Paxillus panuoides FR.	Ge 08
32)	Tricholoma aurantium(SCHFF.ex FR.)RICKEN als Armillaria aurantia SCHFF.	?We 09
33)	- fucatum FR.	Kl 09
34)	- pardinum QUEL. als T.tigrinum SCHFF.	We 09
35)	Xerula pudens(PERS.)PERS. als Collybia longipes BULL.	Gk 10

Nachstehend einige Ascomyceten-Neubeschreibungen A d e s
aus "Mykologische Beiträge" in HEDWIGIA Bd. LXIV: 286 - 320, 1923.

9. *Pleosphaeria polygalincola* Ade.

Fruchtkörper dicht herdenweise oder auch mehr einzeln, anfangs eingesenkt, dann hervorbrechend und zuletzt freiwerdend, kugelig, mit kurzem, zylindrischen, oft knotigem und stumpf endenden Schnabel, von 0,3—0,45 mm Durchmesser. Der Schnabel ist 0,15 bis 0,2 mm lang und 0,15 mm dick. Gehäuse lederig kohlig, matt-schwarz, etwas rauh, besonders gegen den Grund mit kurzen Borsten. Diese Borsten sind einzeln stehend, am Ende oft stumpflich oder kurz knopfförmig abgerundet, einzellig oder wenigzellig septiert, gelb, rauh, 3—5 μ breit, 30—50 μ lang. Membran des Gehäuses schwarzbraun, parenchymatisch mit 6—8 μ großen Zellen. Schläuche zylindrisch, 8sporig, 100—138 μ lang, 10—11 μ dick; mit 9—13 μ langem und 4—5 μ dickem Stiel, und mit 1,5 μ dicker Wandung, die an der abgerundeten Spitze bis auf 3 μ verdickt ist. Schlauchporus mit Jod nicht bläugend. Sporen elliptisch, 19—22 μ lang und 6,5—9 μ dick, beiderseits abgerundet verschmälert, erst grünlich, dann bräunlich, gerade oder schwach gekrümmt, mit 4—5 Querscheidewänden, an diesen etwas eingeschnürt und 2 Längswänden. Paraphysen farblos, fädig, ästig, septiert, die Schläuche überragend. Am Grunde der Fruchtkörper finden sich einzelne farblose, septierte, gekrümmte, 3 μ breite Myzelhyphen.

Wächst auf dem verholzten Wurzelstocke von *Polygalum chamaebuxus* über Jurakalk im obern Wiesenttal bei Wiesentfels in Oberfranken. August 1909.

Wurde von Rehm in litt. vom 30. 1. 1911 als neue Art zu *Teichospora* gestellt, gehört jedoch wegen der deutlichen, borstlichen Behaarung zu *Pleosphaeria* Speg.

22. *Eutypella Lycii* Ade.

Stromata zerstreut stehend, aus querstehender, elliptischer Basis niedergedrückt kegelig und stumpf pustelförmig, dem Holze aufsitzend, das festhaftende, aufgetriebene Rindengewebe durchbrechend, 1,2—3 mm breit, schwärzlich, aus der wenig veränderten Holzsubstanz gebildet, nach dem Zerreißen der Rinde freiwerdend und schließlich herausragend. Fruchtkörper 5—30 in einem Stroma ordnungslos und sehr dicht zusammengedrängt, zusammenneigend, fast kugelig, 0,25—0,32 mm Durchmesser, mit ca. 0,8—0,9 mm langen, zusammendrängenden und teilweise oft büschelig vereinigten Hälben; die Mündungen auseinandertretend, drei- bis fünffüchrig oder stumpf abgerundet, tiefschwarz glänzend und das Stroma überragend. Schläuche schmal länglich keulig, ziemlich dünnwandig, sehr lang gestielt, 8sporig, im sporentragenden Teil 30—44 μ lang, 4,5—6,5 μ breit, Stiel 13—22 μ lang, 1,5 μ breit. Sporen zweireihig, zylindrisch, stark gekrümmt, farblos, 5,5—11 μ lang, 1,5—2 μ breit, besonders an den abgerundeten Enden öfters mit Öltröpfchen; Paraphysen rasch zerfließend, kürzer als die Schläuche, fadenförmig, farblos, 1 μ dick. Jod bläut den Schlauchporus nur undeutlich an einer breit quadratischen Stelle des stumpflich zugespitzten Schlauchendes. Gewebe des Gehäuses mehrschichtig, engzellig prosenchymatisch (plektenchymatisch), lederig-kohlig, die innerste Schicht fast farblos, nach außen dunkelbraun gefärbt, mit bräunlichen, ästigen, 2—3 μ breiten Hyphen in das Stroma verwachsen und dadurch schwärzlich verfärbend.

An abgefallenen, dünnen Zweigstücken von *Lycium europaeum* zu Neuses am Main, Bezirk Lichtenfels in Oberfranken. 28. 6. 1907.

Wurde von Rehm in litt. 16. 7. 1911 als neue Art zu *Diatrype* gestellt, ist aber wegen der Beschaffenheit des Stromas eine typische *Eutypella*-Art.

23. *Diaporthe Genistae* Ade.

Stroma fleckenförmig, oft wenig deutlich, seltener ausgebreitet, undeutlich abgegrenzt, das Substrat kaum verändernd oder mehr oder weniger schwärzend. Das überlagernde Periderm wird meist schwärzlich verfärbt, jedoch nicht abgestoßen, nur um die eingesenkten Fruchtkörper warzig aufgetrieben. Fruchtkörper kugelig, 0,3—0,4 mm groß, zerstreut, meist ziemlich gleichmäßig verteilt in der innersten Rindensubstanz nistend oder mit dem Grunde in Holz

ingesenkt. Das Periderm wird pustelförmig aufgetrieben und von den hervorragenden, spitz kegeligen, oft knotig verdickten, bis 0,35 mm langen und 0,1—0,16 mm breiten schwarzen Schnäbeln durchbohrt. Schläuche fast zylindrisch oder schmal spindelig-keulenförmig, sitzend, 8sporig, 33—42 μ lang und 4,5—6,5 μ breit. Sporen meist 2reihig, spindelförmig, beiderseits zugespitzt, gerade oder schwach gekrümmt, mit meist 4 Öltröpfchen und durch 1—3 Querscheidewände 2—4zellig, in der Mitte nicht eingeschnürt, fast farblos, 10—13 μ lang, 2—2,5 μ breit. Schlauchporus mit Jod nicht bläugend.

An abgestorbenen Zweigen von *Genista tinctoria*, am Waldrande zu Baiersdorf bei Weismain. 24. 12. 1909.

Rehm in litt. vom 3. 1. 1910 bezeichnet diese Art als *Diaporthe Surothamni* var. *Genistae* nov. var., die aber vielleicht besser als neue Art abgetrennt würde, nachdem nach keine entsprechende Art an *Genista* beschrieben sei.

Die kleineren Schläuche und Sporen unterscheiden diese Art hinreichend von *D. Surothamni* (Auersw.) Nitschke.

38. *Plicaria hygrophila* nov. sp.

Apothecien einzeln, sitzend, zuerst kugelig geschlossen, rundlich sich öffnend und die schüsselförmige, verbogene, anfangs berandete, schließlich unberandete, graue Fruchtscheibe entblößend, außen dunkler graubraun, glatt, bis 5 mm breit, fleischig. Schläuche zylindrisch-keulig, oben abgerundet, 165—240 μ lang, 13—16,5 μ breit, hiervon 65—100 μ Länge auf den Stiel treffend, 8sporig. Jod bläut die Schlauchspitzen. Sporen stumpfelliptisch, ohne Öltröpfchen, farblos, 17—20 μ lang, 8,5—10 μ breit, schief einreihig liegend; Epispor sehr feinwellig rauh. Paraphysen fädig, 1,5 μ breit, nach oben bis 2,5 μ breit, farblos. Gehäuse paraplechtenchymatisch, mit schwach gelblichem Grunde.

Über Algenfäden auf von kalkhaltigem Wasser überflutetem Eichenholze sitzend.

Weihersmühle bei Weismain. 23. 7. 1909.

Besonders die Form der ganz farblosen Paraphysen, die sich nur bis auf 2,5 μ (statt auf 9 μ) verbreitern, veranlaßt mich, vorliegenden Pilz als eigene Art zu beschreiben. Ob die Sporen von der nahestehenden *Pl. septatra* Cooke tatsächlich Öltröpfchen besitzen, scheint nach den widersprechenden Angaben der Autoren (vgl. Rabenhorst-Rehm I, 3, S. 1002) noch ungeklärt. Von *Plicaria cervina* Phil. ist der Pilz besonders durch die größeren Sporen verschieden.

47. *Mollisia lignicola* Phill. f. *rivularis* nov. f.

Apothecien zerstreut oder dicht herdenförmig gedrängt, sitzend, zuerst kugelig geschlossen, nach unten verschmälert, rundlich sich öffnend, die krug-, dann schüsselförmige, zartberandete, später ziemlich flach ausgebreitete und verbogene, rötlichbraune Fruchtscheibe entblößend, durchscheinend blaßbraun, 0,2—1,2 mm breit, wachsartig. Schläuche zylindrisch, keulig, nach abwärts verschmälert, oben abgerundet, 36—45 μ lang, 5—7 μ breit, 8sporig; Sporen länglich spindelförmig, gerade, einzellig, farblos, 6—8 μ lang, 3,5—4 μ breit, glatt, einreihig oder im oberen Teil unregelmäßig 2reihig liegend; Paraphysen die Schläuche nicht überragend, fädig, farblos, septiert, nach oben 2—3 μ breit. Gehäuse parenchymatisch, farblos bis blaßbräunlichgelb, mit gegen den Rand verlängerten Zellreihen.

Auf Kiefernholz unter fließendem, kalkhaltigem Wasser. Försternmühle bei Weismain. 24. 7. 1909.

Ist von *Mollisia lignicola* Phil. besonders durch die rötlichbraune Farbe der Fruchtscheibe und durch breitere Sporen verschieden; ist wohl nur eine durch das Leben im Wasser beeinflusste Abart.

Auflistung von Pilzarten, die in jüngerer Zeit (nach 1945) von uns nicht aufgefunden wurden (Stand 31.12.1985). Als Finder (leg.) kommen insbesondere A d e, S o l l m a n n und S t a u d e in Frage.

Nach den heutigen Erkenntnissen werden sich die nachfolgend genannten Arten nicht immer als gültig erweisen. Einige davon dürften Synonyme sein. Im Augenblick bin ich jedoch nicht in der Lage, alles zu überprüfen, so daß mit einer Revidierung mancher Artnamen zu einem späteren Zeitpunkt gerechnet werden kann.

Am Schluß dieses Beitrages werden auch Arten genannt, die im Moment nicht deutbar sind (insbesondere B r i t z e l - m a y r s c h e Beschreibungen).

I = Laufende Nummer, II = Kürzel der Finder (leg.) bzw. der Autoren.: Ad = A d e, La = L a n g f e l d e r, Ro = R o h n - f e l d e r, So = S o l l m a n n und ST = S t a u d e.

III = Artnamen, IV = Fundorte, V = Literatur (siehe Seite 51/52).

I	II	III	Fund- jahr:	IV	V
<u>Klasse Ascomycetes</u> (Schlauchpilze)					
001)	Ad	Apostemidium guernisaci(CROUAN)BOUD.	v.1912	We	21
002)	Ad	Ascobolus roseopurpureus REHM	1912	Bk	11
003)	Ad	Beloniella gali veri KARST.	v.1912	We	21
004)	Ad	Belonium apocryptum REHM	1911	We	21
005)	Ad	- foveolare REHM	1912	Kd	02
006)	Ad	Cenangella fusco-pallida REHM	v.1912	We	21
007)	Ad	Cenangium myricariae REHM	v.1912	We	21
008)	Ad	- populneum(PERS.)TUL.	v.1912	We	21
009)	Ad	- salicellum v.HÖHNEL	v.1912	We	21
010)	Ad/La/So	Coccomyces coronatus(SCHUM.)de NOT	v.1912	We/Kz/Co/21	
011)	Ad	Colpoma callunæ REHM	v.1912	We	21
012)	Ad	- crispum(PERS.ex FR.)SACC.	v.1912	We	21
013)	Ad	Cryptodiscus rhopaloides SACC.	v.1912	We	21
014)	Ad	Didymella alectorolophi REHM	1907	Kz	02
015)	Ad	Ephelina phyteumatis(FUCK.)REHM	v.1912	We	21
016)	Ad	Eutypella lycii ADE	1907	Nm	02
017)	Ad	Godronia radulicola(FUCK.)REHM	v.1912	We	21
018)	St	Helvella leucopus PERS. als H.monachella	v.1856	Of	26
019)	Ad	Hyalinia strobilicola REHM	1909	Is	02
020)	So	Hypoxyton effusum NITSCHKE	v.1867	Wi	18
021)	Ad	Hysterographium mori(SCHW.)REHM als H.australe DUBY	v.1912	We	21
022)	Ad	Hysteropatella elliptica f.divergens REHM	v.1912	We	21
023)	Ad	- prostii(DUBY)REHM	v.1912	We	21
024)	Ad	- var.conorum REHM	v.1912	We	21
025)	Ad	Lasiobelonium torrentium ADE & REHM	1909	Wm	02
026)	Ad	Lophidiopsis balsamianum(CES.& de NOT.)SACC.	1911	We	20
027)	Ad	- caulicum(FR.)CES.& de NOT.	v.1911	Bk	20
028)	Ad	- desmazierii SACC.& SPEG.	v.1911	We	20
029)	Ad	- exipuliforme(FR.)CES.& de NOT.	v.1911	We	20
030)	Ad	- macrostomoides de NOT.	v.1911	We	20
031)	Ad	- nuculoides REHM	v.1911	We	20
032)	Ad	- quadrinucleatum KARST.	v.1911	Bk	20
033)	Ad	- crenatum(PERS.)SACC.	v.1911	We	20
034)	Ad	- f.hedera FUCK.	v.1911	We	20
035)	Ad	- nucula(FR.)SACC.	v.1911	We	20
036)	Ad	- var.emergans KARST.	v.1911	We	20
037)	Ro	- praemorsum(LASCH)SACC.	v.1911	Lf	20
038)	Ad	- vagabundum f.oenotherae ELL.& EV./-		We	20
039)	Ad	Mollisia atrata(PERS.)KARST.	v.1914	We	22
040)	Ad	- cinerea f.obscura ATARB.	v.1914	We	22

			Fund-	
I	II	III	jahr:IV V	
041)	Ad	Mollisia cinerea f. sublividula (NYL.) KARST.	v.1914	We 22
042)	Ad	- lignicola f. rivularis ADE	1909	We 02
043)	Ad	- revincta f. albidula REHM	v.1914	Bk 22
044)	Ad	- - .polygonati REHM	v.1914	We 22
045)	Ad	Mytilidion decipiens (KARST.) SACC. als M. tortile (SCHW.) SACC.	v.1912	We 21
046)	Ad	Niptera phaea REHM	v.1914	We 22
047)	Ad	- ramicola REHM	v.1914	Ak 22
048)	Ad	- submelaena REHM	v.1914	We 22
049)	Ad	Occelaria philopsis REHM	v.1912	Ma 21
050)	Ad	Ophiobolus tenellus AUERSW.	1907	Kh 21
051)	Ad	Orbilbia vitalbae REHM	1912	We 02
052)	Ad	Pezicula betulae REHM	v.1912	We 21
053)	Ad	- rosae SACC.	v.1912	We 21
054)	Ad	Phaeoderris caespitosa (NIESSL) v. HÖHNEL	v.1912	We 21
055)	Ad	Platystonium compressum (PERS.) TREV.	v.1911	We 20
056)	Ad	- thyrioides SACC.	v.1911	We 20
057)	Ad	Pleosphaeria polygalincola ADE	1909	Ws 02
058)	Ad	Pleospora punctiformis NIESSL	1907	Ma 02
059)	Ad	Plicaria hygrophila ADE	1909	Wm 02
060)	Ad	Propolis faginea (SCHRAD.) KARST.	v.1912	We 21
061)	Ad	- - f. strobilina DESM.	v.1912	We 21
062)	Ad	Pyrenopeziza nigrella FUCK.	v.1912	We 21
063)	Ro	Roberga cubicularis (FR.) REHM als R. unica DESM.	v.1912	Co 21
064)	Ad	Schizoxylon immersum PASS.	v.1912	We 21
065)	Ad	Stictis mollis PERS.	v.1912	We 21
066)	Ad	- radiata PERS. als S. exavata (H.) R.	v.1912	Wm 21
067)	Ad	- stellata WALLR.	v.1912	We 21
068)	Ad	Trichobelonium kneiffii (WALLR.) SCHROET.	v.1914	We 22
069)	Ad	Tryblidium calyciforme REBENT. ex PERS.	v.1912	We 21
070)	Ad	- melaxanthum (FR.) SCHROET.	v.1912	Rg 21
071)	So	Valsa cypri (TUL.)	v.1867	Co 18
072)	So	- eutypa (ACH.)	v.1867	Co 18
073)	So	- maurioides NITSCHKE	v.1867	Co 18
074)	So	- melipunctata (GREV.) = V. populina (P.)	v.1867	Co 18
075)	So	- protracta (PERS.)	v.1867	Co 18
076)	Ad	Velutaria cinereofusca (SCHW.) BRES.	v.1912	We 21
077)	Ad	- rufo-olivacea f. crategi P. HENN.	v.1912	We 21
078)	Ad	Xylographa (ACH.) FR. = evt. (?) Lichens	v.1912	We 21

Zunächst die Substrate, an denen die vorgenannten Arten gefunden wurden:

001) Alnus sp., Holz im Wasser - 002) Dung - 003) Galium silvaticum - 004) am Rhizom von Sesleria varia - 005) Geschwätzte Kalksteinplatten - 006) Salix fragilis - 007) Tamarix sp. - 008) Corylus av. + Populus tremula - 009) Salix fragilis - 010) Fagus-Blätter - 011) Calluna vulgaris - 012) Larix-Äste - 013) Clematis vitalba - 014) an vorjährigen Stengeln von Alektorolophus angustifolius - 015) an Phyteuma (Teufelskralle) - 016) Lycium europaeum - 017) Betula alba - 018) sandige submontane Wälder - 019) Zapfen von Pinus silvestris - 020) Salix sp. - 021) Acer campestre und Prunus spinosa - 022) entrindetes Holz von Salix fragilis - 023) Juniperus communis-Stumpf - 024) Zapfen von Pinus silvestris - 025) Quercus sp. - 026) Tilia sp. - 027) Artemisia campestre - 028) Lonicera xylosteum - 029) Tilia sp. - 030) Populus sp. - 031) Populus sp. und Salix sp. - 032) Uferbalken am Main - 033) Walnußschale - 034) Hedera helix - 035) Acer campestre - 036) Ribes alpinum - 037) Rubus idaeus - 038) Scrophularia alata - 039) Men-
tha aquatica und Valeriana officinalis - 040) Pinus u. Quercus sp.-

041) Pinus silvestris-Zapfen - 042) Holz von Pinus silvestris im fließenden Wasser - 043) Hypericum perforatum - 044) Tanacetum vulgare und Lasernitium sp. - 45) Pinus silvestris - 46) Juncus effusus - 47) Alnus sp. - 48) Scirpus silvaticus - 49) Ast von Pinus silvestris - 50) Alektorolophus angustifolius - 51) In Furchen der Rinde von Clematis vitalba - 52) Ast von Betula sp. - 53) Rosa canina und R.cinnamomea - 54) Artemisia campestris - 55) Crataegus sp., Prunus cerasus, Syringa sp., Salix sp. - 56) Quercus robur - 57) An Wurzelstock von Polygalum chamaebuxus - 58) Halm von Brachypodium silvaticum - 59) Holz von Quercus sp. - 60) Ästchen von Rosa sp. - 61) Zapfen von Pinus silvestris - 62) Stachys germanica - 63) Rhamnus cathartica - 64) An Ranken von Clematis vitalba - 65) Syringa sp. - 66) Corylus avellana und Ribes alpinum - 67) Scrophularia sp. - 68) Phragmites communis - 69) Auf alter Rinde von Quercus sp. - 70) Abies excelsa - 71) An Ligustrum vulgare - 72) An abgestorbenen Zweigen von Acer pseudoplatanus, Fagus sp., Populus sp. und Prunus spinosa - 73) An Zweigen von Salix sp. - 74) An abgestorbenen Zweigen von Populus tremula - 75) An abgestorbenen Zweigen von Acer campestre - 76) Cornus sp., Prunus spinosa und Quercus sp. - 77) Crataegus oxyacantha - 78) Pinus silvestris.

I II III

Fund- IV V
jahr:

Klasse Basidiomycetes (Ständerpilze) - Ordnung Aphyllophorales
(Nichtblätterpilze)

- | | | | |
|------|--|------------|-------|
| 079) | St Boletopsis leucomelaena(PERS.ex PERS.)F. | v.1856 | Bb 26 |
| | als Polyporus subsquamosus | | |
| 080) | St Clavulinopsis corniculata(FR.)CORNER | v.1856 | Rg 26 |
| | als Clavaria muscoides | | |
| 081) | St Hydnellum compactum(PERS.ex FR.)KARST. | v.1856 | Of 26 |
| | als Hydnum compactum | | |
| 082) | St Lenturia mucida(FR.)CORNER, als Clavaria m. | v.1856 | Bb 26 |
| 083) | St Ramaria gracilis(FR.)QUEL., als - | g., v.1856 | Gs 26 |

- Ordnung Boletales (Röhrlinge)

- | | | | |
|------|-------------------------------------|--------|-------|
| 084) | St Boletus pachypus (?) ss.SECRETAN | v.1856 | Ah 26 |
|------|-------------------------------------|--------|-------|

- Ordnung Agaricales (Blätterp.)

- | | | | |
|------|--|--------|-------------------|
| 085) | Ad Armillaria luteovirens(ALB.& SCHW.ex FR.)G. | 1907 | Ww 09 |
| 086) | Ad/St Cathathelasma imperiale(FR.)SING. als | 1908 | En 09 |
| | als Armillaria imperiale FR. und als | | |
| | Agaricus biarmillatus ss.STAUDE | 1843 | Bb, Co 26 |
| 087) | St Collybia porrea(PERS.ex FR.)SING. | v.1856 | Bb, Gs 26 |
| | als Agaricus porreus | | |
| 088) | Ad Cortinarius balausticus FR. | 1908 | Kl 06 |
| | als Telamonia sporadica BRITZ. | | |
| 089) | Ad - illibatus FR. als C.fulvoluteum B.? | | Bu, Gr 05 |
| 090) | St - nitidus(SCHFF.ex FR.)FR. | v.1856 | Bb 26 |
| | als Agaricus nitidus | | |
| 091) | St - ochroleucus(SCHFF.ex FR.)FR. | v.1856 | Bb, Cb 26 |
| | als Agaricus ochroleucus | | |
| 092) | Ad - odorifer BRITZ. | v.1912 | Ge, Gö, Kt, We 05 |
| | als Phlegmacium odorifer | | |
| 093) | St - prasinus FR.ss.LGE. | v.1856 | Bb |
| | als Agaricus prasinus | | |

094)	St	Cortinarius scaurus FR., als Agaricus s.	v.1856	Bb	26
095)	St	- subfulgens ORTON	v.1856	Ww	26
		als Agaricus fulgens			
096)	St	- violaceo-cinereus(PERS.ex FR.)FR.	v.1856/Co	26	
		als Agaricus violaceo-cinereus			
097)	Ad	Lepiota parvannulata LASCH	v.1912	Is	09
098)	St	Leptoglossum tremulum(SCHFF.ex FR.)SING.	v.1856	Bb	26
099)	Ad	Lyophyllum infumatum(BRES.)KÜHN.	v.1912	Fj	09
		als Tricholoma adscriptum BRITZ.			
100)	St	Mycena atrocyanea(BATSCH ex FR.)GILL.	v.1856	Bb	26
		als Agaricus atrocyaneus			
101)	St	Tricholoma bufomium(PERS.ex FR.)GILL	v.1856	Bb	26
		als Agaricus bufomius			
102)	St	- luridum(SCHFF.ex FR.QUEL.	v.1856	Bb, Ww	26
		als Agaricus luridus			
103)	St	- robustum(A. & S.ex FR.)RICKEN	v.1856	Co	26
		als Agaricus robustus.			

Die nachstehend aufgeführten Arten sind nicht sicher zu deuten:

Collybia stipitaria FR.(= Agaricus scabellus A. & SCHW.), evt. könnte nach der Beschreibung Grinipellis stipitaria(FR.)PAT. in Frage kommen (Ade) - Coprinus subacaulis ADE - Cortinarius psammophilus ADE - Hydnum adustum (Staude) - Inoloma recensitum BRITZ. - Lepiota friesii LASCH - L. polysticta BRITZ. - Myxarium politulum BRITZ. - Phlegmacium disputabilis BRITZ. - Ph. largiusculum BRITZ. - Pleurotus pometi FR. - Telamonia definiendus BRITZ. - T. reffectus BRITZ. - T. sportaica BRITZ. - Tricholoma deliberatum BRITZ. - T. enudatum BRITZ. und Velocoprinus albofasciatus ADE, alle A d e.

Fundorte, - Kürzel - Fundort - MTB-Nr.: + (C) Kreis Coburg - (L) Lichtenfels

Ah	Ahorn (C)	5731	Kr	Kronach (K) = Kr. Kron.	5733
Ak	Altenkunstadt (L)	5833	Kt	Köttel (L)	5932
As	Altenstein (C)	5730	Kz	Kleinziegenfeld (L)	5933
Bb	Bausenberg (C)	5732	La	Lahm/Itzgrund (C)	5831
Bd	Baiersdorf (L)	5833	Lf	Lichtenfels (L)	5832
Bi	Bieberbach (C)	5732	Ma	Maineck (L)	5833
Bk	Burgkunstadt (L)	5833	Mk	Main Klein (L)	5833
Bn	Buchenrod (C)	5831	Mr	Mainroth (L)	5833
Br	Brand (C)	5731	Nc	Neustadt b. Coburg (C)	5632
Bu	Burckersdorf (L)	5833	Nk	Neukirchen (C)	5631
Bx	Brüx (C)	5632	Nm	Neuses a. Main (L)	5833
Cb	Callenberg (C)	5731	Of	Oberfüllbach (C)	5732
Co	Coburg (C)	5731	Ol	Oberlauter (C)	5631
Eb	Eichberg (C)	5732	Pl	Plesten (C)	5732
Ec	Ebersdorf b. Coburg (C)	5732	Ps	Presseck (Kulmbach)	5735
En	Ebneth (L)	5833	Rb	Rohrbach (C)	5732
Fi	Finkenau (C)	5731	Rg	Rögen (C)	5732
Fj	Frankenjura (L)	(?) 5933	Rp	Rappoltengrün (Kron.)	5533
Ge	Geutenreuth (L)	5933	Rt	Rödental (C)	5632
Gk	Giechkröttendorf (L)	5933	Sd	Seidmannsdorf (C)	5732
Gö	Görau (L)	5933	Sf	Scheuerfeld (C)	5731
Gr	Gärtenroth (L)	5834	Wa	Wüstenahorn (C)	5731
Gs	Garnstadt (C)	5732	We	Weismain (L)	5933
Hs	Hohenstein (C)	5731	Wf	Weißbrunn a. Forst (C)	5831
Ig	Itzgrund (C)	5831	Wi	Wiesenfeld	5731
Is	Isling (L)	5833	Wm	Weihersmühle (L)	5933
Kd	Kordigast (L)	5833	Wn	Weidnitz (L)	5833
Kh	Klosterlangheim (L)	5832	Ws	Wohnsig (L)	5933
Kl	Kirchlein (L)	5833	Wt	Wiesentfels (Bayreuth)	6033
			Ww	Weißbrunn v. Wald (C)	5631
			Zd	Zedersdorf (C)	5732

Literatur

- 01 Ade, A. (1911) - 'Beiträge zur Pilzflora Bayerns II. Für Bayern neue Hymenomyceten.' Mitt. der Bayer. Bot. Ges. zur Erforschung der heimischen Flora, Bd. 211, Nr. 21: 369 - 373.
- 02 - (1923) - Mykologische Beiträge. In Hedwigia, Bd. LXIV: 286 - 320.
- 03 - (1923) - 'Ein eßbarer Frühlingspilz'. In ZfP, Bd. 7: 200.
- 04 - (1929) - 'S. Killermann, Pilze aus Bayern, III. Teil,' ZfP, Bd. 13: 146 - 150.
- 05 - (1929) - 'S. Killermann, Pilze aus Bayern, III. Teil,' 1. Forts., Bd. 13: 172 - 173. (ZfP)
- 06 - (1930) - 'S. Killermann, Pilze aus Bayern, III. Teil,' 2. Forts., Bd. 14: 13 - 15. (ZfP)
- 07 - (1930) - 'S. Killermann, Pilze aus Bayern, III. Teil,' 3. Forts., Bd. 14: 24 - 26. (ZfP)
- 08 - (1930) - 'S. Killermann, Pilze aus Bayern, III. Teil,' Schluß, Bd. 14: 37 - 42. (ZfP)
- 09 - (1936) - 'S. Killermann, Pilze aus Bayern, V. Teil,' Leucosporae, I. Abt., Bd. 20: 97 - 101. (ZfP)
- 10 - (1937) - 'S. Killermann, Pilze aus Bayern, V. Teil,' Leucosporae, I. Abt., Bd. 21: 1 - 3. (ZfP)
- 11 Brummelen, v. J. (1967) - A World-Monograph of the Genera *Ascobolus* & *Saccobolus*. In Persoonia.
- 12 Burgeff, H. (1969) - Vereinsnachrichten für das Jahr 1968. 'Nachruf für Dr. Alfred Ade'. In Abb. Naturw. Ver. Würzburg, Bd. 10: 167 - 169.
- 13 Cléménçon, H. (1981) - 'Kompendium der Blätterpilze. I. Collybia.' In ZfP, Bd. 47 (1): 5.
- 14 Dennis, R. W. G. (1963) - British Ascomycetes. Lehre.
- 15 Heinisch, G. (1974) - 'Die 4 Wegbereiter des unterfränkischen Naturschutzes: Prof. Dr. Burgeff, Dr. Ade, Dr. Stadler, Cornel Schmitt.' In Wbg., Univ., Erz. Wiss. Fak., Seminararbeit 1973.
- 16 Krieglsteiner, G. J. et al. (1985) - 'Über neue, seltene, kritische Makromyceten in der B R Deutschland VI.' In ZfM Bd. 51(1): 95.
- 17 Krombholz, v. J. V. (1831) - Naturgetreue Abbildungen und Beschreibungen der eßbaren, schädlichen und verdächtigen Schwämme.
- 18 Nitschke, Th. (1867) - PYRENOMYCETES GERMANICI. Berlin
- 19 Rehm, A. (1896) - Ascomyceten: Hyseriaceen und Discomyceten. In Rabenhorst, L.: Die Pilze Deutschlands, Österreichs und der Schweiz I, III. Abt. Leipzig.
- 20 - (1911) - 'Zum Studium der Pyrenomyceten.' In Annales Mycologici, Vol. IX, Nr. 1: 94 - 111.

- 21 Rehm, H. (1912) - 'Zur Kenntnis der Discomyceten Deutschlands, Deutsch-Österreichs und der Schweiz.' In Ber. der Bayer. Bot. Ges. in München, Bd. XIII: 102 - 106.
- 22 - (1914) - 'Zur Kenntnis der Discomyceten Deutschlands, Deutsch-Österreichs und der Schweiz.' In Ber. der Bayer. Bot. Ges. in München, Bd. XIV: 85 - 103.
- 23 Schaeffer, J. C. (1762 - 1774) - *FVNGORVM qui in BAVARIA et PALATINATV circa RATISBONAM NASCVNTVR I CONES, Nativis coloribus expressae.* Regensburg.
- 24 Schieferdecker, K. (1954) - Die Schlauchpilze der Flora von Hildesheim. Hildesheim.
- 25 Sollmann, A. (1862) - Anleitung zum Bestimmen der vorzüglichsten eßbaren Schwämme Deutschlands. Hildburghausen.
- 26 Staude, F. (1856 u. 1858) - Die Schwämme Mitteldeutschlands. Gotha.
- 27 Winter, G. (1887) - Ascomyceten: Gymnoasceen und Pyrenomyceten. In Rabenhorst, L.: Die Pilze Deutschlands, Österreichs und der Schweiz, II. Abt. Leipzig.

Danksagung

Für die Mithilfe und Unterstützung in vielfältiger Form, so Beschaffung spezieller Literatur, Einsichtnahme in Standardwerke der Mykologie, sowie Auskunft über persönliche Daten darf ich herzlichst **folgenden** Herren und Institutionen danken!

Dr. Aumann, Georg; Naturkundemuseum Coburg
Conrad, Fritz; Randersacker
Fiedler, Walter; Universitätsbibliothek Würzburg
Härthel, Wilhelm; Lichtenfels
Hausknecht, Anton; Wien
Kaiser, Friedrich; Fürth i. Bayern
Landesbibliothek 'Schloß Ehrenburg'; Coburg
Mattstedt, Jürgen; Coburger Landesstiftung, Coburg
Ostrow, Harald; Grub a. Forst
Dr. Passauer, Uwe; Museum Wien
Stadtverwaltung Gemünden a. Main
Tobies, Peter; Schwäbisch Gmünd-Straßdorf
Wirth, Heinrich; Lichtenfels

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Die Pilzflora Nordwestoberfrankens](#)

Jahr/Year: 1981

Band/Volume: [1-5](#)

Autor(en)/Author(s): Engel Heinz

Artikel/Article: [Hundert Jahre Pilzkunde in Nordwestoberfranken 1843 - 1945 24-52](#)