

Pilzfarbtafeln 1988 (71-80) Inhaltsverzeichnis

Klasse *Ascomycetes* (Operculate *Discomycetes*) — *Pezizales*

- 71** 289 *Boudiera purpurea* ECKBLAD (1968)
290 *Boudiera purpurea* ECKBLAD (1968)
291 *Helvella phlebophora* PAT.& DOASS. (1886)
292 *Peziza subisabellina* (LE GAL) MOSER
293 *Pithya cupressina* (FR.) FUCK. (1870)
294 *Smardaea protea* ZHUANG & KORF (1986)

Klasse *Ascomycetes* (Inoperculate *Discomycetes*) — *Leotiales*

- 72** 295 *Arachnoscypha aranea* (DE NOT.) BOUD.:DENNIS (1945)
296 *Bisporella scolochloae* (DE NOT.) SPOONER in KIRK & SPOONER (1983)
297 *Chloroscypha alutipes* (PHILL.) DENNIS (1964)
298 *Dermea padia* (FR.) FR. (1849)
299 *Drepanopeziza salicis* (TUL.) V.HÖHNEL (1920)
300 *Drepanopeziza salicis* (TUL.) V.HÖHNEL (1920)

Klasse *Ascomycetes* (Inoperculate *Discomycetes*) — *Leotiales*

- 73** 301 *Hymenoscyphus ravus* SVR. (1989)
302 *Lanzia aesculi* (VEL.) SVR. (1985)
303 *Sarcotrochila alpina* (FUCK.) V.HÖHNEL (1917)

Klasse *Ascomycetes* — Ordnung *Clavicipitales*

- 304 *Cordyceps capitata* (HOLMSK.: FR.) LINK (1883)

Klasse *Ascomycetes* — Ordnung *Phacidiales*

- 305 *Coccophacidium pini* var. *fuckelii* (ALB.& SCHW.) REHM
306 *Colpoma degenerans* (FR.) DE NOT. (1847) / (1896)

Klasse *Ascomycetes* (Inoperculate *Discomycetes*) — *Leotiales*

- 74** 307 *Allophylaria soederholmii* SVR. (1986)
308 *Hymenoscyphus epiphyllus* (PERS.: FR.) REHM apud KAUFFMANN (1929)
309 *Hymenoscyphus scutula* (PERS.: FR.) PHILL. (1887)

Klasse *Basidiomycetes* — Ordnung *Agaricales*

- 75** 310 *Mycena stylobates* (PERS.: FR.) KUMMER (1871)
311 *Psilocybe inquilina* (FR.: FR.) BRES. (1931)
312 *Resupinatus applicatus* (BATSCH : FR.) S.F.GRAY (1821)

Klasse *Basidiomycetes* — Ordnung *Agaricales* — *Cortinarius* (*Dermocybe*)

- 76** 313 *Cortinarius cinnabarinus* FR. (1838)
314 *Cortinarius cinnabarinus* FR. (1838)
315 *Cortinarius* (D.) *cinnamomeus* (L.: FR.) FR. (1838)
316 *Cortinarius* (D.) *cinnamomeus* (L.: FR.) FR. (1838)
317 *Cortinarius* (D.) *croceus* (SCHAEFF.: FR.) HØILAND (1983)
318 *Cortinarius* (D.) *croceus* (SCHAEFF.: FR.) HØILAND (1983)

Klasse *Basidiomycetes* — Ordnung *Agaricales* — *Cortinarius* (*Dermocybe*)

- 77** 319 *Cortinarius* (D.) *phoeniceus* MAIRE (1911)
320 *Cortinarius* (D.) *phoeniceus* MAIRE (1911)
321 *Cortinarius* (D.) *sanguineus* (WULF.: FR.) FR. (1838)
322 *Cortinarius* (D.) *sanguineus* (WULF.: FR.) FR. (1838)
323 *Cortinarius* (D.) *semisanguineus* (FR.) GILL. (1874)
324 *Cortinarius* (D.) *semisanguineus* (FR.) GILL. (1874)

Klasse *Myxomycetes*

- 78** 325 *Didymium* *serpula* FR. (1829)
326 *Didymium* *squamulosum* (ALB. & SCHW.) FR. (1818)
327 *Hemitrichia* *clavata* (PERS.) ROST. (1873)
328 *Hemitrichia* *serpula* (SCOP.) ROST. (1873)
329 *Lycogala* *conicum* PERS. (1801)
330 *Physarum* *viride* (BULL.) PERS. (1795) var. *viride*

Klasse *Basidiomycetes* — Ordnung *Aphyllorphales* — *Polyporaceae* s.lat.

- 79** 331 *Inonotus* *cuticularis* (BULL.: FR.) KARST. (1879)
332 *Inonotus* *hastifer* POUZ. (1981)
333 *Oligoporus* *rennyi* (BERK. & BR.) POUZ. (1971)

Klasse *Basidiomycetes* — Ordnung *Aphyllorphales* — *Polyporaceae* s.lat.

- 80** 334 *Skeletocutis* *alutacea* (LOWE) KELLER (1979)
335 *Spongiporus* *tephroleucus* (FR.) DAVID (1980)
336 *Tyromyces* *chioneus* (FR.: FR.) KARST. (1881)

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafel 1988, Nr. 71

Klasse *Ascomycetes* (Operculate *Discomycetes*) — *Pezizales*



289) *Boudiera purpurea* ECKBLAD (1968)
Aufn. B. Hanff (x ca. 7). Siehe Text Seite 52.



290) *Boudiera purpurea* ECKBLAD (1968)
Aufn. B. Hanff (x ca. 10). Siehe Text Seite 52.



291) *Helvella phlebophora* PAT. & DOASS. (1886)
Aufn. H. Engel (x ca. 1½). Siehe Text Seite 29.



292) *Peziza subisabellina* (LE GAL) MOSER
Aufn. B. Hanff (x ca. 1). Siehe Text Seite 30.



293) *Pithya cupressina* (FR.) FÜCK. (1870)
Aufn. B. Hanff (x ca. 10). Siehe Text Seite 30.



294) *Smardaea protea* ZHUANG & KORF (1986)
Aufn. B. Hanff (x ca. 1½). Siehe Text Seite 31.


— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafel 1988, Nr. 72

Klasse Ascomycetes (Inoperculate *Discomycetes*) — *Leotiales*



295) *Arachnoscypha aranea* (DE NOT.)
BOUD.: DENNIS (1945)
Aufn. B. Hanff (x ca. 15). Siehe Text Seite 32.



296) *Bispora scolochloae* (DE NOT.)
SPOONER in KIRK & SPONNER (1983)
Aufn. H. Engel (x ca. 2). Siehe Text Seite 34.



297) *Chloroscypha alutipes* (PHILL.) DENNIS (1964)
Aufn. B. Hanff (x ca. 10). Siehe Text Seite 35.



298) *Dermea padia* (FR.) FR (1849)
Aufn. B. Hanff (x ca. 5). Siehe Text Seite 36.



299) *Drepanopeziza salicis* (TUL.) V. HÖHNEL (1920)
Aufn. B. Hanff (x ca. 12). Siehe Text Seite 37.



300) *Drepanopeziza salicis* (TUL.) V. HÖHNEL (1920)
Aufn. B. Hanff (x ca. 10). Siehe Text Seite 37.

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafel 1988, Nr. 73

Klasse *Ascomycetes* (Inoperculate *Discomycetes*) — *Leotiales*



301) *Hymenoscyphus ravus* SVR. (1989)
Aufn. B. Hanff (x ca. 8). Siehe Text Seite 39+43.



302) *Lanzia aesculi* (VEL.) SVR. (1985)
Aufn. B. Hanff (x ca. 8). Siehe Text Seite 39+43.



303) *Sarcotrochila alpina* (FUCK.) V. HÖHNEL (1917)
Aufn. B. Hanff (x ca. 10). Siehe Text Seite 41.



304) *Cordyceps capitata* (HOLMSK.: FR.) LINK (1883)
Aufn. B. Hanff (x ca. 1½). Siehe Hinweis Seite 42.



305) *Coccophacidium pini* var. *fuckelii*
(ALB. & SCHW.) REHM (1896)
Aufn. B. Hanff (x ca. 5). Siehe Text Seite 42.



306) *Colpoma degenerans* (FR.) DE NOT. (1847)
Aufn. B. Hanff (x ca. 10). Siehe Text Seite 42.

Klasse *Ascomycetes* —
Ordnung *Clavicipitales* 304)

Klasse *Ascomycetes* —
Ordnung *Phacidiales* 305) u. 306)

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafel 1988, Nr. 74

Klasse Ascomycetes (Inoperculate *Discomycetes*) — *Leotiales*



307) *Allophylaria soederholmii* SVR. (1986)
Aufn. H. Engel (x ca. 5). Siehe Text Seite 73.



308) *Hymenoscyphus epiphyllus* (PERS.: FR.)
REHM apud KAUFFMANN (1929)
Aufn. H. Engel (x ca. 3). Siehe Text Seite 76.



309) *Hymenoscyphus scutula* (PERS.: FR.) PHILL. (1887)
Aufn. H. Engel (x ca. 3). Siehe Text Seite 76.

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafel 1988, Nr. 75
Klasse *Basidiomycetes* — Ordnung *Agaricales*



310) *Mycena stylobates* (PERS.: FR.) KUMMER (1871)
Aufn. H. Engel (x ca. 3). Siehe Hinweis Seite 86.



311) *Psilocybe inquilina* (FR.: FR.) BRES. (1931)
Aufn. H. Engel (x ca. 2). Siehe Hinweis Seite 86.



312) *Resupinatus applicatus* (BATSCH: FR.)
S. F. GRAY (1821)
Aufn. H. Engel (x ca. 5). Siehe Hinweis Seite 86.

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafel 1988, Nr. 76

Klasse *Basidiomycetes* — Ordnung *Agaricales* — *Cortinarius* (*Dermocybe*)



313) *Cortinarius cinnabarinus* FR. (1838)
Siehe Text Seite 62.



314) *Cortinarius cinnabarinus* FR. (1838)



315) *Cortinarius* (D.) *cinnamomeus* (L.: FR.) FR. (1838)
Siehe Text Seite 62.



316) *Cortinarius* (D.) *cinnamomeus*
(L.: FR.) FR. (1838)



317) *Cortinarius* (D.) *croceus*
(SCHAEFF.: FR.). HØILAND (1983)
Siehe Text Seite 63.



318) *Cortinarius* (D.) *croceus* (SCHAEFF.: FR.)
HØILAND (1983)

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafel 1988, Nr. 77

Klasse *Basidiomycetes* — Ordnung *Agaricales* — *Cortinarius* (*Dermocybe*)



319) *Cortinarius* (D.) *phaeniceus* MAIRE (1911)
Siehe Text Seite 63.



320) *Cortinarius* (D.) *phaeniceus* MAIRE (1911)



321) *Cortinarius* (D.) *sanguineus* (WULF: FR.) (1838)
Siehe Text Seite 64.



322) *Cortinarius* (D.) *sanguineus*
(WULF: FR.) (1838).



323) *Cortinarius* (D.) *semisanguineus*
(FR.) GILL. (1874). Siehe Text Seite 64.



324) *Cortinarius* (D.) *semisanguineus* (FR.) GILL.
(1874).


— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafel 1988, Nr. 78

Klasse *Myxomycetes*




325) *Didymium serpula* (FR.) (1829)
Aufn. H. Engel (x ca. 3). Siehe Text Seite 46.



326) *Didymium squamulosum* (ALB. & SCHW.) FR. (1818).
Aufn. B. Hanff (x ca. 10).



327) *Hemitrichia clavata* (PERS.) ROST. (1873)
Aufn. B. Hanff (x ca. 10). Siehe Text Seite 49.



328) *Hemitrichia serpula* (SCOP) ROST. (1873).
Aufn. M. Runck (x ca. 8). Siehe Text Seite 50.



329) *Lycogala conicum* PERS. (1801)
Aufn. H. Engel (x ca. 3). Siehe Text Seite 47.



330) *Physarum viride* (BULL.) PERS. (1795) var. *viride*
Aufn. B. Hanff (x ca. 10).

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafel 1988, Nr. 79

Klasse *Basidiomycetes* — Ordnung *Aphylophorales* — *Polyporaceae* s.lat.



331) *Inonotus cuticularis* (BULL.: FR.) KARST (1879)

Aufn. H. Ostrow (x ca. $\frac{1}{3}$). Siehe Text Seite 4.



332) *Inonotus hastifer* POUZ. (1981)

Aufn. H. Ostrow (x ca. 1). Siehe Hinweis Seite 5.




333) *Oligoporus rennyi* (BERK. & BR.) POUZ. (1971)

Aufn. H. Ostrow (x ca. 1). Siehe Text Seite 5.

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafel 1988, Nr. 80

Klasse *Basidiomycetes* — Ordnung *Aphyllphorales* — *Polyporaceae* s.lat.



334) *Skeletocutis alutacea* (LOWE) KELLER (1979)
Aufn. H. Ostrow (x ca. 1). Siehe Hinweis Seite 6.



335) *Spongiporus tephroleucus* (FR.) DAVID (1980)
Aufn. H. Ostrow (x ca. 1/2). Siehe Text Seite 6.



336) *Tyromyces chioneus* (FR.: FR.) KARST. (1881)
Aufn. H. Ostrow (x ca. 1/2). Siehe Text Seite 7.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Die Pilzflora Nordwestoberfrankens](#)

Jahr/Year: 1988

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Pilzfarbtafeln 1988 \(71-80\) Inhaltsverzeichnis I-XXI](#)