

Eingegangen am 15.November 1990

Notizen zu einigen *Cortinarius*- Aufsammlungen aus den Untergattungen *Phlegmacium* und *Leprocye* in Nordwestoberfranken

Wilhelm Härtl
Riemenschneiderstraße 19
D-8620 Lichtenfels

Ergänzende Fundangaben von: Heinz Engel
Wiesenstraße 10
D-8621 Weidhausen b.Coburg

Key Words : *Cortinarius* (Phl.) *allutus*, *C.* (Phl.) *amoenolens*,
C. (Phl.) *caesiocyaneus*, *C.* (Phl.) *glaucopus* var. *olivaceus*, *C.* (Phl.) *percomis*,
C. (Phl.) *variecolor*, *C.* (Lep.) *betuletorum*, *C.* (Lep.) *cotoneus*, *C.* (Lep.) *limonius*,
C. (Lep.) *speciosissimus*, *C.* (Lep.) *venetus* var. *montanus*, *C.* (Lep.) *venetus* var.
venetus.

Abstract : 12 *Cortinarius*-species found of Northwestoberfranken (Bavaria, B R D) are introduced by colorplates, finding dates and bibliographical data.

Zusammenfassung : 12 in Nordwestoberfranken (Bayern, B R D) gefundene Haarschleierlings-Arten (6 Schleimkopf- und 6 Raukopf - Arten) werden mit Farbbildern, Funddaten und Literaturhinweisen vorgestellt.

INHALTSVERZEICHNIS

Nr.:	Wissenschaftlicher Name	Sei- te:	Pilzfarbtafel:
01	<i>Cortinarius</i> (Phl.) <i>allutus</i>	46	83 : 345
02	- - <i>amoenolens</i>	46	83 : 346
03	- - <i>caesiocyaneus</i>	46	83 : 347
04	- - <i>glaucopus</i> var. <i>olivaceus</i>	47	84 : 348
05	- - <i>percomis</i>	47	84 : 349
06	- - <i>variecolor</i>	47	84 : 350
07	- (Lep.) <i>betuletorum</i>	47	85 : 351
08	- - <i>cotoneus</i>	48	85 : 352
09	- - <i>limonius</i>	48	85 : 353
10	- - <i>speciosissimus</i>	48	86 : 354
11	- - <i>venetus</i> var. <i>montanus</i>	48	87 : 355
12	- - <i>venetus</i> var. <i>venetus</i>	48 49	87 : 356 + 357

LITERATUR

Bemerkung: Verwendete Kürzel für Fundnummern und Belege
siehe Seite 3.

Cortinarius (Phl.) allutus - C. (Phl.) amoenolens - C. (Phl.) caesiocyaneus

01) Cortinarius (Phl.) allutus SECR. (1833)

Abb.: Pilzfarbtafel 83 : 345

Fund in NO: Hä/ - /Hä - 05.10.1984 - 'Mainecker Forst' bei Maineck - Krs.Lichtenfels - MTB 5833 - bei Fichten (Picea) im Moos, Grabeneinschnitt - Beleg: PHä.

Bestimmung : nach Frischmaterial.

Beschreibung: bei Michael/Hennig/Kreisel (1981), mit Farbbild.

Auswertung : nach Brandrud et al.(1990) ist C.allutus nur eine dickfleischige Form von C.multiformis FR. (1818).

02) Cortinarius (Phl.) amoenolens R.HRY. (1943)

Abb.: Pilzfarbtafel 83 : 346

Funde in NO: Hä/ - /Hä - 14.09.1986 - 'Schwarzberg' bei Oberlangheim - Krs.Lichtenfels - MTB 5832 - bei Rotbuche (Fagus silvatica) auf Kalk. Weitere Funde in den MTB's 5631 5730 5732 5832 5932 5933 6024 6130 (Krs. Bamberg, Coburg, Lichtenfels und Unterfranken). Belege: PE, PHä.

Bestimmung : nach Frischmaterial.

Beschreibung: bei Michael/Hennig/Kreisel (1981), mit Farbbild.

03) Cortinarius (Phl.) caesiocyaneus BRITZ. (1896)

Abb.: Pilzfarbtafel 83 : 347

Funde in NO: Hä/ - /Hä - 09.10.1983 - 'Neuensorger Forst' bei Weidhausen/Neuensorg - Krs.Lichtenfels - MTB 5832 - Straßeböschung, Graswuchs, bei Kiefer (Pinus) und Fichte (Picea), entfernt auch Birke (Betula), auf mit Kalksplitt durchmischem Boden - Beleg: PHä. Weiterer Fund im MTB 6128 (Krs. Bamberg).

Bestimmung : nach Frischmaterial.

Beschreibung: bei Moser (1983).

Ergänzende Merkmale aufgrund persönlicher Notizen: Hutfarbe:

blaugrauviolett, später grauocker. Lamellen: blauviolettlich, blaugrau. Stiel: wie der Hut gefärbt, jedoch blasser blaugrau-violett; Knolle auffallend gerandet. Fleisch: bläulich, besonders in der oberen Stielspitze, in der Stielbasis +/- ocker, stellenweise schmutzig blaugrau marmoriert. Geruch: dumpf, an alte Wäsche erinnernd. Reagenzien: KOH 10%, auf der Huthaut dunkel braunrot und im Fleisch blaß braun. Sporen: 9,3x4,8-5,8 µm.

Cortinarius (Phl.) glaucopus var. olivaceus - C. (Phl.) percomis - C. (Phl.) variecolor - C. (Lep.) betuletorum

04) Cortinarius (Phl.) glaucopus (SCHFF.1770 : FR.) FR.1836
var. olivaceus MOS. (1960)

Abb.: Pilzfarbtafel 84 : 348

Funde in NO und Unterfranken: Hä/ - /Hä - 17.08.1984 - 'Lehmigberg' bei Oberlangheim - Krs.Lichtenfels - MTB 5832 - Mischwald bei Rotbuchen (Fagus) und Fichte (Picea) auf Kalk - Beleg: PHä.Weitere Funde in den MTB's 5734 5926 (Krs.Kronach und Schweinfurt, Unterfranken).

Bestimmung : nach Frischmaterial.

Beschreibung: bei Moser (1960)

Anmerkungen : Reagenzien: KOH 20% auf Huthaut rotbraun und auf Stielfleisch mittelbraun. Sporen: 6,9-8,8 x 4,6-4,8 µm. Geruch: fad unangenehm.

05) Cortinarius (Phl.) percomis FR. (1836)

Abb.: Pilzfarbtafel 84 : 349

Funde in NO: Hä/ - /Hä - 09.10.1983 - 'Neuensorger Forst' bei Weidhausen/Neuensorg - Krs.Lichtenfels - MTB 5832 - Nadelwald bei Fichte (Picea) und Kiefer (Pinus), gesellig wachsend. Weitere Funde in den MTB's 5631 5632 (Krs.Coburg). Belege: PE, PHä.

Bestimmung : nach Frischmaterial.

Beschreibung: bei Michael/Hennig/Kreisel (1981), mit Farbbild.

06) Cortinarius (Phl.) variecolor (FR.1838) WÜNSCHE ss.MOSER

Syn.: Cortinarius (Phl.) largiusculus BRITZ.

Abb.: Pilzfarbtafel 84 : 350

Funde in NO: Hä/ - /Hä - 02.10.1984 - 'Neuensorger Forst' bei Weidhausen/Neuensorg - Krs.Lichtenfels - MTB 5832 - Nadelwald bei Fichte (Picea). Weitere Funde in den MTB's 5731 5932 (Krs.Coburg, Lichtenfels). Belege: PHä.

Bestimmung : nach Frischmaterial.

Beschreibung: bei Moser (1960).

07) Cortinarius (Lep.) betuletorum (MOS.) MOS. (1967)

Abb.: Pilzfarbtafel 85 : 351

Funde in NO: Hä/ - /Hä - 03.10.1984 - 'Heidleite' bei Schloß Banz - Krs.Lichtenfels - MTB 5831 - bei Birken (Betula) und Eichen (Quercus) - Beleg: PHä.Weiterer Fund im MTB 5833 (Krs.Lichtenfels), bei Birken in einer Fichtenschonung.

Bestimmung : nach Frischmaterial.

Beschreibung: bei Moser (1983).

Cortinarius (Lep.) cotoneus - C. (Lep.) limoneus - C. (Lep.) speciosissimus - C. (Lep.) venetus var. montanus - C. (Lep.) venetus var. venetus

08) Cortinarius (Lep.) cotoneus FR. (1836)

Abb.: Pilzfarbtafel 85 : 352

Funde in NO: Hä/ - /Hä - 19.10.1980 - 'Schwarzberg' bei Klosterlangheim - Krs.Lichtenfels - MTB 5832 - bei Rotbuchen (Fagus silvatica) - Beleg: PHä. Weitere Funde im MTB 5933 (Krs.Lichtenfels).

Bestimmung : nach Frischmaterial.

Beschreibung: bei M i c h a e l/H e n n i g/K r e i s e l(1981), mit Farbbild.

09) Cortinarius (Lep.) limonius (FR.: FR.) FR. (1838)

Abb.: Pilzfarbtafel 85 : 353

Funde in NO: Hä/ - /Hä - 30.08.1980 - 'Krötenrangen' bei Hammer - Krs. Lichtenfels - MTB 5832 - Nadelwald, bei Fichten (Picea), nahe einem Waldbach - Beleg: PHä. Weitere Funde im MTB 5631 (Krs.Coburg).

Bestimmung : nach Frischmaterial.

Beschreibung: bei M i c h a e l/H e n n i g/K r e i s e l(1981), mit Farbbild.

10) Cortinarius (Lep.) speciosissimus KÜHN. & ROMAGN. (1953)

Abb.: Pilzfarbtafel 86 : 354

Funde in NO: E/ - /E - 20.09.1979 - 'Rottenbacher Wald' (Moorgebiet) bei Rottenbach - Krs.Coburg - MTB 5631 - anmooriger Fichtenwald - Beleg: PE. Weitere Funde in den MTB's 5731 5733 6040 (Krs.Coburg, Kronach und östliches Oberfranken).

Bestimmung : nach Frischmaterial.

Beschreibung: bei M i c h a e l/H e n n i g/K r e i s e l(1981), mit Farbbild.

11) Cortinarius (Lep.) venetus FR. var. montanus MOS. (1970)

Abb.: Pilzfarbtafel 87 : 355

Fund in NO: Hä/ - /Hä - 14.10.1983 - 'Neuensorger Forst' bei Weidhausen/Neuensorg - Krs.Lichtenfels - MTB 5832 - Nadelwald, bei Fichten (Picea) - Beleg: PHä.

Bestimmung : nach Frischmaterial.

Beschreibung: bei M o s e r (1983).

12) Cortinarius (Lep.) venetus FR. var. venetus MOS. (1970)

Abb.: Pilzfarbtafel 87 : 356 und 357

Funde in NO: Hä/ - /Hä - 26.10.1981 - 'Krottenstein' bei Siedamsdorf - Krs.Lichtenfels - MTB 5933 - bei Rotbuchen (Fagus silvatica) auf Kalk - Beleg: PHä. Weitere Funde in den MTB's 5630 5631 5731 5832 5933 (Krs.Coburg, Lichtenfels).

Bestimmung : nach Frischmaterial.

Beschreibung: bei Moser (1970 und (1983)).

Literatur:

Brandrud, T.E. und H.Lindström, H.Marklund, J.Melot, S.Muskos (1990) - Cortinarius Flora Photographica, Teil 1

Garnier, G. (1973) - Bibliographie des Cortinaires, Facicule 7 Docum.Mycol.

-	(1973) - "	"	"	,	"	10	"	"	.
-	(1974) - "	"	"	,	"	13	"	"	.
-	(1974) - "	"	"	,	"	16	"	"	.
-	(1975) - "	"	"	,	"	19	"	"	.
-	(1976) - "	"	"	,	"	24	"	"	.
-	(1978) - "	"	"	,	"	29	"	"	.
-	(1978) - "	"	"	,	"	30	"	"	.

Marchand, P. (1982) - Champignons du nord et du midi. Les Cortinarius. 7. Perpignan

Michael/Hennig/Kreisel (1981) - Handbuch für Pilzfreunde, Band IV. Jena

Moser, M. (1960) - Die Gattung Phlegmacium (Schleimköpfe), Reprint 1979. Vaduz

- (1970) - 'Cortinarius FR., Untergattung Leprocye subgen. nov., die Rauhköpfe. Vorstudien zu einer Monographie.' In ZfP 36(1/2) : 37 -57
- (1983) - Die Röhrlinge und Blätterpilze. In H.Gams: Kleine Kryptogamenflora II/b/2. Stuttgart - New York.

Danksagung

Herzlichen Dank Herrn Erhardt Ludwig für das zur Verfügung gestellte Aquarell von Cortinarius (Lep.) speciosissimus zur Veröffentlichung.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Die Pilzflora Nordwestoberfrankens](#)

Jahr/Year: 1989

Band/Volume: [13](#)

Autor(en)/Author(s): Härtl Wilhelm G., Engel Heinz

Artikel/Article: [Notizen zu einigen Cortinarius - Aufsammlungen aus den Untergattungen Phlegmacium und Leprocybe in Nordwestoberfranken 45-49](#)