

Pilzfarbtafeln 1989 (81-90b)
Inhaltsverzeichnis

Klasse Ascomycetes (Operculate *Discomycetes*) — *Pezizales*

- 81** 337 *Peziza howsei* (BOUD.) DONADINI (1979)
338 *Pulvinula globifera* (BERK. & CURT.) LE GAL var. *etiolata* (CKE.) SACC.

Klasse Ascomycetes (Inoperculate *Discomycetes*) — *Leotiales*

- 339 *Naevala perexigua* (ROB. & DESM.) K. HOLM & HOLM (1978)
340 *Naevala perexigua* (ROB. & DESM.) K. HOLM & HOLM (1978)
- 82** 341 *Pezoloma marchantiae* (SOMMERF.) BENKERT (1981)
342 *Unquiculella hamulata* (FELTGEN) V. HÖHN. (1906)

Klasse Ascomycetes — Ordnung *Phacidiales*

- 343 *Lophodermina conigena* (TEHON) BRUNAUD (1935)
344 *Lophodermina conigena* (TEHON) BRUNAUD (1935)

Klasse Basidiomycetes — Ordnung *Agaricales* — *Cortinariaceae*

- 83** 345 *Cortinarius* (Phl.) *allutus* SECR. (1833)
346 *Cortinarius* (Phl.) *amoenolens* R. HRY. (1943)
347 *Cortinarius* (Phl.) *caesiocyaneus* BRITZ. (1896)
- 84** 348 *Cortinarius* (Phl.) *glaucopus* (SCHFF. 1770 : FR.) FR. 1836 var. *olivaceus* MOS. (1960)
349 *Cortinarius* (Phl.) *percomis* FR. (1836)
350 *Cortinarius* (Phl.) *variecolor* (FR. 1838) WÜNSCHE ss. MOSER
- 85** 351 *Cortinarius* (Lep.) *betuletorum* (MOS.) MOS. (1967)
352 *Cortinarius* (Lep.) *cotoneus* FR. (1836)
353 *Cortinarius* (Lep.) *limonius* (FR.: FR.) FR. (1838)
- 86** 354 *Cortinarius* (Lep.) *speciosissimus* KÜHN. & ROMAGN. (1953)
- 87** 355 *Cortinarius* (Lep.) *venetus* FR. var. *montanus* MOS. (1970)
356 *Cortinarius* (Lep.) *venetus* FR. var. *venetus* MOS. (1970)
357 *Cortinarius* (Lep.) *venetus* FR. var. *venetus* MOS. (1970)

Klasse Basidiomycetes — Ordnung *Aphylophorales* — *Ganodermataceae*

- 88** 358 *Ganoderma adpersum* (SCHULZER) DONK (1969)

Klasse Basidiomycetes — Ordnung *Aphylophorales* — *Polyporaceae s.lat.*

- 359 *Jahnoporus hirtus* (CKE.) NUSS (1980)
360 *Schizopora carneo-lutea* (RODW. & CLEL.) KOTL. & POUZ. (1979)

Klasse *Myxomycetes*

- 89** 361 *Diderma testaceum* (SCHRAD.) PERS. (1801) - Plasmodium
362 *Diderma testaceum* (SCHRAD.) PERS. (1801) - Sporangium

Klasse Basidiomycetes — Ordnung *Agaricales* — *Agaricaceae*

- 363 *Leucocoprinus cretatus* LOCQ.

Klasse *Basidiomycetes* — Ordnung *Boletales* — *Boletaceae*

- 90a** 364 *Boletus noncolorans* nom. prov.
365 *Boletus noncolorans* nom. prov. - Anschnitt
366 *Boletus noncolorans* nom. prov. - Sporen
- 90b** 367 *Xerocomus quercinus* nom. prov.

Farbbilder nach Diapositiven:

H.Engel: 361-363; B.Hanff: 337-344; W.Härtl: 345-353, 355-357; H.Ostrow: 358-360;
K.Philipp: 364-366

Farbbilder nach Aquarellen: E.Ludwig: 354; T.Brückner: 367 und Seite 77

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafel 1989, Nr. 81


Klasse Ascomycetes (Operculate Discomycetes) — Pezizales




337) *Peziza howsei* (BOUD.) DONADINI (1979)
Aufn.: B. Hanff (x ca. $\frac{3}{4}$). Siehe Text Seite 18.



338) *Pulvinula globifera* (BERK. & CURT.) LE GAL var. *etiolata* (CKE.) SACC.
Aufn.: B. Hanff (x ca. 3). Siehe Text Seite 19.



339) *Naevula perexigua* (ROB. & DESM.)
K. HOLM & HOLM (1978), bei feuchtem Wetter.
Aufn.: B. Hanff (x ca. 50). Siehe Text Seite 22.



340) *Naevula perexigua* (ROB. & DESM.)
K. HOLM & HOLM (1978), bei trockenem Wetter.
Aufn.: B. Hanff (x ca. 50). Siehe Text Seite 22.

Klasse Ascomycetes (Inoperculate
Discomycetes) — Leotiales

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafel 1989, Nr. 82

Klasse *Ascomycetes* (Inoperculate *Discomycetes*) — *Leotiales*



341) *Pezoloma marchantiae* (SOMMERF.) BENKERT (1981)
Aufn.: B. Hanff (x ca. 4). Siehe Text Seite 23.



342) *Unguiculella hamulata* (FELTGEN) V. HÖHN. (1906)
Aufn.: B. Hanff (x ca. 5). Siehe Text Seite 24.



343) *Lophodermina conigena*
(TEHON) BRUNAUD (1935)
Aufn.: B. Hanff (x ca. 2). Siehe Text Seite 24.



344) *Lophodermina conigena*
(TEHON) BRUNAUD (1935)
Aufn.: B. Hanff (x ca. 2). Siehe Text Seite 24.

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafel 1989, Nr. 83

Klasse *Basidiomycetes* — Ordnung *Agaricales* — *Cortinariaceae*



345) *Cortinarius (Phl.) allutus* SECR. (1833)
Aufn.: W. Härtl (x ca. 1/2). Siehe Hinweis Seite 46.



346) *Cortinarius (Phl.) amoenolens* R. HRY. (1943)
Aufn.: W. Härtl (x ca. 1/3). Siehe Hinweis Seite 46.



347) *Cortinarius (Phl.) caesiocyaneus* BRITZ. (1896)
Aufn.: W. Härtl (x ca. 1/2). Siehe Hinweis Seite 46.

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafel 1989, Nr. 84

Klasse *Basidiomycetes* — Ordnung *Agaricales* — *Cortinariaceae*



348) *Cortinarius* (Phl.) *glaucopus* (SCHFF. 1770: FR.) FR 1836
var olivaceus MOS. (1960)
Aufn.: W. Härtl (x ca. 1/3). Siehe Hinweis Seite 47.



349) *Cortinarius* (Phl.) *percomis* FR. (1836)
Aufn.: W. Härtl (x ca. 1/2). Siehe Hinweis Seite 47.



350) *Cortinarius* (Phl.) *varicolor* (FR. 1838) WÜNSCHE ss. MOSER
Aufn.: W. Härtl (x ca. 1/2). Siehe Hinweis Seite 47.

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafel 1989, Nr. 85

Klasse *Basidiomycetes* — Ordnung *Agaricales* — *Cortinariaceae*



351) **Cortinarius (Lep.) betuletorum** (MOS.) MOS. (1967)
Aufn.: W. Härtl (x ca. 1/2). Siehe Hinweis Seite 47.



352) **Cortinarius (Lep.) cotoneus** FR. (1836)
Aufn.: W. Härtl (x ca. 1/2). Siehe Hinweis Seite 48.



353) **Cortinarius (Lep.) limonius** (FR.: FR.) FR. (1838)
Aufn.: W. Härtl (x ca. 1/2). Siehe Hinweis Seite 48.

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafel 1989, Nr. 86

Klasse *Basidiomycetes* — Ordnung *Agaricales* — *Cortinariaceae*



354) *Cortinarius (Lep.) speciosissimus* KÜHN. & ROMAGN. (1953)
Aquarell: E. Ludwig (x ca. 1/4). Siehe Hinweis Seite 48.

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafel 1989, Nr. 87

Klasse *Basidiomycetes* — Ordnung *Agaricales* — *Cortinariaceae*



355) *Cortinarius* (Lep.) *venetus* FR. var. *montanus* MOS. (1970)
Aufn.: W. Härtl (x ca. ½). Siehe Hinweis Seite 48.



356) *Cortinarius* (Lep.) *venetus* FR. var. *venetus* MOS. (1970)
Aufn.: W. Härtl (x ca. ½). Siehe Hinweis Seite 48.



357) *Cortinarius* (Lep.) *venetus* FR. var. *venetus* MOS. (1970)
Aufn.: W. Härtl (x ca. ½). Siehe Hinweis Seite 48.

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafel 1989, Nr. 88

Klasse *Basidiomycetes* — Ordnung *Aphyllporales* — *Ganodermataceae*



358) *Ganoderma adpersum* (SCHULZER) DONK (1969)
Aufn.: H. Ostrow (x ca. 1/6). Siehe Text Seite 33.



359) *Jahnoporus hirtus* (CKE.) NUSS (1980)
Aufn.: H. Ostrow (x ca. 1/2). Siehe Text Seite 33.



360) *Schizopora carneo-lutea* (RODW. & CLEL.) KOTL. & POUZ (1979)
Aufn.: H. Ostrow (x ca. 1/4). Siehe Text Seite 35.

Klasse *Basidiomycetes* — Ordnung *Aphyllporales* — *Polyporaceae* s. *lato*


— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafel 1989, Nr. 89

Klasse *Myxomycetes*



361) *Diderma testaceum* (SCHRAD.) PERS. 1801 — **Plasmodium**
Aufn.: H. Engel (x ca. 10). Siehe Text Seite 28.



362) *Diderma testaceum* (SCHRAD.) PERS. (1801) — **Sporangium**
Aufn.: H. Engel (x ca. 10). Siehe Text Seite 28.



363) *Leucocoprinus cretatus* LOCQ.
Aufn.: H. Engel (x ca. 1/4). Siehe Text Seite 12.

Klasse Basidiomycetes — Ordnung
Agaricales — Agaricaceae

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafel 1989, Nr. 90a


Klasse *Basidiomycetes* — Ordnung *Boletales* — *Boletaceae*



364) **Boletus noncolorans** nom. prov.
Aufn.: K. Philipp (x ca. 1/3). Siehe Text Seite 73.



365) **Boletus noncolorans** nom. prov. — Anschnitt
Aufn.: K. Philipp (x ca. 1/3). Siehe Text Seite 73.



366) **Boletus noncolorans** nom. prov. — Sporen
Aufn.: K. Philipp (Sporen angefärbt). Siehe Text Seite 73.

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafel 1989, Nr. 90b

Klasse *Basidiomycetes* — Ordnung *Boletales* — *Boletaceae*



367 *Xerocomus quercinus* nom. prov.
Aquarell: T. Brückner (x ca. 1/4). Siehe Text Seite 77.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Die Pilzflora Nordwestoberfrankens](#)

Jahr/Year: 1989

Band/Volume: [13](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Pilzfarbtafeln 1989 \(81-90b\) Inhaltsverzeichnis I-XXIII](#)