

Eingegangen am 10. Januar 1991

Pilzneufunde in Nordwestoberfranken 1990, I. Teil. Auflistung, Kurzbeschreibungen, Hinweise

Heinz Engel
Wiesenstraße 10
D-96279 Weidhausen b.Coburg

Key Words : 91 Species.

Abstract : 91 new species in North West `Oberfranken` (Bavaria, B R D) found in 1990 are listed below with their finding dates and short notes.

Zusammenfassung: 91 Pilzarten, die 1990 in Nordwestoberfranken (Bayern, B R D) neu gefunden wurden, sind nachfolgend mit entsprechenden Funddaten aufgelistet. Kurznotizen sind angefügt.

A ERLÄUTERUNGEN

Den Fundangaben liegen zugrunde:

- a) Exkursionen der `PKA Weidhausen b.Coburg`
- b) Privatexkursionen

Bedeutung der römischen Ziffern:

0 = laufende Nummer; I = leg./Probenummer/det./aff. oder rev.;
II = Pilzart; III = Funddatum; IV = Fundort; V = Kreis oder kreisfreie Stadt; VI = MTB-Nummer; VII = Belege, Herbars; VIII = Klassen - Ordnungen - Familien.

Zu I (= Kürzel für leg.):

E = H.Engel (Weidhausen b. Coburg), Fi = H.Fiebigger (Kolmsdorf), GE = Frau G.Engel (Bamberg), GW = G.Wolf (Donnersdorf), Ha = B.Hanff (Ahorn), He = Frau H.Engel (Weidhausen b. Coburg), Kl = W.Klosterleit (Frankfurt/Main), Os = H.Ostrow (Grub a.Forst), PW = `Pilzkundliche Arbeitsgemeinschaft Weidhausen b.Coburg`, Rö = Frau M.Rödel (Schweinfurt), SK = Frau S.Kreuzeder (Bamberg), Wa = A.Wagner (Breitengüßbach), Wi = H.Wirth (Lichtenfels).

Zu I (= Kürzel für det., aff., rev.):

Bu = Dr.H.Butin (Braunschweig), Cr = J.Christian (Erding), E = H.Engel (Weidhausen b.Coburg), GB = Frau H.Grob-Brauckmann (Seeheim), Ha = B.Hanff (Ahorn), HB = H.O.Barral (Tübingen), Hc = Dr.J.Hechler (Hamburg),

026 Hf = J.H ä f f n e r (Mittelhof), HJ = Frau Dr. V.H o l u b o v á -
 J e c h o v á (Prühonice, Č Z), KE = Frau Dr.I.K r o m m e r -
 E i s f e l d e r (Bamberg), Ht = Dr.S.H u h t i n e n (Turku,
 Finnland), Ma = J.M a s e r (Leonberg), Os = H.O s t r o w (Grub
 a.Forst), Rck = Frau M.R u n c k (München), Schi = E.S c h i l d
 (Castelfranco, Italien), SI Frau Dr.B.S e n n - I r l e t (Bern,
 Schweiz), Svr = Dr.M.S v r ě e k (Prag, ČZ).

Zu V (= Kürzel für Kreise):

Ba = Bamberg, Br = Bayreuth, Co = Coburg, Ha = Haßberge (Unter-
 franken), Ho = Hof, Kr = Kronach, Ku = Kulmbach, Li = Lichtenfels,
 Sc = Schweinfurt (Unterfranken).

Zu VII (= Kürzel für Herbars):

U.a. Kew (England), PHB (Berlin, Humboldt-Universität), PRM (Prag,
 ČSFR), TUR (Turku, Finnland); in den Privatherbars PCr = C h r i -
 s t a n, PE = E n g e l, PGB = G r o ß e - B r a u c k m a n n, PHB =
 B a r a l, PHa = H a n f f, PHc = H e c h l e r, PHf = H ä f f -
 n e r, POS = O s t r o w, PSchi = S c h i l d.

Zu VIII (= Kürzel für Klassen - Ordnungen - Familien):

AsEr Ascomycetes - Erysiphales
 AsLe Ascomycetes - Leotiales
 AsPe Ascomycetes - Pezizales
 AsSp Ascomycetes - Sphaeriales
 AsTa Ascomycetes - Taphrinales

ApCl Aphyllophorales - Clavulinaceae
 ApCo Aphyllophorales - Coniophoraceae
 ApCt Aphyllophorales - Corticiaceae s.lat.
 ApHe Aphyllophorales - Hericiaceae
 ApPo Aphyllophorales - Polyporaceae s.lat.
 ApRa Aphyllophorales - Ramariaceae
 ApTh Aphyllophorales - Thelephoraceae

HeDa Heterobasidiomycetes - Dacryomycetales
 HeTr Heterobasidiomycetes - Tremellales

AgAg Agaricales - Agaricaceae
 AgAm Agaricales - Amanitaceae
 AgCo Agaricales - Coprinaceae
 AgCr Agaricales - Crepidotaceae
 AgCt Agaricales - Cortinariaceae
 AgTr Agaricales - Tricholomataceae

RuLa Russulales - Russulaceae

BaUr Basidiomycetes - Uredinales / MYXO Myxomycetes

DEUT Deuteromycetes, COEL Coelomycetes, HYPH Hyphomycetes
 PHYC Phycmycetes

NEUFUNDE 1990

Klasse Ascomycetes:

I		II		III	IV	V	VI	VII	VIII
001	Ha/13433/E	005	E/13034/HB	Encoelia tiliacea (FR.) P.KARST. 1871	Mitwitz	Kr	5733	PE	AsPe
002	E/12904/E	006	E/13748/E	Erysiphe artemisiae (WALLR.) GREV. 1824					
003	Os/13444/E	007	E/12631/E/Svr	Eutypa lata (PERS.: FR.) TUL. 1863					
004	E/12928/cf.Svr	008	E/13437/Svr	Hyaloscypha intacta SVR. 1986					
		009	E/13473/E	Hypoxylon rubiginosum var. ferrugineum (OTH) MILLER 1961					
		010	E/12959/E/Bu	Lasiosphaeria sorbina (NYL.) KARST. 1873					
		011	E/13044/E	Melanconis cf. desmazieri. PETR. 1938					
		012	E/12905b/E	Nectria berkeleyana (FLOWR. & CKE.) DING-LEY 1951					
013	Os/12984/E			Nectriopsis aureonitens (TUL. & TUL.) MRE. 1911					
014	E/12745/E			Olla scrupulosa (KARST.) SVR. 1986					
015	E/12568/Ht			Protounguicularia barbata (VEL.) HUHT. f. barbata					
016	E/13859/Svr			Pteridiospora curreyi (TUL.) E.MÜLLER 1962					
017	He, E/13717/E			Sepultaria foliacea (SCHAEFF.) BOUD. 1906					
018	Kl/13099/E			Taphrina wiesneri (RAITHAY) MIX 1954					
019	E/13901/E			Valsaria foedans (P.KARST.) SACC. 1882					
Klasse Basidiomycetes - Ordnung Aphyllophorales (Nichtblätterpilze):									
020	Os/2321/Os/E			Clavulinopsis laeticolor (BERK. & CURT.) PETERS. 1965					
021	Os/2297/Os/GB			Coniophora fusispora (CKE. & EL.) SACC. 1888					
022	GW/2380/Os			Creolophus cirratus (PERS.: FR.) KARST. 1879					
023	E/13689/E/Os			Gloeoporus pannocinctus (ROM.) J.ERIKSS. 1958					
024	Os/2555/Os/GB			Hyphodontia aspera (FR.) J.ERIKSS. 1958					
025	Rö/13780/Ma			Macrotyphula fistulosa (FR.) PETERS. var. contorta (HOLMSK.) FR. 1821					
026	GW, Os/2313/Os			Perenniporia fraxinea (BULL.: FR.) RYV. 1976/78					
027	Os/2349/Os/Ma			Phellinus viticola (SCHW.: FR.) DONK 1966					
028	E/13160/Os/GB			Phlebia deflectens (P.KARST.) RYV. 1971					
029	PW/13631/E			Ramaria fumigata (PECK) CORNER 1950					
030	SK/13319/Schi(E)			Ramaria rubella (SCHAEFF.) PETERS. 1974 var. rubella					
031	Gw, E/13240/Cr/Schi			Ramaria subbotrytis (COKER) CORNER 1950					
032	Os/2408/Os			Sistotrema fernanderi (LITSCH.) DONK 1956					
033	E/13335/Ma			Tomentella fuscoferruginosa (BRES.) LITSCH. 1941					
034	Os/2377/Os/GB			Tubulicrinis accedens (BOURD. & GALZ.) DONK 1950					

0	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Klasse B a s i d i o m y c e t e s - Ordnung H e t e r o b a s i d i o m y c e t e s (Gallertpilze):								
035	Os/2298/Os/GB	Basidiendron caesiocinerum (HÖHN. & LITSCH.) LUCK-ALLEN 1963	16.09.90	Warmersteinach	Br	6036	Pos	HeTr
036	Os/2465/Os/Ma	Dacryomyces tortus (WILLD.) ex FR. 1828	14.07.90	Achatzwald	Kol.Ba	6130	Pos	HeDa
037	E/12616/Ma	Myxarium laccatum (BOURD. & GALZ.) REID 1970	06.02.90	Freienfels	Br	6033	Pos	HeTr
Klasse B a s i d i o m y c e t e s - Ordnung A g a r i c a l e s (Blätterpilze):								
038	Wi/13233/E	Amanita vaginata var. flavescens GILB. & LUND. 1940	06.07.90	Lichtenfels	Li	5832	PE	AgAm
039	E/12563/E	Calathella eruciformis (BATSCH : FR.) REID	23.01.90	Freienfels	Br	6033	KEW, PE	AgTr
040	E/13536/E	Coprinus hemerobius FR. 1838 ss. LGE.	06.09.90	Oberaufseß	Br	6133	PE	AgCo
041	Fi/13097/E	Coprinus radiatus (BOLT.) FR. 1836	16.06.90	Zettlitz	Li	5832	PE	AgCo
042	PW/13634/KE	Cortinarius (Tel.) purpureo-badius ss. LGE.	03.10.90	Breitengüßbach	Ba	6031	PE	AgCo
043	E/13570/E	Cortinarius (Tel.) serripes KÜHN.	22.09.90	Ebersd.b.Ludwigs	Kr	5433	PE	AgCo
044	E/13742/E	Cortinarius (Tel.) subserripes ROMAGN.	21.10.90	Oberhaid	Ba	6030	PE	AgCo
045	E/13741/E	Cortinarius (Tel.) unidicola (KAUFFM.) HRY. 1937	21.10.90	Oberhaid	Ba	6030	PE	AgCo
046	E/13035/SI	Crepidotus epibryus (BULL.: FR.) QUEL. 1888	16.11.90	Oberaufseß	Br	6133	PE	AgCr
047	E/13718/E	Dermoloma cuneifolium (FR.) P.D.ORTON (ss. FR., LUNDELL)	15.10.90	Kaider	Li	5932	PE	AgTr
048	E/13575/E	Galerina laevis (PERS.) SING.	22.09.90	Ebersdorf b.Ludw.	Kr	5433	PE	AgCo
049	PW/13624/E	Inocybe hirtella var. bispora KUYPER 1986	03.10.90	Breitengüßbach	Ba	6031	PE	AgCo
050	E/13546/E	Lepiota subincarnata LGE. 1940	15.09.90	Spittelwald	Li	5832	PE	AgAg
051	GE/13823/KE	Mycena leptcephala (PERS.) GILL. 1878	14.09.90	Adelsdorf	Ba	6231	PE	AgTr
052	PW(E)/13633/E	Tricholoma viridifurcatum Bon 1976	03.10.90	Breitengüßbach	Ba	6031	PE	AgTr
Klasse B a s i d i o m y c e t e s - Ordnung R u s s u l a l e s (Sprödblätler):								
053	GE/13639/GE/E	Lactarius lilacinus (LASCH) FR. 1838	03.10.90	Gr.+Kl.Hofsee	Ba	6231	PE	RuRu
Klasse B a s i d i o m y c e t e s - Ordnung U r e d i n a l e s (Rostpilze):								
054	He/13366/E	Coleosporium campanulae (PERS.) LEV.	25.07.90	Weidhausen	Co	5732	PE	BaUr
055	E/12990/E/Bu	Puccinia polygoni amphibii PERS.	27.05.90	Fischbach b.Kron.	Kr	5734	PE	BaUr
056	E/13471/E	Pucciniastrum agrimoniae (DC.) TRANZSCHHEL	01.09.90	Freienfels	Br	6033	PE	BaUr
Klasse M y x o m y c e t e s - (Schleimpilze):								
057	Os/12873/Hc	Dictydiaethalium ferrugineum NANN.-BREM. 1966	17.04.90	Freienfels	Br	6033	Phc	MYXO
058	E/13210/Hc	Lamproderma arcyriomema ROST. 1874	03.07.90	Oberaufseß	Br	6133	Phc	MYXO
059	E/13326/Rck	Physarum murinum A.LISTER 1894	14.07.90	Achatzwald	Ba	6130	PRck	MYXO
060	E/12583/Rck	Trichia contorta var. iowensis (MACBR.) TORR. 1908	30.01.90	Freienfels	Br	6033	PRck	MYXO
Klasse D e u t e r o m y c e t e s (Fungi imperfecti):								
061	E/12919/cf.HJ	cf. Wardomyces inflatus (MARCH.) HENNEBERT	01.05.90	Freienfels	Br	6033	PE	HYPH
062	E/13404/HJ	Acremonium fusidioides (NICOT) W.GAMS	03.09.90	Oberaufseß	Br	6133	PE	HYPH
063	E/13039/HJ	Acremonium spec.	11.06.90	Oberaufseß	Br	6133	PE	HYPH
064	E/13206a/Bu	Aposphaeria, state von Melanomma pulv.-pyrios	03.07.90	Oberaufseß	Br	6133	PE	COEL
065	E/13824/HJ	Aspergillus cf. flavus LINK	15.12.90	Weidhausen	Co	5732	PE	HYPH
066	E/12751b/HJ	Aureobasidium pullulans (DE BARY) ARNAUD	30.03.90	Freienfels	Br	6033	PE	HYPH

O	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
067	E/13580/HJ	Beauveria bassiana (BALS.) VUILL.	03.09.90	Trübenbach	Co	5833	PE	HYPH
068	E/12670/E/HJ	Chaetopsis grisea (EHRENB.) SACC.	24.02.90	Freienfels	Br	6033	PE	HYPH
069	E/12637b/HJ	Chalara/Fusichalara spec. nov.	20.02.90	Freienfels	Br	6033	PE	HYPH
070	E/13203/HJ	Cladobotryum varium NEES : FR	03.07.90	Oberaufseß	Br	6133	PE	HYPH
071	E/13761a/HJ	Cladosporium cladosporioides (FRES.) DE VRIES	01.11.90	Oberaufseß	Br	6133	PE	HYPH
072	E/13761b/HJ	Cladosporium herbarum (PERS.: FR.) LINK	01.11.90	Oberaufseß	Br	6133	PE	HYPH
073	E/12637a/HJ	Corynesporopsis uniseptata P.M.KIRK	20.02.90	Freienfels	Br	6033	PE	HYPH
074	E/12669/E	Coryneum spec.	24.02.90	Freienfels	Br	6033	PE	COEL
075	E/13817/HJ	Costantinella terrestris (LINK & S.F.GRAY) HUGH.	24.11.90	Mitwitz	Kr	5733	PE	HYPH
076	E/12946/HJ	Drepanospora viride (CORDA) GOOS	01.05.90	Freienfels	Br	6033	PE	HYPH
077	E/12868/HJ	Geniculosporium serpens CHEST. & GREENH.	17.04.90	Oberaufseß	Br	6133	PE	HYPH
078	E/13203a/E	Lamproconium desmazieresii (BERK. & BR.) G.	03.07.90	Oberaufseß	Br	6133	PE	COEL
079	E/13202/E	Monodictys castanea (WALLR.) HUGHES	03.07.90	Oberaufseß	Br	6133	PE	HYPH
080	E/12672/HJ	Monodictys putredinis (WALLR.) HUGHES	24.02.90	Freienfels	Br	6033	PE	HYPH
081	E/12584/HJ	Nematogonium ferrugineum (PERS.) HUGHES	30.01.90	Freienfels	Br	6033	PE	HYPH
082	E/12958/HJ	Oidiodendron cf. tenuissimum (PECK) HUGHES	18.05.90	Freienfels	Br	6033	PE	HYPH
083	E/12945/HJ	Oidiodendron tenuissimum (PECK) HUGHES	01.05.90	Freienfels	Br	6033	PE	HYPH
084	E/13761/HJ	Penicillium spec.	01.11.90	Oberaufseß	Br	6033	PE	HYPH
085	E/12724b/HJ	Penicillium spec., Sekt. Symmetrica	11.06.90	Oberaufseß	Br	6133	PE	COEL
086	E/13036/HJ	Pseudospiropes subuliferus (CORDA) M.B.ELLIS	01.05.90	Freienfels	Br	6033	PE	HYPH
087	E/12918/HJ	Sporidesmium folliculatum (CORDA) MASON & HUGH.	01.05.90	Freienfels	Br	6033	PE	HYPH
088	E/12751a/HJ	Trichoconis spec. nov.	30.03.90	Freienfels	Br	6033	PE	HYPH
089	E/12869/HJ	Trichoconis spec. nov.	17.04.90	Oberaufseß	Br	6133	PE	HYPH

Bemerkungen: Folgende Kollektionen werden von Frau Dr. Vera H o - l u b o v á - J e c h o v á noch bearbeitet, entsprechende und klä - rende Resultate sind demnächst zu erwarten. Es sind dies:

E/12637/ Chalara oder Fusichalara spec. nov.
E/13036/ Phomitopsis spec.
E/12751a/ Trichoconis spec. nov.
E/12869/ Trichoconis spec. nov.
E/12919/ cf. Wardomyces inflatus.

Klasse P H Y C O M Y C E T E S (Algenpilze)

090 E/13234/E/HJ Syzygites megalocarpus EHRENB.: FR.

PHYC

Nachtrag:

Klasse A S C O M Y C E T E S

091 Os/13020/E/Svr Arachnocrea stipitata (LIB.) Z.MORAVEC

19.05.90 Godelhof

Ba 6030 PE

AsSp

Klasse ASCOMYCETES

E n g e l, H. u. B. H a n f f: siehe folgenden Beitrag: "Pilzneufunde in Nordwestoberfranken 1989/1990, II. Teil. Ascomyceten." Seite 039 bis Seite 050.

	Seite:
001 Anthracobia tristis	047
003 Cryptosphaeria populina	041
004 Diatrypella sordida	041
007 Erysiphe artemisiae	041
013 Nectria berkeleyana	042
017 Sepultaria foliacea	047
019 Valsaria foedans	048
Nachtrag:	
020 Arachnocrea stipata	049

H. E n g e l: siehe folgenden Beitrag: "Pilzfunde an Lindenästen (Tilia spec.)", Seite 119 bis Seite 243

	Seite:
005 Encoelia tiliacea	136
007 Eutypa lata	138
008 Hyaloscypha intacta	142
009 Hypoxylon rubiginosum var. ferrugineum	144
010 Lasiosphaeria sorbina	146
014 Olla scupulosa	154
015 Protounguicularia barbata var. barbata	159
016 Pteridiospora curreyi	161

Klasse BASIDIOMYCETES - Ordnung APHYLLOPHORALES (Nichtblätterpilze)

H. O s t r o w: siehe folgenden Beitrag: "Coniophoraceae, Corticiaceae, Hericiaceae, Lachnocladiaceae (Neufunde in Nordwestoberfranken 1989/1990, z.T. auch früher)", Seite 063 bis 077.

	Seite:
021 Coniophora fusispora	064
022 Creolophus cirratus	074
028 Phlebia deflectens	070
034 Tubulicrinis accedens	073

H. O s t r o w: siehe folgenden Beitrag: "Seltene Porlinge in Nordwestoberfranken (Neufunde 1989/1990)", Seite 055 bis 062.

	Seite:
023 Gloeoporus pannocinctus	057
026 Perenniporia fraxinea	058
027 Phellinus viticola	059

031 020) *Clavulinopsis laeticolor* (Clavulinaceae) - Gelbes Keulchen:

wuchs auf staunassem Schwemmboden unter *Alnus* und *Fraxinus* (Erle und Esche).

Literatur u.a. B r e i t e n b a c h / K r ä n z l i n (1986):348, Farbbild 449.

024) *Hyphodontia aspera* (Corticiaceae):

die Determinierung erfolgte erst 1992, die Beschreibung deswegen im nächsten Heft.

025) *Macrotyphula fistulosa* var. *contorta* (Clavariaceae) - Röhrlige Keule, Abart:

Abb.: Pilzfarbtafel 100 : 421


wurde bei einer Exkursion der PKA-Weidhausen von Frau M.R Ö d e l an Fallästen von *Carpinus betulus* (Hainbuche) gefunden.

Hier die Kurzbeschreibung durch Frau Dr.J.M a s e r:

Fruchtkörper mit gelbbraunen-graubraunen-rotbraunen Farben, bis ca. 40 mm hoch, ohne deutlichen Stiel, Basis +- runzelig, ohne Mycelfilz, aus der Rinde hervorbrechend.

Sporen 14-17 x 6,5-7,5 μm . Basidien 60-80 x 8-11 μm . Sterigmen 9-11 μm , Hyphen + - 3-10-20 + μm Durchmesser, im Innern sehr langzellig, kaum verzweigt, Septen mit Schnallen.

Fundort `Buchberg`, zwischen Rottenbach und Ottowind, ca.460 m NN. Literatur u.a. J ü l i c h (1984): 81/82.



Zeichnungen: Johanna Maser

FNO 14/15 1990-91

032 029) *Ramaria fumigata* (Ramariaceae) - Violettgrauer Ziegenbart:

wurde bei einer Exkursion der PKA-Weidhausen im Waldgebiet 'Lindenschlag' bei Breitengüßbach gefunden. Begleitbäume waren *Carpinus*, *Quercus*, *Tilia* (Hainbuche, Eiche, Linde) sowie Nadelbäume. Literatur u.a. J ü l i c h (1984):105; B r e i t e n b a c h / K r ä n z l i n (1986):360, Farbbild 468.

030) *Ramaria rubella* var. *rubella* (Ramariaceae)- Rötlicher Ziegenbart:

wurde bei einer Exkursion der PKA-Weidhausen im 'Achatzwald' an einem morschen Strunk gefunden. Der kleine Ziegenbart hatte eine rosa-bräunliche Farbe und die Gestalt eines Elchgeweihes. Die mit 5%KOH rötlich verfärbenden weißen Rhizomorphen ergaben die Bestimmung der Varietät 'rubella'. Literatur u.a. J ü l i c h (1984):104.

031) *Ramaria subbotrytis* (Ramariaceae) - Schönfarbiger Ziegenbart:

Abb.: Pilzfarbtafel 100 : 422

Bestimmung und Beschreibung J.C h r i s t a n (aff.E.S c h i l d): 'Sporen 7-10,5 x 3-4,2 µm, gemessen in L 4 und Bwbl/Mi, wobei die Sporen in Bwbl/Mi etwas schmaler sind (nur bis 3.9 µm breit), aber nicht kürzer (insgesamt 40 Messungen). Im Profil erscheinen die Sporen spindelig rau und in Bwbl/Mi zeigt sich ein mittelkräftiges, isoliertwarziges bis wulstig verschmolzenes Ornament, das z.T. etwas längsgerichtet erscheint.

Basidien 68x8 µm, ohne Schnallen, mit 4 Sterigmen, diese bis 7 µm lang.

Hyphen der Äste parallel bis leicht verschlungen, hyalin, z.Teil etwas rau, dünnwandig (bis 0,5 µm), ohne Schnallen, 2 - 18 µm im Durchmesser und nur gelegentlich mit ampullenförmig erweiterten Septenübergängen.

Messungen an einem großen und einem jungen, kleinen Fk. Bis auf die Hyphen beim kleinen Fk (diese waren deutlich schmaler, aber dafür mit kräftigeren Wänden) stimmen alle mikroskopischen Merkmale überein.

Bemerkungen (E): Gefunden wurde diese Art im 'Donnersdorfer Wald' bei Donnersdorf. Begleitbäume waren *Carpinus betulus*, *Quercus robur* und *Tilia cordata* (Hainbuchen, Stieleichen, Winterlinden), über Gipskeuper.

Auffallend freudig gefärbt waren die jungen Fruchtkörper, mit intensiv lachsrosa Farbe und mit blaßgelblichen Spitzen und weißem Fleisch. Ältere FK nahmen eine ockergelbe Farbe an, doch waren manche Äste noch lachsrosafarben. Diesen farblichen Unterschied zwischen jungen und älteren Exemplaren spiegelt auch das Farbbild 422 wieder.

Eine gute Abhandlung über diese Art findet sich bei H.J a h n in den Westfälischen Pilzbriefen (XI/1986), Band X-XI((8b): 336.

- 033 Bei K r i e g l s t e i n e r (1991):300, Nr. 876 findet sich nur ein Kartierungspunkt im MTB 4120, obwohl auch unser Fund rechtzeitig gemeldet wurde (MTB 6028).
Demnach handelt es sich um eine recht seltene, evt. auch verkannte Art. Unser Fund könnte damit ein zweiter Nachweis für die B R D-West sein.

Klasse BASIDIOMYCETES - Ordnung HETEROBASIDIOMYCETES (Gallertpilze)

035) Basidiodendron caesiocinereum (Tremellaceae):

Bemerkungen H.O s t r o w: Die Art wächst bei uns vor allem an morschem Nadelholz, seltener an Laubholz (Betula 1, Fagus 1, Picea 4, Pinus 1, Tilia 1). Sie unterscheidet sich von der ähnlichen B.eyrei durch größere Sporen mit deutlichem Apiculus. Meist sind die Sporen rau. B.eyrei wurde bei uns bisher nur an Laubholz gefunden (Carpinus 1, Fagus 2, Quercus 1, Tilia 4).
Literatur u.a. B r e i t e n b a c h / K r ä n z l i n (1986):56, mit Farbbild 10.

036) Dacryomyces tortus (Dacryomycetaceae)-Gekrümmte Gallertträne:

Bemerkungen H.O s t r o w: Fruchtkörper in dichten Gruppen; sehr klein; honiggelb-bräunlich; mikroskopisch an den Hyphen mit Schnallen zu erkennen.
Literatur u.a. R e i d (1974) und J ü l i c h (1984).

037) Myxarium laccatum (Tremellales - Tremellaceae):

siehe Hinweis Seite 188.

Klasse BASIDIOMYCETES - Ordnung AGARICALES (Blätterpilze)

E n g e l, H. : siehe folgenden Beitrag: "Pilzfunde an Lindenästen (Tilia spec.)", Seite 119 bis Seite 243.

Seite:

039) Calathella eruciformis 190
046) Crepidotus epibryus 192

038) Amanita vaginata var. flavescens (Amanitaceae):

Abb.: Pilzfarbtafel 101 : 423 + 424

wuchs in einem Grasgarten mit verschiedenen Baumarten, u.a. Obstbäume, in Lichtenfels.

Nach den makroskopischen Merkmalen zu urteilen, könnte diese Varietät auch als eigenständige Art aufgefaßt werden.

Entspricht dem Farbbild bei M e r l o / T r a v e r i s o (1983):35. Hüte bis 60 mm Durchmesser und bis 40 mm hoch, halbkugelig, ocker-gelb, am Rand deutlich gerieft.

Blätter cremefarbig.

Stiel bis 80x10 mm, weißcreme, feinflockig, undeutlich genattert, zur Basis dunkler; Volva häutig, weißlich.

034 040) *Coprinus hemerobius* (Coprinaceae) - Fuchsiges Tintling:

gefunden im Bereich der Lindenallee bei Oberaufseß.

Beschreibung siehe bei M i c h a e l-H e n n i g-K r e i s e l (1981) IV:447, Farbbild 304.

041) *Coprinus radiatus* (Coprinaceae) - Pferdemit-Tintling:

eine auf Pferdemit wachsende recht kleine Art, mit einem Hutdurchmesser von 8 mm und einer Stielhöhe von ca. 15 mm. Die Sporen waren um $12,5 \times 5 \mu\text{m}$ groß.

Literatur u.a. M i c h a e l-H e n n i g-K r e i s e l (1981) IV: 128 und M o s e r (1983):225.

042) *Cortinarius* (Tel.) *purpureo-badius* (Cortinariaceae) - Purpurbrauner Gürtelfuß:

Literatur u.a. M o s e r (1983):407.

043) *Cortinarius* (Tel.) *sertipes* (Cortinariaceae):

Literatur u.a. M o s e r (1983):407.

044) *Cortinarius* (Tel.) *subsertipes* (Cortinariaceae) - Buntstielliger Gürtelfuß:

siehe Beschreibung dieser Art bei M i c h a e l-H e n n i g-K r e i s e l (1981) IV:292, Farbbild 124.

045) *Cortinarius* (Tel.) *umidicola* (Cortinariaceae) - Büscheliger Gürtelfuß:

siehe Beschreibung dieser Art bei M i c h a e l-H e n n i g-K r e i s e l (1981) IV : 288, Farbbild 119.

047) *Dermoloma cuneifolium* (Tricholomataceae) - Keilblättriger Samtrittling:

wuchs fast unmittelbar am Waldrand auf einer kurzgrasigen Wiese. Hüte bis 3 cm Durchmesser, grau bis weißlichgrau; Blätter schmutzig weißlich, fast dreieckig angewachsen; kurzer, weißlicher Stiel; Sporen hyalin, um $5 \times 3 \mu\text{m}$, nicht amyloid.

Literatur u.a. M o s e r (1983):185.

048) *Galerina laevis* (Cortinariaceae) - Zarter Grashäubling:

gefunden auf einer submontanen Bergwiese (ca. 700 m NN), `Buchig`, bei Ebersdorf, Kreis Kronach.

Literatur u.a. M o s e r (1983):420.

049) *Inocybe hirtella* var. *bispora* (Cortinariaceae) - Bittermandel Rißpilz, zweisporige Varietät:

gefunden im Waldteil `Lindenschlag` bei Breitengüßbach, Kreis Bamberg. Begleitbäume: *Carpinus*, *Quercus*, *Tilia*, *Pinus* (Hainbuche, Ei-

035 Linde, Kiefer) auffallend der Bittermandelgeruch nach mehrstündiger Einlagerung in einer kleinen Dose.

Literatur u.a. S t a n g l (1989):150-152.

050) *Lepiota subincarnata* (Agaricaceae):

gefunden im `Spittelwald` bei Schloß Banz, Kreis Lichtenfels.

Die Fruchtkörper waren relativ klein. Hüte fast spitzkegelig, fein schuppig, rosulich auf ockerlichem Grund, Durchmesser 1,2 bis 1,8 cm. Stiele um 35 x 1 mm, oben weißfaserig, im unteren Drittel incl. Basis rosulich, stellenweise mit weißem Velum behaftet. Die hyalinen, eiförmigen Sporen maßen 5,8-6,2 x 3,3-3,5 µm.

Literatur u.a. M o s e r (1983):242; C a n d u s s o/L a n z o n i (1990).

051) *Mycena leptcephala* (Tricholomataceae) - Grauer Nitrat-Helm-
ling:

wurde im Kreis Bamberg für uns erstmals registriert. Sowohl dort, als auch in den Kreisen Bayreuth, Coburg, Haßberge, Kronach, Lichtenfels und im `Bayerischen Wald` im nachhinein des öfteren gefunden und in 10 MTB`s kartiert.

Literatur u.a. B r e i t e n b a c h/K r ä n z l i n (1991):278, Farbbild 345.

052) *Tricholoma viridifurcatum* (Tricholomataceae) - Grünfarbiger
Ritterling:

gefunden im Waldteil `Lindenschlag` bei Breitengüßbach, Kreis Bamberg (*Carpinus*, *Quercus*, *Tilia*, *Pinus* u.a.m.).

Diese Exkursion der `PKA-Weidhausen` am 3.Oktober 1990, als wir diese Pilzart fanden, war eine Exkursion der Superlative. Auf kleinsten Flächen gab es unwahrscheinlich viele Pilzarten mit zu dem meist vielen Fruchtkörpern. Auch einige für uns `neue` Arten. Literatur u.a. B r e i t e n b a c h/K r ä n z l i n (1991):344, Farbbild 443; A l e s s i o (1985).

Klasse BASIDIOMYCETES - Ordnung RUSSULALES

053) *Lactarius lilacinus* (Russulaceae) - Lila-Milchling:

bei unseren verschiedenen Zusammenkünften (Vortragsabende, Exkursionen usw.) mache ich des öfteren auf Pilzarten aufmerksam, die bisher bei uns noch nicht gefunden wurden, dessen Auffinden aber unter bestimmten Voraussetzungen durchaus möglich ist. Aufgrund derartiger Hinweise gelang Frau Gisela E n g e l (Bamberg), auch ein Fund des Lila-Milchlings in einem Erlenbruchwald, zwischen dem `Kleinen` und `Großen Hofsee` bei Adelsdorf, Kreis Bamberg.

Literatur u.a. M i c h a e l-H e n n i g-K r e i s e l (1983) V: 200, Farbbild 44.

036 Klasse BASIDIOMYCETES - Ordnung UREDINALES (Rostpilze)

054) Coleosporium campanulae:

wurde von meiner Frau an der Büschelglockenblume (Campanula glomerata) in unserem Garten entdeckt.

Literatur G ä u m a n n (1959).

055) Puccinia polygoni amphibii:

wurde von mir an Storchschnabel (Geranium spec.) gefunden und entsprechend bestimmt, bestätigt von Dr.H.B u t i n.

Literatur G ä u m a n n (1959).

056) Pucciniastrum agrimoniae:

zufällig bei einer Lindenallee-Exkursion an Odermennig (Agrimonia eupatoria) gefunden.

Literatur G ä u m a n n (1959).

Klasse MYXOMYCETES (Schleimpilze)

H e c h l e r, J: siehe folgenden Beitrag: "Pilzneufunde in Nordwestoberfranken 1990, III. Teil. Myxomyceten." Seite 051 bis Seite 053.

	Seite:
057) Dictydiaethalium ferrugineum	052
058) Lamproderma arcyryonema	053

059) Physarum murinum:

gefunden an am Boden liegenden morschen Holzstückchen.

Literatur u.a. N a n n e n g a-B r e m e k a m p (1974):294.

E n g e l, H.: siehe folgenden Beitrag: "Pilzfunde an Lindenästen, (Tilia spec.)", Seite 119 bis Seite 243.

	Seite:
060) Trichia contorta var. iowensis	199

Klasse DEUTEROMYCETES (Fungi imperfecti):

061 cf. Wardomyces inflatus	200
062 Acremonium fusidioides	201
063 Acremonium spec.	---
064 Aposphaeria state	---
066 Aureobasidium pullulans	201
068 Chaetopsis grisea	201
069 Chalara oder Fusichalara sp. n.	201
070 Cladobotryum varium	201
071 Cladosporium cladosporioides.	202
072 Cladosporium herbarum	202
073 Corynesporopsis uniseptata.	202
074 Coryneum spec.	---
075 Costantiella terrestris	202

037	076	<i>Drepanospora viride</i>	202
	077	<i>Geniculosporium serpens</i>	203
	078	<i>Lamproconium desmazieresii</i>	203
	079	<i>Monodictys castanea</i>	204
	080	<i>Monodictys putredinis</i>	204
	081	<i>Nematogonium ferrugineum</i>	204
	082	<i>Oidiodendron cf. tenuissimum</i>	---
	083	<i>Oidiodendron tenuissimum</i>	204
	084	<i>Penicillium spec.</i>	---
	085	<i>Penicillium spec.</i> , Sekt. <i>Symmetrica</i>	---
	086	<i>Pseudospiropes subuliferus</i>	205
	087	<i>Sporidesmium folliculatum</i>	205
	088	<i>Trichoconis spec. nov.</i>	205
	089	<i>Trichoconis spec. nov.</i>	205

065 *Aspergillus cf. flavus* :

auf verschimmeltem Käsekuchen.

Klasse PHYCOMYCETES (Algenpilze)

088 *Syzygites melanocarpus* :
Syn.: *Sporodinia grandis* LINK

gefunden im Garten W i r t h, Lichtenfels, an am Boden liegendem Perlpilz (*Amanita rubescens*), die Blätter befallend.

In der Literatur werden u.a. folgende Befallspilze genannt:

Amanita citrina, auch *Amanita rubescens*, *Lactarius piperatus*, *Paxillus involutus*, *Tricholoma sulphureum*, *Tylopilus felleus* sowie verschiedene Arten der Gattungen *Boletus*, *Calvatia*, *Lactarius*, *Russula*, *Scleroderma* und undefinierbare Blätterpilze. Des öfteren zusammen mit *Cladosporium herbarum* und *Penicillium spec.*

Literatur u.a. Ellis/Ellis (1988:41; Helfer (1991):17.

Literatur (zitiert bei Anmerkungen und Kurznotizen zur Neufund-
----- liste 1990`)

Breitenbach, J. u. F. Kränzlin (1986) - Pilze der Schweiz 2. Nicht-
blätterpilze. Luzern

- (1991) - Pilze der Schweiz 3. Röhrlinge
und Blätterpilze 1. Teil. Luzern

Candusso, M. u. G. Lanzoni (1990) - *Lepiota s.l.* Saronno

Ellis, B. u. J. P. Ellis (1988) - *Microfungi on Miscellaneous Substrates*. London u. Sydney - Portland u. Oregon

Gäumann, E. (1959) - Die Rostpilze Mitteleuropas. Beiträge zur Kryptogamenflora der Schweiz, Band XII. Bern

Helfer, W. (1991) - Pilze auf Pilzfruchtkörpern. Untersuchungen zur Ökologie, Systematik und Chemie. Eching

- 038 Jahn, H. (1986) - `Der "Satanspilzhang" bei Glesse (Ottenstein), Süd-Niedersachsen. Zur Pilzvegetation des Seggen Hangbuchenwaldes (Carici-Fagetum) im Weserbergland und außerhalb. Westfälische Pilzbriefe Band X - XI (8b):289-351
- Jülich, W. (1984) - Die Nichtblätterpilze, Gallertpilze und Bauchpilze. In H.Gams `Kleine Kryptogamenflora` II/b, 1. Teil. Jena
- Krieglsteiner, G.J. (1991) - Verbreitungsatlas der Großpilze Deutschlands I (A) : Nichtblätterpilze. Stuttgart
- (1991) - Verbreitungsatlas der Großpilze Deutschlands I (B) : Ständerpilze. Stuttgart
- Merlo, E.G.u.M.Traverso (1983) - i nostri funghi LE AMANITE. Genova
- Michael-Hennig-Kreisel (1979) - Handbuch für Pilzfreunde, III. Jena
- (1981) - Handbuch für Pilzfreunde, IV. Jena
- (1983) - Handbuch für Pilzfreunde, V. Jena
- Moser, M. (1983) - Die Röhrlinge und Blätterpilze. In H.Gams 'Kleine Kryptogamenflora' Band II/b2-Basidiomyceten 2. Teil. Stuttgart - New York
- Nannenga-Bremekamp N.E. (1974) - De Nederlandse Myxomyceten. Zutphen
- Reid, D.A. (1974) - A. Monograph of the British Dacrymycetales. In: Trans., Br. mycol. Soc. 62 (3) : 433 - 494
- Stangl, J. (1989) - Die Gattung *Inocybe* in Bayern. Hoppea. Regensburg.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Die Pilzflora Nordwestoberfrankens](#)

Jahr/Year: 1991

Band/Volume: [14-15](#)

Autor(en)/Author(s): Engel Heinz

Artikel/Article: [Pilzneufunde in Nordwestoberfranken 1990, I. Teil. Auflistung, Kurzbeschreibungen, Hinweise 25-38](#)